

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-788904

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 104

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : STITOU SAADIA (VEUVE LAMRABE OMAR)

Date de naissance : 1940

Adresse : AV. OTMAN BEN AFAN ZKT RANON N° 180
TETOUAN

Tél. : 0666878005

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Imane EZ-Zerouali
Médecine Générale
N°2 Résidence Jilala, 1er étage
Lot Alhadad N° 26 - Tétouan
Lot Alhadad N° 25 7310539 71 20 85

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23/02/23

Nom et prénom du malade : STITOU SAADIA

Age : 83

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Pathologie digestive

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TETOUAN

Le : 20/03/2023

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

N° W21-788904

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
23.02.2023	C	C	20000	INP : 1611171574 Dr. Imane Ezzero Médecine Générale N°2 Résidence Jilata, 4 N° 26 - T

attestant le Paiement des Actes

INP : 161171574

Dr. Imane EL Zerouali

Dr. Médecine Générale

N°2 Résidence Jihala, 1er étage

0608 Alhadad N° 26 - Tétouan

63 59 25 7310539 74 2058

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	23/12/83	438,80
	20/13/83	335,00

[illegible]

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
						
						
						
						



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :													
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000	00000000	35533411	11433553	B
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	G																
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS													
			DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

INP: | | | | | | | | | |

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Imane EZ-Zerouali

Médecine Générale

- Echographie-ECG
- Examen médical général (hommes-femmes-enfants)
- Suivi de grossesse
- Certificats de conduite
- Ex. Médecin Interne à l'Hôpital Saniat Rmel Tétouan
- Ex. Médecin Interne à l'Hôpital Med.V Chefchaouen



BILAN BIOLOGIQUE

الدكتورة إيمان الزروالي

الطبيب العام

- الفحص - تخطيط القلب
- الفحص العام (نساء-أطفال)
- تتبع الحمل
- شواهد السباحة
- طبية داخلية سابقا بهستشفى
- سانية الزهرل بتطوان
- طبية داخلية سابقا بهستشفى
- وحدة الخاوسي بشفشاون

Le: 23 FEB 2023
H O F O

Nom/Prénom: Stéphan

Age: _____ Sexe: _____

Groupe sanguin

- ☐ Groupe
- ☐ Rhésus
- ☐ RAI
- ☐ Phénotype Rhésus
- ☐ Coombs Indirect
- ☐ Coombs direct

Hématologie / Infectiologie

- ☐ NFS
- ☐ Plaquette
- ☐ Electrophorèse de l'hémoglobine
- ☐ Réticulocytes
- ☐ VS
- ☐ CRP
- ☐ Procalcitonine

Bilan d'hémostase

- ☐ TP
- ☐ INR
- ☐ TCK
- ☐ Fibrinogène
- ☐ TS
- ☐ D- Dimères

Bilan lipidique

- ☐ Cholestérol total
- ☐ Cholestérol HDL
- ☐ Cholestérol LDL
- ☐ Triglycérides

Bilan glycémique

- ☐ Glycémie à jeun
- ☐ HGPO
- ☐ Hémoglobine glyquée

Bilan martial

- ☐ Fer sérique
- ☐ CTF
- ☐ Femmine
- ☐ Transfemine

Ionogramme sanguin

- ☐ Na+
- ☐ K+
- ☐ Cl-
- ☐ Calcium
- ☐ Réserve Alcaline
- ☐ Phosphore
- ☐ Magnésium
- ☐ Protéines
- ☐ Acide urique

Ionogramme urinaire

- ☐ Diurèse
- ☐ Na+
- ☐ K+
- ☐ Cl-
- ☐ Calcium
- ☐ Phosphore
- ☐ Urée

Fonction hépatique et pancréatique

- ☐ ASAT
- ☐ ALAT
- ☐ Phosphase alcaline
- ☐ Gamma GT
- ☐ Bilirubine libre et conjuguée
- ☐ 5' Nucléotidase
- ☐ Amylase
- ☐ Lipase
- ☐ Electrophorèse des protéines

Examen des selles

- ☐ Coprologie
- ☐ Parasitologie

Fonction rénale

- ☐ Urée
- ☐ Créatinine
- ☐ Clairance de la Créatinine
- ☐ Protéinurie des 24h
- ☐ Microalbuminurie

Examen des urines

- ☐ ECBU
- ☐ ATB gramme
- ☐ Test de grossesse

Bilan hormonal

- ☐ Prolactine
- ☐ FSH
- ☐ Oestradiol
- ☐ BHCG
- ☐ T3
- ☐ T4
- ☐ TSH US
- ☐ LH
- ☐ AMH

Sérologie et immunologie

- ☐ NDRL
- ☐ PHA
- ☐ Hépatite A
- ☐ Hépatite B
- ☐ Antigène Hbs
- ☐ Antigène Hbe
- ☐ Anticorps Anti-HBC
- ☐ Anticorps Anti -Hbs
- ☐ Anticorps Anti -Hbe
- ☐ Hépatite C
- ☐ ASLO
- ☐ Facteurs rhumatoïdes (Latex,Waler Rose)
- ☐ AC anti nucléaire
- ☐ AC anti
- ☐ DNA natif
- ☐ Sérologie HIV

Divers


- ☐ SPA
- ☐ Phosphatase acide
- ☐ Vitamine D
- ☐ CPK
- ☐ Troponines
- ☐ BNP
- ☐ Pro BNP
- ☐ LDH
- ☐ HP dans les selles
- ☐ HP sérologique
- ☐ Calprotectine

Autres: _____

Dr.Imane EZ-Zerouali Médecine Générale

الدكتورة إيمان الزروالي الطب العام

- Echographie-ECG
- Examen médical général (hommes-femmes-enfants)
- Suivi de grossesse
- Certificats de conduite
- Ex.Médecin Interne à l'Hôpital Saniat Rmel Tétouan
- Ex.Médecin Interne à l'Hôpital Med.V Chefchaouen



- الفحص بالصدى - تخطيط القلب
- الفحص العام (رجال-نساء-أطفال)
- تتبع الحمل
- شواهد السيادة
- طبية داخلية سابقا بهستشفى سانية الرمل بتطوان
- طبية داخلية سابقا بهستشفى محمد الخامس بشفشاون

23 FEB. 2023

59,50 Stiton Sardinia 59,50

1/ Amiprim 50

71,40 x 2 ^{1cp} 142,80 x 3 ^{max}

2/ Fluoxet 87,50 ^{gelly} x 2 ^{ص.ب}

3/ Blymap 149,00 ^{gelly} x 2 ^{ص.ب}

3/ Tetym 438,80 ^{2cp} ^{ب.ب}

وسط الغذاء

PHARMACIE BAB NOUADER
QARCHLI MOHAMED
DOCTEUR EN PHARMACIE
Tél/Fax: 05 39 70 01 95
197, Av. Lamy s/n - Tétouan

Dr. Imane EZ-Zerouali
Médecine Générale
N°2 Résidence Alata, 1er étage
Lot Alahadad N°26 Tétouan
06 63 59 25 73 / 05 39 71 20 85


06 63 59 25 73/05 39 71 20 85

تجزئة الحداد شارع مولاي حسن بلمهدي زنقة أ- رقم 26 تطوان
إقامة جيلالة الطابق الأول رقم 2 (موقف الحافلات - الرمانة)

Dr Imane EZ-Zerouali Médecine Générale

الدكتورة إيمان الزروالي الطب العام

- Echographie-ECG
- Examen médical général (hommes-femmes-enfants)
- Suivi de grossesse
- Certificats de conduite
- Ex.Médecin Interne à l'Hôpital Saniat Rmel Tétouan
- Ex.Médecin Interne à l'Hôpital Med.V Chefchaouen



20 MAR. 2023

- الفحص بالصدى - تخطيط القلب
- الفحص العام (رجال-نساء-أطفال)
- تتبع الحمل
- شواهد السيادة
- طبية داخلية سابقا بهستشفى
- سانية الرمل بتطوان
- طبية داخلية سابقا بهستشفى
- وحدات الخاوس بشفشاون

Stitou Saâdine

1/ Ezium 20g

gel x 2lg

x 1min

110.60

2/ P.Cimelift (2bouts.)

1ap / 18grs

144.50

3/ Sertraline 50g

1/2 cph

79.95

335.00

4/ Oxanti

gel x 2lg

x 2grs

Dr. Imane EZ-Zerouali
Médecine Générale
Résidence Jilala, 1er étage
N° 26 - Tétouan
06 63 59 25 73 / 0539 71 20 85

06 63 59 25 73 / 0539 71 20 85

تجزة الحداد شارع الحسن بلمهدي زنقة أ- رقم 26 تطوان
إقامة جيلالة الطابق الأول رقم 2 (موقف الحافلات - الرمانة)

57-11
11.04.2023
11h00-

POV $\propto \log$

not

Ezi[®]ium

20

Veuillez lire attentivement
• Gardez cette notice.
• Si vous avez toute
à votre médecin ou à
• Ce médicament vous
même en cas de sympt
• Si l'un des effets
mentionnés dans cette

Composition

Composition qualitative

Principe actif :

Ésoméprazole magnés

Ésoméprazole magnés

Autres composants :

35%, polyorbote

acide-éthylacrylate copol

éau purifié.

Excipients à effet notoi

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

EZIU[®] contient une substance appelée ésoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

Indications thérapeutiques :

EZIU[®], gélules gastro-résistantes est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

• Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). EZIU[®] peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

• L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

EZIU[®] n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Si vous prenez ce médicament depuis longtemps (en particulier depuis plus d'un an), votre médecin sera amené à instaurer une surveillance.

Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament « à la demande » en fonction des besoins, vous devez l'informer si les symptômes se modifient.

Mode d'administration

Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée.

Vous pouvez prendre vos gélules pendant ou en dehors des repas.

Avalez vos gélules entières avec un verre d'eau. Les gélules comme leur contenu ne doivent pas être mâchées ni croquées. En effet, les gélules contiennent des granules dont l'enrobage protège le médicament de l'acidité de l'estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

Que faire si vous avez des difficultés pour avaler les gélules

Si vous avez des difficultés pour avaler les gélules :

1) Ouvrir soigneusement les gélules au dessus d'un verre d'eau (non gazeuse) et vider le contenu des gélules (granules) dans le verre. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

2) Remuez. Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.

3) Afin de prendre la totalité du médicament, rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler : le contenu des gélules peut être mélangé dans de l'eau et avalé avec une cuillère. Il faut alors être administré par sonde nasogastrique.

PPV : 144DH50
PER : 09/23
LOT : K3637-3

20 mg
ules



Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'amoxicilline et de la claritromycine.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU[®] 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU[®] 20 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU[®] 40 mg deux fois par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement en fonction de vos besoins. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récurrence hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Contre-indications :

Ne prenez jamais EZIU[®] 20mg, 40 mg, gélule gastro-résistante :

• si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;

• si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, omeprazole) ;

• si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé dans le traitement du VIH). Si vous avez des doutes, si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration d'EZIU[®].

Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, EZIU[®], gélule gastro-résistante peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre EZIU[®] et contactez un médecin immédiatement.

Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).

Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un gonflement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une destruction toxique de la peau.

Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.

Ces effets sont rares et affectent 1 utilisateur sur 1000 :

Les autres effets indésirables sont :

Effets indésirables fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

Maux de tête

Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence, nausées, vomissements.

Effets indésirables peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

Gonflement des pieds et des chevilles.

Troubles du sommeil (insomnie).

Étourdissements, fourmillements, somnolence.

Vertiges.

Sécheresse de la bouche.

Augmentation dans le sang des enzymes du foie.

Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

SERTRALINE GT[®]



DENOMINATION :

Comprimés Pelliculés Boîte de 20 et 30
Comprimés Pelliculés Boîte de 20 et 30

110/60

50 mg
55,95 mg
100 mg
111,90 mg

Phosphate de calcium dihydraté, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, silice colloïdal anhydre, stéarate de magnésium, alcool polyvinylique, dioxyde de titane, Polyéthyléneglycol, talc.

Excipient à effet notoire :

Lactose

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Adulte :

- Episodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés)
- Troubles obsessionnels compulsifs.
- Prévention des récives dépressives chez des patients présentant un trouble unipolaire.

Enfant de 6 à 17 ans :

- Troubles obsessionnels compulsifs.

CONTRE INDICATIONS :

Absolues :

- Hypersensibilité à la sertraline, ou à tout autre composant
- IMAO non sélectifs et pimozide.

Relatives :

- IMAO sélectifs A et linézolide
- Allaitement

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

MISE EN GARDE SPECIALES :

Comme avec tous les antidépresseurs, l'action de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours. Il est donc important de poursuivre le traitement régulièrement même en l'absence d'amélioration immédiate, sauf avis contraire de votre médecin. Si vous avez des idées suicidaires, parlez-en à votre médecin.

La prescription chez l'enfant présentant des troubles obsessionnels compulsifs nécessite l'avis d'un spécialiste.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

La prévention de récives dépressives ne concerne que les patients ayant présenté au moins trois épisodes dépressifs (y compris le dernier épisode) d'intensité modérée à sévère.

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insomnie ou nervosité en début de traitement,
- Maladie du foie,
- Épilepsie ou antécédents d'épilepsie. La survenue de crises convulsives impose l'arrêt du traitement,
- Antécédents d'anomalies de la coagulation du sang ou de traitement par des médicaments susceptibles d'augmenter le risque de saignement tels que l'aspirine ou certains anti-



Comprimé
Voie orale

Lot n° : 200665
À consommer de
préférence avant le : 11/2023

PPC : 79,95 DH

oxantin®
base d'actifs naturels

FORME ET PRESENTATION

Comprimé, boîte de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Wakamé: (Undaria pinnatifida) poudre, Rhubarbe: racine (Rheum palmatum, Rheum officinale) extrait sec, cellulose, Pissenlit: racine (Taraxacum officinale) extrait sec, Fructo-oligosaccharides, Cerise: pédoncule (Prunus avium) extrait sec, anti-agglomérant: dioxyde de silice; magnésium stéarate.

PROPRIETES :

OXANTIN® est à base d'actifs naturels agissant en synergie pour lutter contre le ballonnement et la constipation et améliorer la digestion tout en reconstituant la flore intestinale.

UTILISATIONS :

OXANTIN® est recommandé en cas de ballonnement, de constipation et de Troubles Fonctionnels Intestinaux.

MODE D'UTILISATION :

- 1 à 2 comprimés 2 fois par jour, avec un verre d'eau avant les repas.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament .

- Respecter la dose journalière conseillée.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- A conserver au sec et à l'abri de la lumière.

Fabriqué par PHARMALIFE RESEARCH Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma.

Autorisation ministère de santé n° : DA2012 090 6183 DMP/21/MA1

Autorisation sanitaire ONSSA n° : ES.5.229.16

پاور
11
الکافور 2

MYTUM®

HAIDE DIGESTIF NATUREL



InQure®

30 Gélules
Voie orale

Poids Net : 15.27 g

MYTUM®

MYTUM®

POLYMAG

MAGNESIUM VIT B6

POLYMAG

L 0571
PER: 05/24
PUC: 87,50 OH

tionnement
e sur les muscles.
e à partir du
sium.

- Irritabilité, problèmes mineurs de sommeil, stress.
- Crampes, fatigue.

COMPOSITION (en mg par gélule de 400 mg)

Ingrédient	En mg par gélule de (400 mg)
Oxyde de magnésium	255 mg
Vit B6	1 mg
Stéarate de magnésium	2,3 mg
Maltodextrine	141,70 mg

AMIPRIM® 50 mg, 100 mg et 200 mg
Comprimés sécables
Boîtes de 30

59,50

AMIPRIM® 50 mg
30 comprimés sécables



AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotiques.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques et du comportement, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

PRENDRE AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg ?

Ne prenez jamais de AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg si :

• Si vous êtes allergique à la substance active (l'Amisulpride) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

• Si vous souffrez d'un phéochromocytome (croissance excessive des glandes surrénales situées au niveau des reins et libérant des substances qui provoquent une pression artérielle élevée).

• Chez l'enfant de moins de 15 ans.

• Si vous allaitez.

• Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire.

• Si vous prenez un autre médicament, assurez-vous que l'association avec AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg n'est pas contre-indiquée.

Mise en garde et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg, comprimé sécable.

Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque.

Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

Chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démence, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin.

Si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale » et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau),

Si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents de formation de

caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins.

Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans ce cas la dose peut être réduite par votre médecin.

Si vous souffrez d'épilepsie ou de la maladie de Parkinson,

Si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète,

Si vous avez des antécédents d'hyperprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire. Dans ce cas, votre médecin doit vous surveiller étroitement pendant le traitement.

Pendant le traitement, si vous présentez une rigidité musculaire et des troubles de la conscience, accompagnés d'une fièvre inexpliquée : arrêtez immédiatement votre traitement et consultez d'urgence votre médecin.

Pendant le traitement, si vous avez des troubles de la vue ou des maux de tête, consultez rapidement votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre inexpliquée, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer immédiatement un bilan sanguin. En effet, ce médicament peut provoquer une perturbation des éléments sanguins (diminution du nombre de globules blancs) mise en évidence sur les résultats d'une prise de sang.

Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels qu'insomnie, nausées, vomissements mais on peut observer également des mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Autres médicaments et AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg :

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Vous ne devez jamais prendre ce médicament avec la cabergoline, le quinafolide (médicaments utilisés dans les troubles de la lactation), le citalopram, l'escitalopram (médicaments pour traiter l'anxiété ou la dépression), la dompéridone (médicament pour traiter les nausées et les vomissements), l'hydroxyzine (médicament pour traiter l'anxiété ou l'urticaire), la piperazine (médicament pour traiter le paludisme).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- Certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribédil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, sélegiline, tolcapone).
- La lévodopa.
- L'oxalyte de sodium (médicament pour traiter la narcolepsie).

• Certains médicaments pouvant entraîner des troubles graves du rythme cardiaque (torsades de pointes) tels que :

- des médicaments utilisés pour traiter un rythme cardiaque irrégulier (les antiarythmiques de classe Ia tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide et les antiarythmiques de classe III tels que amiodarone, dronedarone, sotalol, dofétilide et butilide),
- certains médicaments contre les troubles psychiatriques (chlorpromazine, cyaméazine, dropridol, flupenthixol, flupérazine, halopéridol, lévomépromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, sulpiride, sultopride, tiapride, zuclopenthixol),
- certains antiparasitaires (chloroquine, halofantrine, luméfántrine, pentamidine),
- un médicament utilisé pour lutter contre la dépendance à certaines drogues (la méthadone),
- et d'autres médicaments tels que : arsénieux, diphénamil, dolasetron IV, érythromycine IV, hydroxychloroquine, lévofloxacine, méquitazine, mizolastine, prucalopride, vincamine IV, moxifloxacine, spiramycine IV, toremifène, vandetanib,

• Des médicaments contenant de l'alcool.

AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg, comprimé sécable avec des aliments et boissons et de l'alcool

Comme avec tous les antipsychotiques de cette famille, vous devez éviter la prise de boissons alcoolisées pendant votre traitement.

Grossesse et allaitement

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez immédiatement votre médecin car lui seul peut décider s'il est nécessaire de poursuivre ce traitement.

Si vous prenez AMIPRIM 50mg, 100 mg et 200 mg pendant les 3 derniers

FLUOXET[®] 20 mg, gélules fluoxétine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

LOT 212879 3
EXP 11 2024
PPV 71.40

pas à d'autres
sont identiques
médecin ou à
ne serait pas



71.40

20 mg, gélules ?

Fluoxet[®] 20 mg
10 gélules



6 118000 020783

mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL

ATC: N06AB03

substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un
épresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture

traiter :

laxatifs,

en complément d'une psychothérapie pour la

diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en charge psychothérapeutique après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé qu'en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.

- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.

prenez **aucun** IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un temps plus long.

- Si vous prenez augmentation du
Faites attention
Adressez-vous
mg, gélules dan
- Problèmes card
- Début de fièvre
mental tels que
syndrome apper
tiques ». Bien qu
vital, **contactez**
pourrait devoir è
- Manie ou antéc
votre médecin in
- Antécédent d
saignement inha
- Prise de médic
médicaments et
- Convulsions c
constatez que la
ment, il pourrait
- Electroconvuls
- Traitement en
voir rubrique « A
- Impatiences, l
augmentation de
- Diabète : votr
d'antidiabétique
- Maladie du foie
traitement.
- Rythme cardia
carence en sel
l'utilisation de tr
- Traitement en
- Glaucome (au
Idees suicidair
Si vous souffrez
avoir des idées
manifestations p
ce type de méd
Vous êtes partic
cas suivants :
- si vous avez d
- si vous êtes
comportement
une maladie ps
En cas de sur
ment votre mé
Vous pouvez
êtes dépressif
cette notice. V
dépression ou
comportement.
Enfants et ado
Enfants et ado
Les patients de
que tentative d
agressivité, cor
de médicament
8 à 18 ans que
association à u
Les données d
la puberté, le
patients de cet
18 ans il est p
souffrez d'épi
psychothérapie
FLUOXET a
adrez-vous
énumérés ci-d
FLUOXET.
FLUOXET ne

FLUOXET[®] 20 mg, gélules fluoxétine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

LOT 212879 3
EXP 11 2024
PPV 71.40

pas à d'autres
sont identiques
médecin ou à
ne serait pas



71.40

20 mg, gélules ?

Fluoxet[®] 20 mg
10 gélules



6 118000 020783

mg, gélules ET DANS QUELS CAS EST-IL

ATC: N06AB03

substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un
épresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture

traiter :

laxatifs,

en complément d'une psychothérapie pour la

diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de

Chez l'enfant âgé de 8 ans et plus et l'adolescent :

- Un épisode dépressif modéré à sévère qui ne répond pas à une prise en charge psychothérapeutique après 4 à 6 séances. Chez les enfants et adolescents présentant un épisode dépressif modéré à sévère, FLUOXET ne devrait être proposé qu'en association avec une prise en charge psychothérapeutique.

Comment FLUOXET fonctionne

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de FLUOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner.

Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUOXET 20 mg, gélules ?

Ne prenez jamais FLUOXET 20 mg, gélules :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (telles que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.

- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par FLUOXET ne doit être commencé que 2 semaines après l'arrêt de l'IMAO non sélectif et irréversible.

prenez **aucun** IMAO non sélectif et irréversible pendant au minimum 5 semaines l'arrêt de votre traitement par FLUOXET. Si FLUOXET vous a été prescrit pendant une durée et/ou à des doses élevées, votre médecin devra envisager un temps plus long.

- Si vous prenez augmentation du
Faites attention
Adressez-vous
mg, gélules dan
- Problèmes card
- Début de fièvre
mental tels que
syndrome apper
tiques ». Bien qu
vital, **contactez**
pourrait devoir è
- Manie ou antéc
votre médecin in
- Antécédent d
saignement inha
- Prise de médic
médicaments et
- Convulsions c
constatez que la
ment, il pourrait
- Electroconvuls
- Traitement en
voir rubrique « A
- Impatiences, l
augmentation de
- Diabète : votr
d'antidiabétique
- Maladie du foie
traitement.
- Rythme cardia
carence en sel
l'utilisation de tr
- Traitement en
- Glaucome (au
Idees suicidair
Si vous souffrez
avoir des idées
manifestations p
ce type de méd
Vous êtes partic
cas suivants :
- si vous avez d
- si vous êtes
comportement
une maladie ps
En cas de sur
ment votre mé
Vous pouvez
êtes dépressif
cette notice. V
dépression ou
comportement.
Enfants et ado
Enfants et ado
Les patients de
que tentative d
agressivité, cor
de médicament
8 à 18 ans que
association à u
Les données d
la puberté, le
patients de cet
18 ans il est p
souffrez d'épi
psychothérapie
FLUOXET a
adrez-vous
énumérés ci-d
FLUOXET.
FLUOXET ne



مختبر ابن النفيس للتحليلات الطبية

Laboratoire IBN AL NAFIS d'Analyses Médicales Spécialisées
FIV, ICSI, Congélation du sperme, Vitrification...
Biologie Moléculaire (PCR, RT-PCR ...)



LABORATOIRE CERTIFIÉ depuis 28/07/2021 EN SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ ISO 9001

Dr. Jinane ZOUAKI - Docteur d'Etat en Pharmacie.

SPÉCIALISTE: Universités de GRENADE & PARIS-SORBONNE

Ancienne Attachée à La Faculté de Pharmacie & à l'Hôpital Virgen de Las Nieves de Grenade

FACTURE N° : 230300203

TETOUAN le 08-03-2023

Mme STITOU SAADIA CIN L124618

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Val	Clefs
9105	Prélèvement sanguin	E20	E
9106	Forfait traitement autre échantillon	B5	B
0104	Calcium	B30	B
0105	Chlore	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0129	Phosphore minéral	B40	B
0130	Protéines	B30	B
0131	Potassium	B30	B
0133	Sodium	B30	B
	Calprotectine :	B650	B
	Cholestérol total	B23	B
	Ferritine	B201	B
	HbA1c	B112	B
	NFS	B90	B
	Triglycérides	B45	B
	VITAMINE D2 + D3	B374	B

Total des B : 1720

TOTAL DOSSIER : 2160.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux mille cent soixante dirhams .

LABORATOIRE IBN NAFIS
Dr. Jinane ZOUAKI
Docteur D'Etat En Pharmacie
Spécialiste en Biologie Médicale & PMA
TETOUAN

Angle Av. Yacoub El Mansour / Youssef Ibn Tachfine, REZ DE CHAUSSEE & 1^{er} Et. TETOUAN

RC: 23278 - IF: 83018200 - TP: 51013368 - CNSS: 7 296818 - ICE: 000507091000093

☎ 06 61 06 71 60 ☎ 05 39 96 11 51/56 - Fax: 05 39 96 11 48 ✉ ibnalnafistetouan@gmail.com

📱 @laboibnalnafistetouan

OUVERT 7 / 7 - 24 / 24

PRÉLÈVEMENT A DOMICILE



مختبر ابن النفيس للتحليلات الطبية

Laboratoire IBN AL NAFIS d'Analyses Médicales Spécialisées
FIV, ICSI, Congélation du sperme, Vitrication...
Biologie Moléculaire (PCR, RT-PCR ...)



LABORATOIRE CERTIFIÉ depuis 28/07/2021 EN SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ ISO 9001

Dr. Jinane ZOUAKI - Docteur d'Etat en Pharmacie.
SPÉCIALISTE: Universités de GRENADE & PARIS-SORBONNE
Ancienne Attachée à La Faculté de Pharmacie & à l'Hôpital Virgen de Las Nieves de Grenade

230308032 - Mme SAADIA CIN L124618 STITOU

BIOCHIMIE SANGUINE

SODIUM (Méthode Potentiométrie indirecte Beckman Coulter)	135 mmol/L	(135-145)
POTASSIUM (Méthode Potentiométrie indirecte Beckman Coulter)	4.6 mmol/L	(3.7-5.4)
CHLORE (Méthode Potentiométrie indirecte Beckman Coulter)	101 mmol/L	(97-111)
CALCIUM (Méthode o-CPC Beckman Coulter)	105.0 mg/L 2.61 mmol/L	(86.0-102.0) (2.14-2.54)
PROTEINES TOTALES (Méthode Biuret Beckman Coulter)	63.0 g/L	(60.0-80.0)
PHOSPHORE (Méthode Molybdate, UV Beckman Coulter)	29.0 mg/L 0.94 mmol/L	(25.0-50.0) (0.81-1.62)
GLYCEMIE A JEUN (Méthode Hékokinase-G6PDH Beckman Coulter)	0.99 g/L 5.49 mmol/L	(0.70-1.10) (3.89-6.11)
HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE (Technique HPLC TOSOH)	5.0 %	(4.0-6.0)

Interprétation des résultats selon la standardisation du NGSP :

HBA1C entre 4.0 et 6.0 % : intervalle non diabétique
HBA1C inférieur à 6.5 % : excellent équilibre glycémique (DNID)
HBA1C inférieur à 7.0 % : excellent équilibre glycémique (DID)
HBA1C entre 7.0 et 8.0 % : bon équilibre glycémique
HBA1C à 8 % : Action corrective suggérée

CHOLESTEROL TOTAL (Méthode CHOD-PAP Beckman Coulter)	2.11 g/L 5.46 mmol/L	(1.45-2.00) (3.75-5.17)
TRIGLYCERIDES (Méthode GPO-PAP Beckman Coulter)	1.41 g/L 1.59 mmol/L	(0.50-1.50) (0.57-1.70)
FERRITINE (IE FLUORESCENCE VIDAS)	262.80 ng/mL	(18.00-285.00)

LABORATOIRE IBN NAFIS
Dr. Jinane ZOUAKI
Docteur D'Etat En Pharmacie
Spécialiste en Biologie Médicale & PMA
TÉTOUAN

Angle Av. Yacoub El Mansour / Youssef Ibn Tachfine, REZ DE CHAUSSEE & 1^{er} Et. TÉTOUAN

RC: 2-3278 - IF: 83018200 - TP: 51013368 - CNSS: 7 296818 - ICE: 000507091000093

06 61 06 71 60 05 39 96 11 51/56 - Fax: 05 39 96 11 48 ibnalnafistetouan@gmail.com



@laboibnalnafistetouan

OUVERT 7 / 7 - 24 / 24

PRÉLÈVEMENT A DOMICILE



مختبر ابن النفيس للتحاليل الطبية

Laboratoire IBN AL NAFIS d'Analyses Médicales Spécialisées
FIV, ICSI, Congélation du sperme, Vitrification...
Biologie Moléculaire (PCR, RT-PCR ...)



LABORATOIRE CERTIFIÉ depuis 28/07/2021 EN SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ ISO 9001

Dr. Jinane ZOUAKI - Docteur d'Etat en Pharmacie.
SPÉCIALISTE: Universités de GRENADE & PARIS-SORBONNE
Ancienne Attachée à La Faculté de Pharmacie & à l'Hôpital Virgen de Las Nieves de Grenade

Date du prélèvement : 08-03-2023 à 10:11

Code patient : 230308032

Né(e) le : 21-01-1940 (83 ans)

Mme STITOU SAADIA CIN L124618

Dossier N° : 230308032

Prescripteur : Dr EZ ZEROUALI IMANE



HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME

(Fluorescence en Cytométrie de Flux sur SYSMEX-XN 350)

Globules rouges :	5.4	M/mm ³	(4.0-5.4)
Hémoglobine :	15.1	g/dL	(11.5-15.5)
Hématocrite :	44.2	%	(35.0-47.0)
VGM :	81.9	μ ³	(82.0-98.0)
TCMH :	28.0	pg	(28.0-32.0)
CCMH :	34.2	%	(30.0-36.5)
Globules blancs :	4 090	/mm ³	(4 000-10 000)
Poly. Neutrophiles :	59.3	%	(50.0-75.0)
Soit:	2 425	/mm ³	(1 800-7 500)
Poly. Eosinophiles :	2.2	%	(0.0-4.0)
Soit:	90	/mm ³	(0-400)
Poly. Basophiles :	1.0	%	(0.0-1.0)
Soit:	41	/mm ³	(<200)
Lymphocytes :	28.9	%	(25.0-35.0)
Soit:	1 182	/mm ³	(1 000-4 000)
Monocytes :	8.6	%	(2.0-8.0)
Soit:	352	/mm ³	(200-1 000)
Plaquettes	231 000	/mm ³	(150 000-400 000)

LABORATOIRE IBN NAFIS
Dr. Jinane ZOUAKI
Docteur D'Etat En Pharmacie
Spécialiste en Biologie Médicale & PMA
TETOUAN

Page 1 / 3

Angle Av. Yacoub El Mansour / Youssef Ibn Tachfine, REZ DE CHAUSSEE & 1^{er} Et. TETOUAN
RC: 23278 - IF: 83018200 - TP: 51013368 - CNSS: 7 296818 - ICE: 000507091000093
☎ 06 61 06 71 60 ☎ 05 39 96 11 51/56 - Fax: 05 39 96 11 48 ✉ ibnalnafistetouan@gmail.com



مختبر ابن النفيس للتحليلات الطبية

Laboratoire IBN AL NAFIS d'Analyses Médicales Spécialisées
FIV, ICSI, Congélation du sperme, Vitrifaction...
Biologie Moléculaire (PCR, RT-PCR ...)



LABORATOIRE CERTIFIÉ depuis 28/07/2021 EN SYSTÈME MANAGEMENT QUALITÉ ISO 9001

Dr. Jinane ZOUAKI - Docteur d'Etat en Pharmacie.

SPÉCIALISTE: Universités de GRENADE & PARIS-SORBONNE

Ancienne Attachée à La Faculté de Pharmacie & à l'Hôpital Virgen de Las Nieves de Grenade

230308032 - Mme SAADIA CIN L124618 STITOU

VITAMINES

VITAMINE 25(OH) D2 et 25 (OH)D3
(MINI - VIDAS)

20.3 nmol/l

Niveau	Plage nmol/l
Carence	<50
Insuffisant	50-74
Suffisant	75-250
Toxicité	>250

BIOLOGIE SPECIALISEE

Calprotectine Fécale

Résultat :

8.00 Ug/g

Interprétation:

Négatif: Inf à 50 µg/g

Zone Grise: 50 à 200 µg/g

Positif: Sup à 200 µg/g

Validé par : Dr. Jinane ZOUAKI

LABORATOIRE IBN NAFIS

Dr. Jinane ZOUAKI

Docteur D'Etat En Pharmacie

Spécialiste en Biologie Médicale & PMA

TÉTOUAN

Angle Av. Yacoub El Mansour / Youssef Ibn Tachfine, REZ DE CHAUSSEE & 1^{er} Et. TÉTOUAN

RC: 23278 - IF: 83018200 - TP: 51013368 - CNSS: 7 296818 - ICE: 000507091000093

06 61 06 71 60 05 39 96 11 51/56 - Fax: 05 39 96 11 48 ibnalnafistetouan@gmail.com



@laboibnalnafistetouan

OUVERT 7 / 7 - 24 / 24

PRÉLÈVEMENT A DOMICILE