

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horizon
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-799415

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 13301 Société : RAM
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : SADIK Mustapha
 Date de naissance : 28/12/1989
 Adresse : 14, EL Duffa, Casablanca
 Tél. : 06 20228643 Total des frais engagés : 1217,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/02/2023
 Nom et prénom du malade : Latifa SADIK
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint
 Nature de la maladie : grossesse
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 24/02/2023

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

MUPRAS

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24 JUL 2023		3	300 DH	INP : 0811162049 Dr. Fatima OUALI Gynécologie-Obstétrique Pôle Toulon, Quai des Colons, Ain Chok, Lot N°158, Zone Phlego Casablanca - Tél : 05 61 96 43 34

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourpisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AHMED RAYAN Dr. MALKI Nouredine Résidence Cité Essalam «Addoha» Im 77 N°1 - El Oulfa Tél/Fax : 05 22 89 83 34 - Casablanca	24/07/23	912,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []														
				MONTANTS DES SOINS []														
				DEBUT D'EXECUTION []														
				FIN D'EXECUTION []														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX []
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS []														
				DATE DU DEVIS []														
			DATE DE L'EXECUTION []															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Fatiha OUADIRGA

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Gynécologique, Maladie des seins
Coelioscopie - Colscopie - Hystérocopie
Stérilité - Procréation médicalement assistée



الدكتورة فاتحة واديرغا

إختصاصية في أمراض النساء و التوليد
جراحة السرطان - أمراض الثدي
التشخيص و الجراحة بالمنظار
العقم - المساعدة الطبية على الإنجاب

Casablanca, le 24 JUN. 2023 في الدار البيضاء،

FACTURE

Nom et Prénom : SBAA LATIFA

Examen : grossesse

Effectué le : 24-07-2023

Au prix de : # 300 DH #

Arrêtée la présente facture à la somme :

Three hundred cents

Signée :

Dr. Fatiha OUADIRGA
Gynécologie-Obstétrique
Piste Taddart, Quartier des Crêtes,
Ain Chok, Lot n° 158, 2ème étage
Casablanca - Tél : 05 22 21 21 37 - 06 61 96 43 54

Docteur Fatiha OUADIRGA

Spécialiste en Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Gynécologique, Maladie des seins
Coelioscopie - Coloscopie - Hystéroscopie
Stérilité - Procréation médicalement assistée



الدكتورة فاتحة واديرغا

إختصاصية في أمراض النساء و التوليد
جراحة السرطان - أمراض الثدي
التشخيص و الجراحة بالمنظار
العقم - المساعدة الطبية على الإنجاب

Casablanca, le 26/07/2013 في الدار البيضاء،

N° SBAA Fathe

119.00

1)

Regnacee b

1 b's

51.60

2)

Landegren b's

1 b's

249.00 + 3.

3)

Caeban

1 b's

1 b's

Amis

Dr. Fatiha OUADIRGA
Gynécologie Obstétrique
Piste Taddart Quartier des Crêtes
Ain Chok Lot n° 158 2ème étage
Casablanca - Tel. : 05 22 21 21 37 - 06 61 96 43 54

Merci d'avoir choisi Vitabiotics

A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

Visitez notre site

www.vitabiotics.com
 Numéro gratuit : 0800 980 90 60
 London NW2 7HF, England.
 Vitabiotics Ltd, 1 Aspley Way.

Contactez nous

Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus. également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme de produits. Vous y trouverez également les coordonnées de tous



VITABIOTICS
 SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Vitabiotics®

La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles, la gamme comprend :

- Jointace® Chondroline & Glucosamine Comprimés avec de l'extrait de gingembre.
- Jointace® Omega-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroline.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroline & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroline & huiles aromathérapeutiques.

Wellman® est une gamme pour soutenir les besoins

- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio-actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.

Wellman® Avancée n°1 pour les hommes

Tardyferon B9

Comprimé pelliculé
(Fer et acide folique)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
4802226

pharmacien pour tout conseil ou information, quelconque effet indésirable, parlez-en à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet qui vous mentionne dans cette notice. Voir rubrique 4. Si votre médecin si vous ne rassemblez aucune vous sentez moins bien.



TARDYFERON B9
30 comprimés pelliculés
Fer 50 mg / Acide folique 0,350 mg

Distribué par **Cooper Pharma**
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
Amino DAOUÏ - Pharmacien Responsable
PPV : 51,60 DH

ION B9, comprimé pelliculé et dans quels cas
ions à connaître avant de prendre TARDYFERON
YERFON B9, comprimé pelliculé ?
s'écouler éventuels ?
DYFERON B9, comprimé pelliculé ?
et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PRÉPARATIONS ANTIANÉMIQUES -
Code AIC : B03AD03

Apport de fer et d'acide folique.

Traitement préventif des carences en fer et en acide folique en cas de grossesse lorsqu'un apport alimentaire suffisant ne peut être assuré. Ne doit pas être utilisé dans la prévention primaire des risques d'anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural (AETN : spina bida...).

Tardyferon B9, comprimé pelliculé est indiqué seulement chez la femme enceinte.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON B9, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez plus de fer dans votre organisme qu'il ne vous faut.
- Si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer, ou causant une surcharge en fer (par exemple la thalassémie, l'anémie réfractaire, l'anémie par insuffisance médullaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON B9, comprimé pelliculé. En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

Informez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser TARDYFERON B9 :

• Si vous avez des difficultés à avaler.

• Si vous vous étouffez accidentellement en prenant un comprimé, veuillez contacter votre médecin dès que possible. C'est parce qu'il y a un risque de l'utérus et de rétrécissement de la bronche si le comprimé entre dans les voies respiratoires. Cela peut entraîner une toux persistante, des crachats sanglants et/ou un essoufflement, même si l'étouffement s'est produit des jours ou des mois avant que ces symptômes ne se manifestent. Par conséquent, vous devez être ouïcité d'urgence pour vous assurer que le comprimé n'endommage pas vos voies respiratoires. D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi de l'estomac et du tube digestif chez de rares patients âgés recevant un traitement à base de fer et souffrant d'une insuffisance rénale chronique (nouveau fonctionnement de votre rein, diminution importante du volume des urines), de diabète (taux élevé de sucre dans le sang) et/ou d'hypertension (augmentation de la pression artérielle). Cette coloration peut gêner une intervention chirurgicale ou niveau gastro-intestinal.

Si vous prenez TARDYFERON B9, comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de le traiter. Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON B9, comprimé pelliculé ne sera pas efficace.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et TARDYFERON B9, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En effet, certains médicaments ne peuvent pas être utilisés en même temps que le traitement par TARDYFERON B9, comprimé pelliculé, alors que d'autres nécessitent des changements spécifiques de dose ou de moment de prise par exemple.

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer, vous devez éviter de prendre TARDYFERON B9 comprimé pelliculé.
- Si vous prenez les médicaments suivants, vous devez séparer leurs administrations avec TARDYFERON B9 comprimé pelliculé d'au moins 2 heures :

- un médicament pour traiter les calculs urinaires infectieux (l'acide acétylsalicylique).
 - certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
 - des médicaments pour traiter une fatigue excessive (les bisphosphonates).
 - un médicament pour traiter une maladie des articulations (la pénicillamine).
 - un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
 - des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyl dopa, la lévodopa).
 - des produits contenant du zinc, du strontium et du calcium.
 - un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- En raison de la présence d'acide folique dans TARDYFERON B9, comprimé pelliculé, d'autres associations de médicaments nécessitent une précaution d'utilisation :
- Anticonvulsivant comme le phénobarbital, phénytoïne, topirémate, primidone.

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons Sans objet.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant le deuxième et troisième trimestre de la grossesse que si nécessaire sur les conseils de votre médecin.

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez la femme qui allaite.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est peu probable que l'utilisation de TARDYFERON B9, comprimé pelliculé puisse avoir une influence sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

TARDYFERON B9, comprimé pelliculé contient Sans objet.



كاريبان 10 ملغ/10 ملغ

كبسولات معدلة التحلل

كلوروهيدرات البيريديوكسين

لها تتضمن معلومات تهكم.

ن طبيبك أو الصيدلي أن يمدك بالمزيد من المعلومات.
أعراضه شبيهة بأعراضك، لأن ذلك قد يضر به.

رجة في هذا النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي. (انظر القسم 4).

Cariban® 10 mg/10 mg

Succinate de doxylamine / Chlorhydrate de pyridoxine
Gélules à libération modifiée. Boîte de 24



6 118001 440122



LOT T43 EXP 12-2024
PPV 249,00 DH

صف الدواء لعلاج أعراض الغثيان والقيء أثناء الحمل عند البالغين.
نات و"بيريديوكسين هيدروكلوريد". ينتمي سكسينات دوكسيلامين إلى مجموعة أدوية مضادات الهيستامين.

بيان

من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6):
المشتقة من الإيثانولامين (مثل ديفينهيدرامين أو الكاربينوكسامين)
الأمين (IMAO)، لأن كاريبان قد يزيد ويطلق الآثار الجانبية على الجهاز العصبي.

إذا كنت شديد الحساسية ضد مشتبات أوكسجين أحادي الأمين (IMAO)، لأن كاريبان قد يزيد ويطلق الآثار الجانبية على الجهاز العصبي.
إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب مثل مشتبات أوكسجين أحادي الأمين (IMAO)، لأن كاريبان قد يزيد ويطلق الآثار الجانبية على الجهاز العصبي.
إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب القوية (CYP450).
إذا كنت مصابا بالبرفيريا (اضطراب أيضي نادر للغاية).
إذا كنت تعاني من مشاكل وراثية مثل عدم تحمل الفركتوز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو نقص سوكاراز-إيزومالتاز.
إذا كان تعاني من القيء لسبب آخر.

التحذيرات والاحتياطات

استشر طبيبك

Cariban® 10 mg/10 mg

Gélules à libération modifiée, boîte de 24

Succinate de doxylamine / Chlorhydrate de pyridoxine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont les mêmes.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Cariban et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cariban?
3. Comment prendre Cariban?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Cariban?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Cariban et dans quel cas est-il utilisé?

Ce médicament appartient à la classe des médicaments appelés antiémétiques et antinauséux. Il est indiqué dans le traitement symptomatique des nausées et vomissements de la grossesse chez l'adulte.

Cariban contient deux composants («substances actives») : «succinate de doxylamine» et «chlorhydrate de pyridoxine». Le succinate de doxylamine appartient au groupe de médicaments antihistaminiques. Le chlorhydrate de pyridoxine est également connu sous le nom de vitamine B6.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cariban?

Ne prenez jamais Cariban:

- si vous êtes allergique à la doxylamine, à la pyridoxine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6);
- si vous êtes hypersensible aux antihistaminiques (médicaments contre les allergies) dérivés de l'éthanolamine (tels que la diphenhydramine ou la carboxamine);
- si vous prenez des antidépresseurs tels que des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), car Cariban peut accentuer et prolonger les effets indésirables sur le système nerveux;
- si vous prenez de puissants inhibiteurs des isoenzymes du CYP450;
- si vous souffrez de porphyrie (un trouble métabolique très rare);
- si vous présentez des problèmes héréditaires d'intolérance au fructose, de malabsorption du glucose-galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase;
- si vous avez des vomissements pour une autre raison.

Avertissements et précautions

Consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre Cariban.



Cariban® 10 mg/10 mg

Gélules à libération modifiée, boîte de 24

Succinate de doxylamine / Chlorhydrate de pyridoxine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de la maladie sont les mêmes.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice?

1. Qu'est-ce que Cariban et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cariban?
3. Comment prendre Cariban?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Cariban?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Cariban et dans quel cas est-il utilisé?

Ce médicament appartient à la classe des médicaments appelés antiémétiques et antinauséuxes. Il est indiqué dans le traitement symptomatique des nausées et vomissements de la grossesse chez l'adulte.

Cariban contient deux composants («substances actives») : «succinate de doxylamine» et «chlorhydrate de pyridoxine». Le succinate de doxylamine appartient au groupe de médicaments antihistaminiques. Le chlorhydrate de pyridoxine est également connu sous le nom de vitamine B6.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cariban?

Ne prenez jamais Cariban:

- si vous êtes allergique à la doxylamine, à la pyridoxine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6);
- si vous êtes hypersensible aux antihistaminiques (médicaments contre les allergies) dérivés de l'éthanolamine (tels que la diphenhydramine ou la carboxamine);
- si vous prenez des antidépresseurs tels que des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), car Cariban peut accentuer et prolonger les effets indésirables sur le système nerveux;
- si vous prenez de puissants inhibiteurs des isoenzymes du CYP450;
- si vous souffrez de porphyrie (un trouble métabolique très rare);
- si vous présentez des problèmes héréditaires d'intolérance au fructose, de malabsorption du glucose-galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase;
- si vous avez des vomissements pour une autre raison.

Avvertissements et précautions

Consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre Cariban.

