

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-791655

185591

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 509 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : Veuve de KHATTABI Brahim
 Nom & Prénom : Noumen Khaddouj
 Date de naissance : 1/1/1963
 Adresse : Lot M4 Thami impasse 2 NO 15 Gulfa Casa
 Tél. : 06 19 89 16 18 Total des frais engagés : 786,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Lamia HASSANI CHERKAOUI
Pneumologue - Allergologue

Date de consultation : 16/11/2023

Nom et prénom du malade : Noumen Khaddouj Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection Respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOIET ADHERENT

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/11/23		03	200	INP : 091157111 Dr. LARBI HASSANI THERKAOTI

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/11/2023	336,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	16/11/23	220	200

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES																		
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																		
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.																		
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <th colspan="2">G</th> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </tbody> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	G		00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	G																	
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Lamia HASSANI CHERKAOU

Pneumo-Allergologue

Diplômée de la faculté de Médecine de l'Université Hassan II de Casablanca
Ancienne Interne de CHU Ibn Rochd
Ancienne Résidente au service de pneumologie Hôpital 20 Août
Ancienne pneumologue au CDTMR Saâda à Hay Mohammadi
Ex. Délégué du Ministère de la santé à la préfecture d'Arrondissement Ain Chock

Spécialiste des Maladies Respiratoires

Asthme - Allergies Respiratoires - Tuberculose - Testes Cutanés
Pathologie du Sommeil - Sevrage Tabagique - Spirométrie



الدكتورة لمياء حساني الشرقاوي

طبيبة إختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

خريجة جامعة الحسن الثاني للطب والصيدلة بالدار البيضاء

طبيبة داخلية سابقا بالمستشفى الجامعي ابن رشد

طبيبة أمراض الجهاز التنفسي سابقا بمستشفى 20 غشت

طبيبة أمراض الجهاز التنفسي سابقا بمركز تشخيص داء السل

والأمراض التنفسية بالمحي المحمدي

مندوبة وزارة الصحة سابقا بعائلة مقاطعة عين الشق

إختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي الضيقة داء السل

أمراض الحساسية الإقلاع عن التدخين أمراض النوم

Casablanca Le في الدار البيضاء

16/11/2023

Note d'Honoraires

Nom et Prénom: **Mme Moumen Khaddouj**

- Radiographie pulmonaire de face (Z20) : 200 Dirhams

(Deux Cent Dirhams).

الدكتورة لمياء حساني الشرقاوي
Dr. Lamia HASSANI CHERKAOU
Pneumo-Allergologue

ICE :002135106000014

Patente :36000455 INPE : 091157115

485, حي الألفة شارع أم الربيع أمام مختبر كريم لاب فوق وكالة البنك الشعبي الدار البيضاء

485, Bd. Oued Oum Rabii Oulfa au dessus de l'Agence de la Banque Populaire
en face du Laboratoire << KARIMLAB >>, Casablanca

☎ 05 22 69 24 21 / Urgences : 06 61 89 84 25 / M hassani.lamia@yahoo.fr

Dr. Lamia HASSANI CHERKAoui

Pneumo-Allergologue

Diplômée de la faculté de Médecine de l'Université Hassan II de Casablanca
Ancienne Interne de CHU Ibn Rochd
Ancienne Résidente au service de pneumologie Hôpital 20 Août
Ancienne pneumologue au CDTMR Saâda à Hay Mohammadi
Ex. Délégué du Ministère de la santé à la préfecture d'Arrondissement Ain Chock

Spécialiste des Maladies Respiratoires
Asthme - Allergies Respiratoires - Tuberculose - Testes Cutanés
Pathologie du Sommeil - Sevrage Tabagique - Spirométrie



الدكتورة لمياء حساني الشرقاوي

طبيبة إختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

خريجة جامعة الحسن الثاني للطب والصيدلة بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بالمستشفى الجامعي ابن رشد
طبيبة أمراض الجهاز التنفسي سابقا بمستشفى 20 غشت
طبيبة أمراض الجهاز التنفسي سابقا بمركز تشخيص داء السل
والأمراض التنفسية بالحي المحمدي

مندوبة وزارة الصحة سابقا بعالة مقاطعة عين الشق

إختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي الضيقة داء السل
أمراض الحساسية الإقلاع عن التدخين أمراض النوم

Casablanca Le 16/11/2023 في الدار البيضاء

Patient : **Mme Moumen Khaddouj**

Examen réalisé : Radiographie Pulmonaire de face

Compte Rendu

- Epaississement bronchique hilo-basale bilatérale
- Absence de foyer parenchymateux évolutif.
- Culs de sac pleuraux libres.
- Silhouette cardio-médiastinale sans particularités.

الدكتورة لمياء حساني الشرقاوي
Dr. Lamia HASSANI CHERKAoui
Pneumo-Allergologue


Dr. Lamia HASSANI CHERKAOU

Pneumo-Allergologue

Diplômée de la faculté de Médecine de l'Université Hassan II de Casablanca
Ancienne Interne de CHU Ibn Rochd
Ancienne Résidente au service de pneumologie Hôpital 20 Août
Ancienne pneumologue au CDTMR Saâda à Hay Mohammadi
Ex. Délégué du Ministère de la santé à la préfecture d'Arrondissement Ain Chock

Spécialiste des Maladies Respiratoires

Asthme - Allergies Respiratoires - Tuberculose - Testes Cutanés
Pathologie du Sommeil - Sevrage Tabagique - Spirométrie



الدكتورة لمياء حساني الشرقاوي

طبيبة إختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

خريجة جامعة الحسن الثاني للطب والصيدلة بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بالمستشفى الجامعي إين رشد
طبيبة أمراض الجهاز التنفسي سابقا بمستشفى 20 غشت
طبيبة أمراض الجهاز التنفسي سابقا بمركز تشخيص داء السل
والأمراض التنفسية بالحي المحمدي

مندوبة وزارة الصحة سابقا بعالة مقاطعة عين الشق

إختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي الضيقة داء السل
أمراض الحساسية الإقلاع عن التدخين أمراض النوم

Casablanca Le في الدار البيضاء

16/11/2023

Mme Moumen Khaddouj

- 3420
16490
1101
2690
33650
- 1) S-Cort 20 mg
03 cp le matin après repas pendant 06 jours
 - 2) Zephirus 120
01 gélule à inhaler matin et soir pendant 01 mois
Se rincer la bouche après usage
 - 3) Avaquin 500
01 cp/jour pendant 07 jours
 - 4) Vitamine c 1000 Bottu
01 cp le matin

A revoir dans 15 jours

الدكتورة لمياء حساني الشرقاوي
Dr. Lamia HASSANI CHERKAOU
Signature

PHARMACIE AL ATFAI
Hicham HEIKEL
Docteur en Pharmacie
FRANCE
31, Bd. H24 - Lot My Thami
Oulfa
CASABLANCA
Tél: 022 91.95.98

485, حي الألفه شارع أم الربيع أمام مختبر كريم لاب فوق وكالة البنك الشعبي الدار البيضاء

485, Bd. Oued Oum Rabii Oulfa au dessus de l'Agence de la Banque Populaire
en face du Laboratoire << KARIMLAB >>, Casablanca

☎ 05 22 69 24 21 / Urgences : 06 61 89 84 25 / Mhassani.lamia@yahoo.fr

إس-كورت[®] بريدنيزولون 20 ملغ علبة تحتوي على 20 قرصا فوارا قابل للكسر

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة بأكملها قبل استعمال هذا الدواء.

أحتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قراءتها من جديد.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لقد تم وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي. لا تقم بإعطائه لشخص آخر، حتى في حال وجود أعراض مشابهة، لأنك قد تسبب الضرر له.

إذا شعرت بأي تأثير غير مرغوب فيه، أخبر الطبيب أو الصيدلي. كما ينطبق ذلك على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يذكر في هذه النشرة.

التركيبية:

بريدنيزولون

20.00 ملغ

31.44 ملغ

على شكل بريدنيزولون ميطاسولفونزوات صوديوم

- السواغات : كمية كافية لقرص فوار قابل للكسر

- سواغات ذات تأثير ملحوظ : لاكتوز - صوديوم - صوريول.

الصنف الصيدلي العلاجي:

هذا الدواء عبارة عن كورتكويد.

الاستعمالات العلاجية:

يوجب هذا الدواء في بعض الأمراض، حيث يستعمل نظرا لمفعوله كمضاد للالتهابات.

الجرعات: كيفية و/أو طريقة الاستعمال. وثيرة الاستعمال. مدة العلاج.

خاص بالبالغين والأطفال الذين يفوق وزنهم 10 كغ.

إس-كورت 20 ملغ، أقراص فوارا قابلة للكسر، بلائم حالات العلاج الإستعجالي، أو العلاج قصير المدى و التي تتطلب جرعات متوسطة أو

قوية لدى البالغين والأطفال الذين يفوق وزنهم 10 كغ.

يتم تحديد الجرعة من طرف طبيبك حسب وزنك والمرض الواجب علاجه.

إنها محددة لكم شخصيا بصفة حصرية.

إنه أمر بالغ الأهمية أن تتابعوا علاجكم بانتظام وأن لا تغيروه، ولا توقفوه فجأة دون استشارة طبيبك.

إذا أحسست أن إس-كورت 20 ملغ، أقراص فوارا قابلة للكسر، لها مفعول قوي جدا أو ضعيف جدا، استشيروا طبيبك أو صيدليكم.

يؤخذ عن طريق الفم

يجب إذابة الأقراص قبل تناولها، ومن الأفضل أخذها دفعة واحدة في الصباح.

يتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب.

في حالة علاج طويل المدى، لا توقفوا العلاج بصورة مفاجئة، ولكن امتثلوا للنصائح طبيبك من أجل نقص الجرعة.

موانع الاستعمال:

لا يجب تناول هذا الدواء في الحالات التالية :

في معظم حالات العدوى.

بعض الأمراض الفيروسية أثناء تطورها (التهاب الكبد الفيروسي، الهربس، جدري الماء، القوباء النطاقية)،

بعض الاضطرابات العقلية غير المعالجة

تطعيم بلقاحات حية

الحساسية لأحد عناصره

في حالة الشك من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التأثيرات غير المرغوب فيها:

كمياقي الأدوية، يمكن أن تكون لأقراص إس-كورت 20 ملغ، فوارا وقابلة للكسر آثار غير مرغوبة :

هذا الدواء ضروري وغالبا ما يتقبله الجسم إذا تم الإمتثال للنصائح الخاصة بالحمية.

غير أنه يمكن أن يسبب، حسب الجرعة ومدة العلاج، في آثار أكثر أو أقل إزعاجا. ومن هذه الآثار الأكثر شيوعا:

تغير بعض المفايس البيولوجية (ملح، سكر، بوتاسيوم) التي قد تستلزم حمية أو علاجا إضافيا،

ظهور كدمات.

ارتفاع ضغط الدم، إحتباس الماء والملح الذي قد يؤدي إلى فشل في القلب.

تهيج واضطرابات النوم.

متلازمة كوشينغ: انتفاخ واحمرار الوجه، زيادة الوزن، زيادة نمو الشعر

هشاشة العظام.

إصابة مؤلمة في العظام على مستوى مفصل الورك

وقد تمت ملاحظة آثار أخرى نادرة جدا :

عدم كفاية إفراز الغدة الكظرية.

اضطرابات النمو عند الطفل.

اضطرابات دم العيض.

ضعف العضلات، ترقق الأوتار خصوصا في حالة إقترانه بالفلوروكينولونات

القرحة و اضطرابات أخرى هضمية.

S-CORT® prednisolone 20mg

Boîte de 20 comprimés effervescents sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

Pour un comprimé effervescent sécable :

Substance active :

Prednisolone

20,00 mg

Sous forme de métasulfobenzozoate sodique de prednisolone

31,44 mg

Excipients :

q.s.p. 1 comprimé effervescent sécable

Excipients à effet notoire : lactose, sodium et sorbitol.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE.

(H: Hormones systémiques non sexuelles).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

POSOLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 10 KG.

S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée.

Elle est strictement individuelle.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les comprimés doivent être dissous avant d'être administrés, de préférence au cours du repas, en une prise le matin.

Durée du traitement

Elle est déterminée par votre médecin.

En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais S-CORT 20 mg, comprimé effervescent sécable dans les cas suivants :

- la plupart des infections,
- certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, etc.),
- certains troubles mentaux non traités,
- vaccination par des vaccins vivants,
- si vous êtes allergique à la prednisolone.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE CONSULTER VOTRE MEDICIN.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments,

bien que tout le monde n'y soit pas sensible,

Ce médicament, indispensable,

Il peut néanmoins entraîner, selon les cas, les effets suivants :

Les plus fréquemment rencontrés sont :

- modification de certains paramètres de l'analyse sanguine,
- apparition de bleus,
- élévation de la tension artérielle,
- troubles de l'humeur : excitation, nervosité, dépression,
- syndrome de Cushing : une prise de poids, une poussée excessive des cheveux, une poussée excessive des ongles,
- fragilité osseuse : ostéoporose, fractures,
- atteintes douloureuses des os au niveau du bassin, de la hanche (ostéonécrose).

D'autres effets beaucoup plus rares, ont été observés :

- risque d'insuffisance de sécrétion de la glande surrénale,
- retard de croissance chez l'enfant,
- troubles des règles,
- troubles de la vision.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

VOTRE PHARMACIEN.

l'absence d'avoir des effets indésirables,

et notamment le régime.

en régime ou un traitement

diabète.

ement et une rougeur du



des infections bactériennes (antibiotiques de la famille des « macrolides », tels que l'érythromycine, l'azithromycine et la clarithromycine).
• Probenécide - utilisé pour la goutte - et cimetidine - utilisée pour les ulcères et les brûlures d'estomac, il faut être particulièrement prudent lorsqu'on prend l'un ou l'autre de ces médicaments avec **AVAUQUIN®**.
Si vous avez des problèmes rénaux, votre médecin pourra vous donner une dose plus faible.

Ne prenez pas AVAUQUIN® comprimé en même temps que les médicaments suivants. Ceci car le mode d'action de AVAUQUIN® comprimé peut en être affecté :

- Comprimés de fer (pour l'anémie), suppléments à base de zinc, antacides contenant du magnésium ou de l'aluminium (pour l'acidité ou les brûlures gastriques), didanosine ou sucralfate (pour les ulcères de l'estomac).

Tests urinaires pour détecter les opiacés

Chez les personnes prenant **AVAUQUIN®**, les tests urinaires peuvent donner des résultats « faussement positifs » lors de la détection des antalgiques forts appelés « opiacés ». Si votre médecin vous a prescrit un test urinaire, prévenez-le que vous prenez **AVAUQUIN®**.

Tests de la tuberculose
Ce médicament peut rendre des résultats « faussement négatifs » lors de certains tests utilisés au laboratoire pour rechercher les bactéries responsables de la tuberculose.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse et allaitement :

Ne prenez pas ce médicament si :

- Vous êtes enceinte, vous pourriez être enceinte ou vous pensez que vous pouvez être enceinte.

• Vous allaitez ou vous avez prévu d'allaiter.

IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

EFFETS SUR LA CAPACITÉ DE CONDUIRE DES VÉHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Vous pouvez présenter des effets indésirables après avoir pris ce médicament, notamment des sensations d'étourdissement, de somnolence, une sensation d'avoir la tête qui tourne (vertiges) ou des modifications de la vision. Certains de ces effets indésirables peuvent affecter votre capacité à vous concentrer et votre vitesse de réaction. Si ceci se produit, ne conduisez pas ou n'effectuez aucun travail qui nécessite un niveau d'attention élevé.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de **AVAUQUIN®**, comprimé pelliculé sécable, que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris accidentellement plus de comprimés que vous n'auriez dû, prévenez un médecin ou demandez un autre avis médical immédiatement. Prenez la boîte de médicaments avec vous. Ceci afin que le médecin sache ce que vous avez pris. Les effets suivants peuvent survenir : crises d'épilepsie (convulsions), sensation de confusion, étourdissements, diminution de la conscience, tremblements et problèmes cardiaques - entraînant des battements de cœur irréguliers ainsi qu'une sensation de malaise (nausées) ou de brûlures d'estomac.

INFORMEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONDUITE À TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ÉTÉ OMISE.

Si vous oubliez de prendre **AVAUQUIN®** :

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez à moins que le moment de votre prochaine dose ne soit très proche. Ne doublez pas la dose suivante pour compenser la dose oubliée.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE :

N'arrêtez pas de prendre **AVAUQUIN®** seulement parce que vous vous sentez mieux. Il est important que vous finissiez le traitement par comprimés que le médecin vous a prescrit. Si vous arrêtez trop tôt de prendre les comprimés, l'infection peut revenir, votre état peut s'aggraver ou les bactéries peuvent devenir résistantes au médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

NOM, ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR, LE TITULAIRE DE L'AMM AU MAROC ET FABRICANT :

• **POLYMEDIC**

Rue Amyot d'Inville, Quartier Arsallane

Casablanca-Maroc

Dr. T. BELABDA - Pharmacien Responsable

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE

Avril 2016

• Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fénibène, le kétoprofène, l'indométacine. Vous devez éviter les risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) s'ils sont pris avec **AVAUQUIN®**.

• Ciclosporine - utilisée après les transplantations d'organes. Vous pouvez avoir plus de risques de présenter les effets indésirables de la ciclosporine.

• Médicaments connus pour pouvoir modifier le rythme cardiaque. Ceci comprend les médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque (antiarythmiques tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide, sotalol, dofétilide, ibutilide et amiodarone), pour la dépression (antidépresseurs tricycliques, tels que l'imipramine et l'imipramine), pour les troubles psychiatriques (antipsychotiques) et pour

• Corticoïdes, parfois appelés stéroïdes - utilisés contre l'inflammation. Vous avez plus de risques de développer une inflammation et/ou une rupture de vos tendons.

• Warfarine - utilisée pour fluidifier le sang. Vous pouvez présenter plus de risques de saignements. Votre médecin vous fera faire des analyses de sang pour surveiller l'indométacine. Vous devez éviter les risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) s'ils sont pris avec **AVAUQUIN®**.

• Théophylline - utilisée pour les problèmes respiratoires. Vous devez éviter les risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) si vous la prenez avec **AVAUQUIN®**.

• Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) - utilisés contre la douleur et l'inflammation, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, le fénibène, le kétoprofène, l'indométacine. Vous devez éviter les risques de faire une crise d'épilepsie (convulsion) s'ils sont pris avec **AVAUQUIN®**.

• Ciclosporine - utilisée après les transplantations d'organes. Vous pouvez avoir plus de risques de présenter les effets indésirables de la ciclosporine.

• Médicaments connus pour pouvoir modifier le rythme cardiaque. Ceci comprend les médicaments utilisés pour les anomalies du rythme cardiaque (antiarythmiques tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide, sotalol, dofétilide, ibutilide et amiodarone), pour la dépression (antidépresseurs tricycliques, tels que l'imipramine et l'imipramine), pour les troubles psychiatriques (antipsychotiques) et pour

- استعملوا الجواهر
 - استعملوا الجواهر
 - استعملوا الجواهر

والبقية، باصق ما يمكن. ملاحظة: عند الاستشاق في الجهاز، تنور الكسولة حول نفسها في غرفة الجهاز وتسمع اهتزازها. هذا النواء له طعم حلو.



ANS SUCRE comprimés effervescents et VITA C 100®

l'accroît ou persiste après 1 mois de traitement ou si elle
manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin
ancien

et légèrement stimulant, il est souhaitable de ne pas prendre de journée.

de journée. En parallèle, il est souhaitable de ne pas prendre les apports en vitamines et minéraux issus d'autres sources, les aliments enrichis et les compléments alimentaires (e).

Augmente l'absorption du fer par votre organisme. En cas de maladie héréditaire se caractérisant par une surcharge en fer, consultez votre médecin car l'utilisation de ce médicament doit faire l'objet de recommandations strictes.

te déshydrogénase (maladie héréditaire des globules
ses élevées en vitamine C (supérieure à 1 gramme par jour)
d'apparition d'une anémie hémolytique (destruction des

ut fausser les résultats de certaines analyses biologiques, de contrôle du glucose sanguin et urinaire, avertissez votre sont prévus.

comprimés effervescents

contient 307 mg de sodium par comprimé effervescent. A
chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en

En l'absence de saccharose, ce médicament ne peut être administré
présentant une intolérance au fructose, un syndrome de
glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase
(très rares).

contient 441,5 mg de saccharose par comprimé effervescent
compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en

contient un agent colorant azoïque (Jaune orangé S E 110) et réactions allergiques.

NS SUCRE comprimés effervescents
contient 333 g

contient 377,3 mg de sodium par comprimé effervescent. A
chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en

contient 2,24 mg d'aspartam par comprimé effervescent. C'est une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare dans laquelle l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée

contient un agent colorant azoïque (Jaune orangé S E110) et
des réactions allergiques.

escents »

médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

decin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou
contient un autre médicament.

contient de la vitamine C. D'autres médicaments en
s'associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales

sons (Interactions avec les aliments et les boissons)

les apports en vitamines et minéraux, issus des aliments complémentaires.

ant la grossesse et l'allaitement - Fertilité

Intente ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou
esse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant
licament.

caution, il est préférable d'éviter l'utilisation de la vitamine C.

Fertilité

Il n'existe pas de données relatives au humaine.

- Effets sur l'aptitude à conduire un v
VITA C 1000® comprimés effervescent
effervescent n'a aucun effet ou qu'un
un véhicule ou à utiliser des machines.

- Excipients à effets notoires
VITA C 1000® comprimés effervescent

Sodium : 307 mg par comprimé effervescent
Saccharose : 441,5 mg par comprimé effervescent
Colorant azoïque jaune orangé S (E110)

VITA C 1000® SANS SUCRE comprimé
Sodium : 377,3 mg par comprimé effervescent

Aspartam.
Colorant azoïque jaune orangé S (E110)

**3 - COMMENT PRENDRE VITA C 1000
VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉ**

- Posologie, mode et/ou voie d'administration et durée du traitement
 Veuillez à toujours prendre ce médicament de cette notice ou les indications de auprès de votre médecin ou pharmacien

Posologie
RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE

La dose recommandée est de 1 compri

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Le comprimé effervescent doit être dissous

Durée de traitement
La durée de traitement est limitée à 1 n

- La barre de cassure n'est pas destinée

- Si vous avez pris plus de VITA C 1000[®] SANS SUCRE comprimés (Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage)
Les symptômes généraux d'un surdosage sont les troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements.

La consommation chronique de doses supérieures à 1 g/jour peut aggraver une surcharge en fer chez les patients atteints d'hémochromatose. Chez les patients atteints d'hémochromatose, des doses supérieures à 1 g/jour en vitamine C peuvent aggraver les symptômes digestifs (brûlures gastriques, diarrhée, nausées, insuffisance rénale, nécrose tubéreuse des globules rouges) chez les sujets déficients en ascorbate. Si ces symptômes apparaissent, consultez votre pharmacien.

- Si vous oubliez de prendre VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés, ne prenez pas de dose double pour compenser l'omission d'une ou plusieurs doses. Ne prenez pas de dose double pour compenser la prise d'une dose si vous avez oublié de prendre.

- Si vous arrêtez de prendre VITA ou VITA C 1000* SANS SUCRE (syndrome de sevrage)

Si vous avez d'autres questions sur l'usage de la pilule, consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIR.

Comme tous les médicaments, ces mé
indésirables, mais ils ne surviennent pa

Vita C 1000®

(Acide ascorbique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 10

VITA C 1000®, Comprimés effervescents : Boîte de 20 (2 tubes de 10)

VITA C 1000® SANS SUCRE, Comprimés effervescents : Boîte de 10

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.

- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents et dans quel cas sont-ils utilisés ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?

3. Comment prendre VITA C 1000® Comprimés effervescents ou VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver VITA C 1000® Comprimés effervescents et VITA C 1000® SANS SUCRE Comprimés effervescents ?

6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE VITA C 1000® COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET VITA C 1000® SANS SUCRE COMPRIMÉS EFFERVESCENTS ET DANS QUELS CAS SONT-ILS UTILISÉS ?

- Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité

ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), NON ASSOCIÉE - code ATC : A11GA01.

- Indications thérapeutiques

Ce médicament contient de la vitamine C.

Il est indiqué dans les états de fatigue passagers de l'adulte et de l'enfant de plus de 15 ans.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 1 mois de traitement.

2 - QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONS ?

VITA C 1000® SANS SUCRE

Si votre médecin vous a prescrit ce médicament, contactez votre pharmacien pour plus d'informations.

- Ne prenez pas de VITA C 1000® SANS SUCRE si vous êtes allergique à l'acide ascorbique ou à l'un des excipients.

- si vous êtes atteint d'insuffisance rénale.

- si vous êtes atteint d'hyperoxalémie.

- si vous êtes atteint d'hypercalcémie.

- si vous êtes atteint d'hypernatrémie.

- si vous êtes atteint d'hyperkaliémie.

- si vous êtes atteint d'hyperphosphatémie.

- si vous êtes atteint d'hyperuricémie.

- si vous êtes atteint d'hyperlipidémie.

- si vous êtes atteint d'hypercholestérolémie.

- si vous êtes atteint d'hypertriglycéridémie.

- si vous êtes atteint d'hypercholestérolémie.

- si vous êtes atteint d'hypertriglycéridémie.

- si vous êtes atteint d'hypercholestérolémie.

- si vous êtes atteint d'hypertriglycéridémie.

- si vous êtes atteint d'hypercholestérolémie.

- si vous êtes atteint d'hypertriglycéridémie.

- si vous êtes atteint d'hypercholestérolémie.

- si vous êtes atteint d'hypertriglycéridémie.

- si vous êtes atteint d'hypercholestérolémie.

- si vous êtes atteint d'hypertriglycéridémie.

Vita C 1000®

PPU 26DH90

EXP
LOT

08/2026
36037 15

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Si votre fatigue s'accompagne de maux de tête ou de votre pharmacien.

• En raison d'un effet indésirable de la vitamine C en fin de traitement.

• Prendre en compte les médicaments comme les médicaments à risque de surdosage.

• La vitamine C agit sur l'hémochromatose (fer), adressez-vous à votre médecin pour l'objet de précaution.

• La vitamine C agit sur le glucose-6-phosphate (glucose-6-phosphate), car des déficiences favorisent le risque de globules rouges.

• La vitamine C peut provoquer des troubles de la motricité si des tests sont effectués.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris avec du jus de citron ou du jus d'orange.

• En raison de la présence de sucre chez les patients atteints de diabète (maladies héréditaires).

• Ce médicament doit être pris avec du sucre ou de l'eau.

• Ce médicament peut provoquer des troubles de la motricité si des tests sont effectués.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris avec du jus de citron ou du jus d'orange.

• Ce médicament doit être pris avec du sucre ou de l'eau.

• Ce médicament peut provoquer des troubles de la motricité si des tests sont effectués.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris avec du jus de citron ou du jus d'orange.

• Ce médicament doit être pris avec du sucre ou de l'eau.

• Ce médicament peut provoquer des troubles de la motricité si des tests sont effectués.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris avec du jus de citron ou du jus d'orange.

• Ce médicament doit être pris avec du sucre ou de l'eau.

• Ce médicament peut provoquer des troubles de la motricité si des tests sont effectués.

• VITA C 1000® SANS SUCRE comprimés effervescents

• Ce médicament doit être pris avec du jus de citron ou du jus d'orange.