

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

188330

Déclaration de Maladie

M23- N° 0033872

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 6961

Société :

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : Enieui MOHAMMED

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0661070389

Total des frais engagés : 621,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. BOUMHAOUSS Khadija
Médecine Générale
1er Etage Imm. N°7 Groupe B
ATTAAOUN Hay Hassani - Cas
05.22.89.02.76

Date de consultation : 25/12/2023

Nom et prénom du malade : Dr. BOUMHAOUSS Khadija

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☒ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Rhinopharyngite chronique

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 25/12/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/12/23	C	1	150,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	25/12/23	471,20
Pharmacie Naïma		Pharmacie Naïma
		IMP: 02014569

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				Coefficient DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE															
	<table> <tr> <td>H</td><td>25533412</td><td>21433552</td></tr> <tr> <td>D</td><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>G</td><td>00000000</td><td>00000000</td></tr> <tr> <td>B</td><td>35533411</td><td>11433553</td></tr> </table>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	G	00000000	00000000	B	35533411	11433553	Coefficient DES TRAVAUX
	H	25533412	21433552													
	D	00000000	00000000													
	G	00000000	00000000													
	B	35533411	11433553													
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS												
				DATE DU DEVIS												
				DATE DE L'EXECUTION												

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

40,80 Zinaskin 45mg.



55,10 1cpt de voir → 10;

6) D-Cure gtt



10 gtt (j → 10)

Dr. BOUMHAOUSS Khadija
Médecine Générale
1er Etage Imm. N°1 Groupe 5
ATTAAOUN Hay Hassani - Casa
05 22.89.02.76

471,20

ZINASKIN® 45 mg

PPV 40DH90 EXP 06/2025
LOT 10058 63

20 comprimés effervescents



D-CURE®

2400 UI, Solution buvable en gouttes

Cholécalciférol
(Vitamine D3)



Lot n° : 55,10

EXP :

PPV :



6118001320158



Dr BOUMHAOUSS Khadija

Diplômée de la FMPC

Certificat de Nutrition à Sup Santé

Médecine Générale
Santé Maternelle et Infantile
Nutrition
Diabète
Suivi de Grossesse
Échographie

25/12/2023

Mme DOUMERI Benchora

168,20

1) Augmentin 1 cp

1 cp + 2 l;

14,00

2) Doliprane 1000

79,00

3) Doxycycline 1 cp/6h → 3

Addition cp

114,00

4) Swatonsus ampbour. 1 cp/; le matin → 10j

10 cp/; le matin → 10j



pour suspension

comprimé pelliculé

avant de prendre ce
médicament pour vous.

consultez votre médecin ou votre pharmacien.
Si vous avez déjà été traité par ce médicament, ne
prenez pas ce médicament, même si les signes de leur
maladie ont disparu. Marquez un effet indésirable non
habituel à votre pharmacien.

Si vous prenez
AUGMENTIN ?

NE L'UTILISEZ PAS
si vous prenez des médicaments
qui contiennent des inhibiteurs de la

coagulation des infections. Il contient
de la pénicilline. L'amoxicilline
et l'acide clavulanique, qui peuvent parfois arrêter
la croissance de la bactérie (antibiotique) empêche cette

de guérir les infections suivantes :

infections dentaires,

AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?
Si vous prenez des médicaments
qui contiennent des inhibiteurs de la
coagulation buvable en sachet-dose.

Si vous prenez de la pénicilline ou à l'un des
signes mentionnés dans la rubrique 6,
(d'hypersensibilité) à un autre
médicament du visage ou du cou,
ou un ictère (jaunissement de la

des situations mentionnées :

consultez votre pharmacien avant de prendre

de prendre AUGMENTIN si vous :

consultez votre pharmacien avant de prendre

de la bactérie responsable de
l'infection différent d'AUGMENTIN ou

des effets secondaires graves,
comme l'inflammation du gros intestin.
Signes symptomatiques afin de réduire
le risque, à la rubrique 4.

rouges ou explorations
du glucose), vous devez informer
votre pharmacien. En effet, AUGMENTIN peut influencer

si vous avez récemment pris ou pourriez

prendre AUGMENTIN, le risque de

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte), votre médecin peut décider
d'ajuster votre dose d'AUGMENTIN.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont
pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.
AUGMENTIN peut influencer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter le
cancer ou les maladies rhumatismales).

AUGMENTIN peut influencer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le
rejet de greffe d'organes).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez
une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce
médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à
conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

AUGMENTIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose
(Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) contient de l'aspartam (E951), de
l'alcool benzylique, de la maltodextrine (glucose) et du sodium :

- Ce médicament contient 30 mg d'aspartam par sachet. L'aspartam contient une source
de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie
(PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne
pouvant être éliminée correctement.
- Ce médicament contient 0,0001176 mg d'alcool benzylique par sachet. L'alcool
benzylique peut provoquer des réactions allergiques. AUGMENTIN contient de la
maltodextrine (glucose). Si votre médecin vous a dit que vous avez une intolérance à
certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par sachet, c.-à-d. qu'il est
essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose habituelle : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62.5mg trois fois par jour
- Dose inférieure : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62.5mg deux fois par jour.

Enfants pesant moins de 40 kg

Les sachets AUGMENTIN 1 g/125 mg ne sont pas recommandés.

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec Augmentin en
suspension buvable ou en sachet 500mg/62.5mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des
comprimés de Augmentin à des enfants pesant moins de 40 kg.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le
médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être
nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

Mode d'administration

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être
espacées d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne prenez pas AUGMENTIN pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes persistent,
consultez de nouveau un médecin.

Augmentin 1g/125mg sachets :

- Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un
demi-verre d'eau.
- Avalez le mélange au début d'un repas ou un peu avant.

Augmentin 500mg/62.5mg comprimés :

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.

Si vous avez pris plus d'AUGMENTIN que vous n'auriez dû :

La prise d'une quantité excessive d'AUGMENTIN peut entraîner des maux de ventre (nausées,
vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus tôt possible.
Montrez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN :

Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ
4 heures avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN :

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous vous
sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines
bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus
d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

PPU : 168,20 DH
LOT : 652430
PER : 05/25



AUGMENTIN 1g/125 mg, ADULTES, poudre
en sachet-dose
AUGMENTIN 500 mg/62.5 mg ADULTES, comprimé
à libération prolongée / ampicilline/acidé clavulanique

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice
car elle contient des informations importantes
sur ce médicament. Vous pourriez avoir besoin de la relire
si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été
personnellement prescrit pour une maladie. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nuisible. Les effets indésirables de ce médicament sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez
un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AUGMENTIN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AUGMENTIN ?
3. Comment prendre AUGMENTIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AUGMENTIN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Association de pénicillines et de bêta-lactames.

- code ATC : J01CR02.

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables de nombreuses infections. Il est composé de deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. Elles appartiennent à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ». Elles agissent en empêchant les bactéries de se multiplier et d'être efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche les bactéries de détruire l'antibiotique.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains médicaments, vous devez lui en parler avant de prendre AUGMENTIN. Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique ou à d'autres antibiotiques, vous ne devez pas prendre AUGMENTIN.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique ou à d'autres antibiotiques, ou si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou une réaction anaphylactique.
- si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé une jaunisse.

→ **Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus.**

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de l'infection. Selon les résultats, il pourra vous prescrire un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets indésirables, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une réaction anaphylactique. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller ces effets indésirables. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière ».

Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules rouges, fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (dosage de la créatinine, le médecin ou l'infirmière) vous devez prendre AUGMENTIN avant ou après ces analyses.

Autres médicaments et AUGMENTIN :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Si vous prenez de l'allopurinol (en traitement de la goutte) la réaction cutanée allergique est plus élevée.

• Contre-indications

allergie à l'ampicilline ou à la pénicilline ou à d'autres antibiotiques.

• Allergie à l'acide clavulanique.

• Précautions d'emploi

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à l'ampicilline, à la pénicilline ou à d'autres antibiotiques.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à l'acide clavulanique.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres antibiotiques.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres médicaments.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres produits.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres substances.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres éléments.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres composants.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres ingrédients.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres excipients.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres additifs.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres colorants.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres arômes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres saveurs.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres odeurs.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres textures.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres goûts.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres aspects.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres sensations.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres perceptions.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres impressions.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres idées.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres sentiments.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres émotions.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres états d'esprit.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres actions.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres réactions.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres attitudes.

• Ne pas prendre AUGMENTIN si vous êtes allergique à d'autres comportements.

N200804-01

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

COMMENT PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : **ne pas prendre 2 comprimés à la fois.**

POSOLOGIE :

En raison de son dosage, **ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans :**

- La posologie usuelle est de **1 comprimé à 1000 mg par prise**, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

- Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 mg de paracétamol par jour soit 3 comprimés par jour.

- Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4000 mg par jour, soit 4 comprimés par jour. Les doses supérieures à 3000 mg de paracétamol par jour nécessitent l'avis médical. **NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4000 mg de PARACÉTAMOL PAR JOUR** (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule). Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises. En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

MODE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Le comprimé est à avaler tel quel avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruits).

Si vous avez pris plus de DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE® 1000 mg comprimé : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé** est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives.

Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Pas de précautions particulières de conservation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebâa - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

11.14
101022
idemco

Doliprane

PARACÉTAMOL

DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé

La substance active est : paracétamol 1000 mg (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose, amidon, maïs pré-gélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

QU'EST-CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est utilisé pour traiter la fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs articulaires, règles douloureuses. Il peut également être utilisé pour soulager les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (18 ans et plus).

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, ne pas prendre de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS IMPORTANTES ?

PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé, en cas d'allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie ou des reins.

PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou si l'efficacité est insuffisante ou de survenue de tout effet indésirable, arrêter le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, ne pas prendre de paracétamol sans l'avis de votre médecin avant de prendre du paracétamol.

Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur, consulter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre "Posologie").

Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

PPV: 14DH00

PER: 02/26

LOT: M3221



PPC : 79DH00



4 026466 004907

04.2025
L2200516



ADDITIVA

Multivitamines

+ Minéraux + Oligo-Éléments

**Goût
orange**



Juvatonus

AMPOULE

COMPOSITION POUR UNE AMPOULE :

PANAX GINSENG C.A MEYER.....	90 mg
Extrait de Maté.....	67 mg
Extrait de Guarana.....	130 mg

Ginseng tonus est un tonifiant physique et intellectuel qui réunit des actifs naturels pour lutter contre les baisses de formes.

PROPRIÉTÉS :

- Propriétés stimulantes
- Tonifiant physique et intellectuel
- Contribue à réduire la fatigue

INGRÉDIENTS : Eau purifié; sirop de fructose; jus d'orange concentré; extrait de Guarana (1,3%); extrait de Ginseng (0,9%); extrait de Maté (0,7%); arôme naturel d'orange ; arôme naturel de citron.

CONSEILS D'UTILISATION : Diluer le contenu de l'ampoule dans un verre d'eau ou

CONSEILS D'UTILISATION
de jus de fruits. Prendre

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

peut remplacer une
conserver dans un

Teneur élevée en caféine
15 ans et aux femmes
allergiques et/ou pr

PRÉSENTATION : Boîte de 10 ampoules

Complément alimentaire

**L'efficacité de
plusieurs études**

Instructions for use:
Dilute the content of the vial in a glass of
water or fruit juice. Take 1 vial per day,
preferably in the morning, for 20 days
during times of stress or for 10 days to stay
in shape. A slight deposit is normal. Shake
the vial vigorously before use.
High caffeine content (14mg/vial),
not recommended for children under 15
years old and pregnant or nursing
mothers.

EN	
GINSENG extract	For 1 vial of 10 ml 90 mg
MATE extract	Le 11 mg of ginsenosides 67 mg
GUARANA extract	Le 14 mg of caffeine 130 mg

Conseils d'emploi
Diluer le contenu de l'ampoule dans un verre d'eau ou de jus de fruit.
Prendre 1 ampoule par jour, de préférence le matin, pendant 20 jours pour rester en forme ou 10 jours en cas de stress. Un léger dépôt est normal. Agiter vigoureusement avant utilisation.
Teneur élevée en caféine (14mg/ampoule), déconseillé aux enfants de moins de 15 ans, et aux femmes enceintes ou allaitantes.

Prix

LOT

PER

22490 1125

114.00

FR	
Extrait de GINSENG	Pour 1 ampoule de 10 ml 90 mg
Extrait de MATE	soit 11 mg de ginsenosides 67 mg
Extrait de GUARANA	soit 14 mg de caféine 130 mg

LABORATOIRES JUVA SANTE
8, rue CHRISTOPHE COLOMB, 75008 PARIS FRANCE

Fabriqué par : Laboratoires PASQUIER
DOMAZAN, 226 allée de la Baraquette - ZI de
Domazan, 30390 DOMAZAN - FRANCE

Importé au Maroc par : PROMOSER
N°23, Résidence CASA 1
282, Bd de la Résistance
CASABLANCA- MAROC