

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



195280

Déclaration de Maladie

M23- N° 0040219

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7609

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : SAMATI MOSITFA

Date de naissance : 12.12.55

Adresse : N° 379 101 HAJE FAIEH EL OULFA H. HASSAN. CASA

Tél. : 0674888484 Total des frais engagés : 1932,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. BERRADA GOUZI Mohamed Hicham
Maladies du Sommeil
Diabète - Cholestérol - Goutte
Nutrition - Obésité
119, Bd Med Bouziane - Imm. Farhatine 6
3ème Etage - Casablanca - Tél. : 05 22 56 87 38

Cachet du médecin :

Date de consultation : 29 JAN. 2024

Nom et prénom du malade : SAMATI MOSITFA

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 29/01/2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19 JAN. 2024	6 + 8v		430000	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19 JAN. 2024	6 + 8		43000	

Pratiqué	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
Signature	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29/01/24	1632,-

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29/01/24	1632,-

Centre de l'habitation
ou du Fournisseur

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires



[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION
OD.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 00000000 35533411 G 21433552 00000000 00000000 11433553 D B			COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

FIN
D'EXECUTION

A diagram of a circular arch bridge. The arch is divided into eight segments, numbered 1 through 8 from top to bottom on both sides. The top of the arch is labeled 'H', the right side 'G', the left side 'D', and the bottom 'B'. The arch is supported by two pillars at the base.

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Hicham BERRADA GOUZI
Spécialiste du Sommeil
Diabétologie - Nutrition et Maladies du Poids

Ancien médecin attaché aux hôpitaux de France
Membre des sociétés savantes françaises :
SFRMS - SFD - SFN - AFERO

- Insomnies - Apnées - Polysomnographie
- Diabète - Insulinothérapie Fonctionnelle - Alimentation
- Cholestérol - Triglycérides - Goutte
- Obésité - Maigreux - Coaching Nutritionnel

Enfants - Adultes



29 JAN. 2024

Casablanca le : الدار البيضاء 29

الدكتور هشام برادة غوزي

أخصائي اضطرابات النوم
داء السكري - التغذية - أمراض الوزن

طبيب سابق بمستشفيات فرنسا
عضو الجمعيات الفرنسية للأبحاث الطبية

- الأرق - توقف التنفس - تسجيلات النوم
- داء السكري المرأة الحامل - الطفل والكبير
- الكولسترول - الدهون الثلاثية - النقرس
- السمينة - النحافة - التزينة الغذائية والسلوكية

الأطفال والكبار

Mr, Mme, Enfant :

A revoir le :

7441-

1-

Larous

(08w)

1171- x8

2-

Humbly kwrh ka la (08w)

175 07w (10w)

175 14w (10w)

175 18w (06w)

1632-

175 21w (08w)

02w
high

PHARMACIE ELABAD CASI

119, Bd. Mohamed Bouziane - Imm. Farhatine 6 - 3ème Etage - Hay Essalama (Au-dessus de la BMCI)

Tél : 05 22 75 37 38

119, Bd. Mohamed Bouziane - Imm. Farhatine 6 - 3ème Etage - Hay Essalama (Au-dessus de la BMCI)

119, Bd. Mohamed Bouziane - Imm. Farhatine 6 - 3ème Etage - Hay Essalama (Au-dessus de la BMCI)

05 22 56 37 38 cabinetberrada@gmail.com - www.hichamberrada.ma

119, Bd. Mohamed Bouziane - Imm. Farhatine 6 - 3ème Etage - Casablanca - Tél. : 05 22 56 37 38

NOTICE :
INFORMATION POUR L'UTILISATEUR



Lantus® SoloStar®

100 unités/ml
solution injectable en stylo prérempli
insuline glargine

SANOFI

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Lantus 100U/ml, Inj b5 sty
P.P.V : 744,00 DH



(analyses de sang et d'
et l'activité physique
la technique d'injection

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Veuillez également lire le mode d'emploi de Lantus SoloStar, stylo prérempli, avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.



Si votre glycémie est tr
suivez les conseils en c
l'encadré à la fin de ce

Modifications cutanées

Il faut effectuer une ro
pour prévenir des mo
des grosseurs sous la p
pas agir correctement
zone présentant des gr
utiliser Lantus). Contac
injectez actuellement d
des grosseurs avant de
une autre zone. Votre
demander de contrôler
et d'ajuster votre dose
autres médicaments ar

Voyages

Avant de partir en voya
pour vous informer sur

- disponibilité de votre
- vous allez,
- fourniture d'insuline
- conservation adéqua
- le voyage,
- horaire des repas et
- pendant le voyage,
- effets possibles du ch
- horaire,

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog 100 unités/mL KwikPen solution injectable en stylo pré-rempli insuline lispro Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60 unités par paliers de 1 unité.

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. Son action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. **Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre de lecture, vérifiez-le toujours avant votre injection.** Vous pouvez vous injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. **Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.**

2. Quelles sont les informations à connaître à propos de Humalog KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog KwikPen

- Si vous estimez qu'une **hypoglycémie** (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 4). (voir rubrique 4).
- Si vous êtes **allergique** à l'insuline lispro ou à l'un des composants contenus dans ce médicament (mentionné dans la

Avertissements et précautions

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

- pharmacien. Assurez-vous que vous recevez le médicament que votre médecin vous a prescrit par votre pharmacien.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie. Ces symptômes peuvent être subtils. Relisez attentivement cette notice. Réfléchissez soigneusement avant de prendre vos repas, à la fréquence et à la quantité de vos repas physiques. Vous devez étroitement surveiller votre sang grâce à des tests fréquents.
- Quelques patients ayant pris d'une insuline animale à long terme ont des symptômes annonciateurs ou différents de ceux provoqués par d'hypoglycémies fréquentes. Parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou infirmier.
 - Êtes-vous récemment tombé malade ?
 - Avez-vous des problèmes de vision ?
 - Faites-vous davantage de sport ?
- Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de l'alcool.
- Si vous envisagez de vous faire un traitement hormonal, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou infirmier. L'insuline pourrait vous entraîner à prendre des repas par rapport à vos hormones.
- Certains patients avec un diagnostic de diabète cardiaque ou un antécédent de crise cardiaque étaient traités avec la pioglitazone. L'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes de congestion, essoufflement inhabituel ou gonflement localisé (œdème).
- Il est déconseillé aux personnes de conduire un véhicule sans se faire aider par un autre conducteur.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection. Les modifications cutanées telles que l'irritation, l'insuline risque de ne pas agir correctement dans une zone présentant des grossesses (KwikPen). Contactez votre médecin si vous avez une zone présentant des grossesses dans une autre zone. Votre médecin vous aidera à contrôler votre glycémie de plus près et à ajuster vos autres médicaments.

Autres médicaments et Humalog

Vos besoins en insuline peuvent varier.

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par insuline,
- des hypoglycémisants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta-2» stimulants» (ex. : salbutamol),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
- du danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzyme (par exemple, l'april) et
- les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine.

Informez votre médecin si vous prenez tout autre médicament ou si vous suivez une ordonnance (voir rubrique 4).

Enfants et allaitement

Si vous êtes enceinte ou l'envisagez, l'insuline diminue la croissance et augmente l'administration de votre insuline. Demandez conseil à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration peuvent être affectées.

HD 00 LLL Add
PPV 177 00 02
UT 17 08 2025
LOT 0509974H.3

Humalog 100 unités/mL KwikPen
solution injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro
Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.

Lilly

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

Conduite de véhicules et utilisation
 Vos capacités de concentration

Si vous avez le stylo d'Humalog
médecin.

Contrôlée par votre insuline actuelle,
les symptômes annonciateurs de
mes sont énumérés ultérieurement dans
signalement à l'heure à laquelle vous
sentez et à l'intensité de vos exercices
surveiller les taux de sucre dans
fréquentes de votre glycémie.

Les personnes des hypoglycémies après passage
insuline humaine ont rapporté que les
hypoglycémies étaient moins prononcées
après une insuline animale. En cas
ou si vous avez des difficultés à les
votre médecin.

En cas de questions suivantes, informez-en
votre personnel infirmier.

Êtes-vous malade ?
Avez-vous des problèmes rénaux ou hépatiques ?
Faites-vous un exercice que d'habitude ?
Voulez-vous aussi varier si vous prenez de

Si vous allez à l'étranger, pensez à en informer
votre personnel infirmier. Le décalage
peut vous amener à modifier vos heures d'injection et
vos habitudes.

Les personnes atteintes de diabète de type II ancien et une maladie
d'accident vasculaire cérébral, qui
ont une zone et l'insuline ont développé une
maladie. Informez votre médecin le plus rapidement
possible de ces problèmes d'insuffisance cardiaque tels qu'un
taux de sucre augmenté rapide de poids ou un

Si vous êtes aveugle ou malvoyant d'utiliser
le stylo, faites-le faire par une personne formée à l'utilisation du

Mode d'injection

Les sites d'injection pour prévenir des
gros boutons sous la peau.
Injectez correctement si vous l'injectez dans
les muscles (voir Comment utiliser Humalog
KwikPen). Si vous injectez actuellement dans
les muscles avant de commencer à injecter
dans le muscle, vous pouvez demander de contrôler
de l'ajuster votre dose d'insuline ou celle
de votre diabète.

Humalog KwikPen

Les sites d'injection peuvent être différents si vous prenez

des hormones thyroïdiennes,

des hormones,

de l'adrénaline, du salbutamol ou du terbutaline),

des inhibiteurs de la monoamine oxydase ou
des inhibiteurs de la sérotonine),

des médicaments de conversion (ex. captopril,

des médicaments de l'angiotensine II.

Si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou

Si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou

Si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou

Si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou

Si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou
si vous ne prenez pas récemment pris ou

en cas d'hypoglycémie. Vous devez y penser dans toutes les
situations où vous pourriez mettre votre vie en danger ou celle d'autres
personnes, comme la conduite automobile ou l'utilisation de machines.
Vous devez interroger votre médecin sur vos capacités à conduire si
vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie diminués ou absents.

Humalog KwikPen contient du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par
dose, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment utiliser Humalog KwikPen

Veillez à toujours prendre Humalog KwikPen en suivant exactement
les indications de votre médecin. En cas de doute, consultez votre
médecin.

Afin de prévenir la transmission éventuelle de maladies, chaque stylo
doit être uniquement utilisé par vous, même si l'aiguille est changée.

Dose

- Vous devez normalement injecter Humalog dans les 15 minutes
précédant ou suivant un repas. Si besoin, vous pouvez pratiquer
l'injection juste après le repas. Votre médecin vous aura avisé de
la dose exacte de l'injection, de son heure et de sa fréquence.
Ces consignes vous sont exclusivement réservées. Observez-les
scrupuleusement et rendez-vous régulièrement chez votre médecin.
- Si vous changez de type d'insuline (par exemple, passage d'une
insuline humaine ou animale à une présentation Humalog), vous
pouvez nécessiter un changement de dose. Ce changement peut
être effectué lors de la première injection ou progressivement sur
plusieurs semaines ou plusieurs mois.
- Humalog KwikPen convient uniquement pour des injections sous-
cutanées. Si vous avez besoin d'injecter votre insuline par une autre
voie, parlez-en à votre médecin.

Préparation d'Humalog KwikPen

Humalog est une solution et il n'est donc pas nécessaire de la
mélanger. Vous ne devez l'utiliser que si elle a l'apparence de l'eau. Le
liquide doit être transparent, incolore et exempt de toutes particules.
Vérifiez l'apparence avant chaque injection.

Réglage du stylo KwikPen (consultez votre manuel d'utilisation)

- Lavez-vous d'abord les mains.
- Lisez les instructions pour l'utilisation de votre stylo à insuline pré-
rempli et suivez-les attentivement. En voici quelques-unes :
- Utilisez une aiguille propre (les aiguilles ne sont pas fournies).
- Purgez votre stylo KwikPen avant chaque utilisation. La purge permet
de vérifier que l'insuline sort et permet de chasser les bulles d'air de
votre stylo KwikPen. Il peut persister quelques petites bulles d'air,
sans conséquence, dans le stylo. Toutefois si la taille des bulles est
trop importante, la dose injectée pourrait être affectée.

Injection d'Humalog

- Avant de procéder à l'injection, nettoyez la peau selon les instructions
que l'on vous a données. Injectez sous la peau comme on vous l'a
appris. N'injectez pas directement dans une veine. Après l'injection,
laissez l'aiguille sous la peau pendant 5 secondes afin de vous
assurer que vous avez injecté votre dose en totalité. Ne frottez pas
l'endroit où vous venez de faire l'injection. Assurez-vous que vous
injectez à une distance d'au moins 1 cm de la dernière injection et
que vous observez une « rotation » des emplacements d'injection,
comme on vous l'a appris. Quel que soit le site d'injection utilisé, les
bras, les cuisses, les fesses ou l'abdomen, Humalog agira toujours
plus rapidement que l'insuline humaine rapide.
- Vous ne devez pas utiliser Humalog par voie intraveineuse. Injectez
Humalog comme votre médecin ou votre personnel infirmier vous
l'a appris. Seul votre médecin peut administrer Humalog par voie
intraveineuse. Il le fera seulement dans certaines circonstances telles
qu'une opération chirurgicale ou si vous êtes malade et que votre
taux de glucose est trop élevé.

Après l'injection

- Une fois l'injection terminée, dévissez l'aiguille du stylo KwikPen en
utilisant le capuchon extérieur de l'aiguille. Cette opération permet
de maintenir l'insuline stérile et empêche les fuites. Elle empêche
également toute entrée d'air dans le stylo et l'obstruction de l'aiguille.
Ne partagez pas vos aiguilles. Ne partagez pas votre stylo.
Remplacez le capuchon sur le stylo.

Humalog 100 unités/mL KwikPen
solution injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro
Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.

Lilly

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 à 60 unités à la fois. **Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre.** **vérifiez-le toujours avant votre injection.** Vous pouvez injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. **Si votre dose est de 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.**

- Si vous estimez qu'une **hypoglycémie** (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans ce prospect de prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 4.2). Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû.
- Si vous êtes **allergique** à l'insuline lispro ou à l'un des composants contenus dans ce médicament (mentionné dans la rubrique 6).

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

- pharmacien. Assurez-vous d'utiliser le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie. Ces symptômes peuvent passer inaperçus. Prenez cette notice. Réfléchissez soigneusement vos repas, à la fréquence et à la composition des repas, et à vos symptômes physiques. Vous devez étroitement surveiller votre sang grâce à des tests de glycémie fréquents.
- Quelques patients ayant pris de l'insuline animale à long terme ont des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie différents de ceux provoqués par l'insuline humaine. Apprenez à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier :
 - Êtes-vous récemment tombé(e) ?
 - Avez-vous des problèmes de vision ?
 - Faites-vous davantage de malaises ?
- Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de l'alcool.
- Si vous envisagez de vous arrêter de fumer, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier. Le sevrage tabagique pourrait vous contraindre à modifier vos habitudes de repas par rapport à vos besoins en insuline.
- Certains patients avec un diagnostic de diabète ou un antécédent de diabète étaient traités avec la pioglitazone pour l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des symptômes tels que l'essoufflement inhabituel ou un gonflement localisé (œdème) des chevilles, des pieds ou des jambes.
- Il est déconseillé aux personnes souffrant de diabète d'utiliser un stylo sans se faire aider par un professionnel de la santé.

Il faut effectuer une rotation de modifications cutanées telles L'insuline risque de ne pas agir dans une zone présentant des gros KwikPen). Contactez votre médecin si vous avez une réaction dans une zone présentant des gros dans une autre zone. Votre médecin vous aidera à adapter votre glycémie de plus près de vos autres médicaments au

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par
- des hypoglycémisants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactérien
- de l'octréotide,
- des « β_2 stimulants» (ex.
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (in

LOT D599914H.2
UT AV 08 2025
PPV 111.00 DH

aitement
 te ou l'envisa
 en insuline diminuent générale
 grossesse et augmentent au c
 l'administration de votre insuli
 votre régime alimentaire.
 Demandez conseil à votre mé

Conduite de véhicules et utilisation
 Vos capacités de concentration

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog 100 unités/mL KwikPen solution injectable en stylo pré-rempli insuline lispro Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60 unités par paliers de 1 unité.

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. Son action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. **Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre.** vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est de 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog KwikPen

- Si vous estimez qu'une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 4). Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû.
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

- pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin est bien celui que vous utilisez.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie. Ces symptômes sont décrits dans cette notice. Réfléchissez soigneusement à prendre vos repas, à la fréquence et à la composition physiques. Vous devez étroitement surveiller votre sang grâce à des tests.
 - Quelques patients ayant pris d'une insuline animale à une insuline humaine ont eu des symptômes annonciateurs ou différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie. Apprenez à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
 - Si vous répondez OUI à l'un des questions suivantes, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier.
 - Etes-vous récemment tombé malade ?
 - Avez-vous des problèmes de vision ?
 - Faites-vous du sport ?
 - Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de l'alcool.
 - Si vous envisagez de vous marier, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier. L'heure de votre repas pourrait vous contraindre à modifier votre régime de repas par rapport à vos habitudes.
 - Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent de diabète cardiaque étaient traités avec la pioglitazone. Cette médication peut aggraver l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes de gonflement localisé (œdème) ou de gonflement généralisé.
 - Il est déconseillé aux personnes âgées de prendre ce stylo sans se faire aider par un tiers.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection. Les modifications cutanées telles que l'irritation, l'induration, l'hyperpigmentation ou l'atrophie de la peau au site d'injection peuvent survenir. L'insuline risque de ne pas agir correctement si elle est injectée dans une zone présentant des modifications cutanées (gros boutons, cicatrices, etc.). Contactez votre médecin si vous remarquez une zone présentant des modifications cutanées dans une autre zone. Votre médecin vous aidera à contrôler votre glycémie de plus près et à ajuster vos doses de vos autres médicaments.

Autres médicaments et Humalog

Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de :

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par hormone,
- des hypoglycémifiants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta-2» stimulants (ex. : salbutamol),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recaptage de la sérotonine).

LOT D599914H.2

UT AV 08 2025

PPV 117.00 DH

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog 100 unités/mL KwikPen solution injectable en stylo pré-rempli insuline lispro Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60 unités par paliers de 1 unité.

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. Son action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. **Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre.** vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est de 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog KwikPen

- Si vous estimez qu'une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 4). Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû.
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

- pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin est bien celui que vous utilisez.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie. Ces symptômes sont décrits dans cette notice. Réfléchissez soigneusement à prendre vos repas, à la fréquence et à la composition physiques. Vous devez étroitement surveiller votre sang grâce à des tests.
 - Quelques patients ayant pris d'une insuline animale à long terme ont présenté des symptômes annonciateurs ou différents de ceux provoqués par d'hypoglycémies fréquentes. Parlez-en avec votre médecin.
 - Si vous répondez OUI à l'un des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou infirmier.
 - Etes-vous récemment tombé malade ?
 - Avez-vous des problèmes de vision ?
 - Faites-vous du sport ?
 - Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de l'alcool.
 - Si vous envisagez de vous marier, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier. L'heure de votre repas pourrait vous contraindre à modifier votre régime de repas par rapport à vos habitudes.
 - Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent de diabète cardiaque étaient traités avec la pioglitazone. Cette association peut entraîner une insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des symptômes tels que gonflement localisé (œdème) ou gonflement généralisé.
 - Il est déconseillé aux personnes souffrant de diabète de conduire un stylo sans se faire aider par une autre personne.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection. Les modifications cutanées telles que l'irritation, l'induration, l'hyperpigmentation ou l'atrophie de la peau au site d'injection peuvent survenir. L'insuline risque de ne pas agir correctement si elle est injectée dans une zone présentant des modifications cutanées (voir rubrique 4). Contactez votre médecin si vous remarquez une zone présentant des modifications cutanées dans une autre zone. Votre médecin pourra vous recommander de surveiller votre glycémie de plus près et de modifier votre traitement si nécessaire.

Autres médicaments et Humalog

Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de :

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par exemple la thyroïde,
- des hypoglycémifiants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'ocrotétide,
- des «bêta-2 stimulants» (ex. : bronchodilatateurs),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine).

LOT D599914H.2
UT AV 08 2025
PPV 117.00 DH

Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois.

Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre.

Vérifiez-le toujours avant votre injection.

Vous pouvez injecter de 1 à 60 unités en une seule injection.

Si votre dose est de 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

Si vous estimez qu'une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) est imminente.

Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 4).

Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû.

Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre pharmacien.

Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin est bien celui que vous utilisez.

Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie.

Ces symptômes sont décrits dans cette notice. Réfléchissez soigneusement à prendre vos repas, à la fréquence et à la composition physiques.

Vous devez étroitement surveiller votre sang grâce à des tests.

Quelques patients ayant pris d'une insuline animale à long terme ont présenté des symptômes annonciateurs ou différents de ceux provoqués par d'hypoglycémies fréquentes.

Parlez-en avec votre médecin.

Si vous répondez OUI à l'un des questions suivantes, parlez-en avec votre médecin, pharmacien ou infirmier.

Etes-vous récemment tombé malade ?

Avez-vous des problèmes de vision ?

Faites-vous du sport ?

Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de l'alcool.

Si vous envisagez de vous marier, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier.

L'heure de votre repas pourrait vous contraindre à modifier votre régime de repas par rapport à vos habitudes.

Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent de diabète cardiaque étaient traités avec la pioglitazone.

Cette association peut entraîner une insuffisance cardiaque.

Informez votre médecin si vous avez des symptômes tels que gonflement localisé (œdème) ou gonflement généralisé.

Il est déconseillé aux personnes souffrant de diabète de conduire un stylo sans se faire aider par une autre personne.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Vos capacités de concentration peuvent être diminuées par l'hypoglycémie.

Si vous ressentez des symptômes de hypoglycémie, ne conduisez pas un véhicule ou n'utilisez pas de machines.

Parlez-en à votre médecin.

Notice : Information de l'utilisateur

Humalog 100 unités/mL KwikPen solution injectable en stylo pré-rempli insuline lispro Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60 unités par paliers de 1 unité.

Lilly

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé

Humalog KwikPen est utilisé dans le traitement du diabète. Son action est plus rapide que l'insuline humaine normale car la molécule d'insuline a été légèrement modifiée.

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Votre médecin peut vous prescrire Humalog KwikPen ainsi qu'une insuline d'action plus prolongée. Une notice spécifique accompagne cette autre insuline. Ne changez pas d'insuline sauf sur prescription de votre médecin. Observez la plus grande prudence si vous changez d'insuline.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

Le stylo KwikPen est un stylo jetable pré-rempli contenant 3 mL (300 unités, 100 unités/mL) d'insuline lispro. Un stylo KwikPen contient plusieurs doses d'insuline. Le stylo KwikPen sélectionne 1 unité à la fois. **Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre.** vérifiez-le toujours avant votre injection. Vous pouvez injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen

N'utilisez JAMAIS Humalog KwikPen

- Si vous estimez qu'une hypoglycémie (faible taux de glucose dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans cette notice comment prendre en charge une hypoglycémie légère (voir rubrique 4). Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes allergique à l'insuline lispro ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Avertissements et précautions

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

- pharmacien. Assurez-vous que le KwikPen prescrit par votre médecin est bien celui que vous utilisez.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie. Ces symptômes sont décrits dans cette notice. Réfléchissez soigneusement à prendre vos repas, à la fréquence et à la composition physiques. Vous devez étroitement surveiller votre sang grâce à des tests.
 - Quelques patients ayant pris d'une insuline animale à une insuline humaine ont eu des symptômes annonciateurs ou différents de ceux provoqués par l'hypoglycémie. Apprenez à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
 - Si vous répondez OUI à l'un des questions suivantes, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier.
 - Etes-vous récemment tombé malade ?
 - Avez-vous des problèmes de vision ?
 - Faites-vous du sport ?
 - Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de l'alcool.
 - Si vous envisagez de vous marier, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier. L'heure de votre repas pourrait vous contraindre à modifier votre régime de repas par rapport à vos habitudes.
 - Certains patients avec un diabète cardiaque ou un antécédent de diabète cardiaque étaient traités avec la pioglitazone. Cette médication peut aggraver l'insuffisance cardiaque. Informez votre médecin si vous avez des signes de gonflement localisé (œdème) ou de gonflement généralisé.
 - Il est déconseillé aux personnes âgées d'utiliser ce stylo sans se faire aider par un tiers.

Modifications cutanées au site d'injection

Il faut effectuer une rotation des sites d'injection. Les modifications cutanées telles que l'irritation, l'induration, l'hyperpigmentation ou l'hyperkératose risquent de ne pas agir si vous injectez dans une zone présentant des gros grains (voir rubrique 4). Contactez votre médecin si vous avez une zone présentant des gros grains dans une autre zone. Votre médecin vous aidera à contrôler votre glycémie de plus près et à ajuster vos autres médicaments.

Autres médicaments et Humalog KwikPen

Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de :

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par exemple la thyroïde,
- des hypoglycémifiants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'ocrotéotide,
- des «bêta-2 stimulants» (ex. : bronchodilatateurs),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine).

LOT D599914H.2
UT AV 08 2025
PPV 117.00 DH

Humalog 100 unités/mL KwikPen
solution injectable en stylo pré-rempli
insuline lispro
Chaque stylo KwikPen délivre de 1 à 60
unités par paliers de 1 unité.

Lilly

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. Qu'est-ce qu'Humalog KwikPen et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog KwikPen
3. Comment utiliser Humalog KwikPen
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Humalog KwikPen
6. Contenu de l'emballage et autres informations

Vous êtes diabétique lorsque votre pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline pour réguler le taux de glucose dans votre sang. Humalog remplace votre propre insuline et assure un contrôle du glucose à long terme. Son action est très rapide et plus courte que celle d'une insuline rapide (2 à 5 heures). Vous utiliserez normalement Humalog 15 minutes avant ou après un repas.

Humalog convient aux adultes et aux enfants.

la fois. Le nombre d'unités s'affiche dans la fenêtre. **vérifiez-le toujours avant votre injection.** Vous pouvez injecter de 1 à 60 unités en une seule injection. **Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous devrez vous faire plus d'une injection.**

- Si vous estimez qu'une **hypoglycémie** (faible taux de sucre dans le sang) est imminente. Il est indiqué plus loin dans ce prospect de prendre en charge une hypoglycémie légère (voir 4.2). Si vous avez pris plus d'Humalog que vous n'auriez dû).
- Si vous êtes **allergique** à l'insuline lispro ou à l'un des composants contenus dans ce médicament (mentionné au rubrique 6).

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur le conditionnement et l'étiquette du stylo pré-rempli délivré par votre

- pharmacien. Assurez-vous d'utiliser le KwikPen prescrit par votre médecin.
- Si votre glycémie est bien contrôlée, vous pourriez ne pas ressentir l'hypoglycémie. Ces symptômes peuvent passer inaperçus. Prenez cette notice. Réfléchissez soigneusement vos repas, à la fréquence et à la composition de ceux-ci.
- Quelques patients ayant pris de l'insuline animale à long terme ont des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie ou différents de ceux provoqués par l'insuline humaine. Apprenez à reconnaître, parlez-en avec votre médecin.
- Si vous répondez OUI à l'une des questions suivantes, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier :
 - Etes-vous récemment tombé malade ?
 - Avez-vous des problèmes de vision ?
 - Faites-vous davantage de sport ?
- Vos besoins en insuline peuvent varier en fonction de :
 - l'alcool.
 - Si vous envisagez de vous marier, consultez votre médecin, pharmacien ou infirmier. Votre horaire pourrait vous contraindre à modifier vos repas par rapport à vos besoins.
 - Certains patients avec un diagnostic de diabète cardiaque ou un antécédent de diabète étaient traités avec la pioglitazone. Ils ont eu une insuffisance cardiaque. Informez votre médecin. Il est possible si vous avez des signes de gonflement inhabituel ou de gonflement localisé (œdème).
 - Il est déconseillé aux personnes souffrant de diabète de porter un stylo sans se faire aider par un professionnel de la santé.

Il faut effectuer une rotation de modifications cutanées telles L'insuline risque de ne pas agir dans une zone présentant des gros KwikPen). Contactez votre médecin si vous avez une réaction dans une zone présentant des gros dans une autre zone. Votre médecin vous aidera à ajuster votre glycémie de plus près de vos autres médicaments au

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par
- des hypoglycémiants oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactérien
- de l'octréotide,
- des « β_2 -stimulants» (ex.
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (in

électifs de la rec

sites de l'enzyme

ates des récept

nédecin si vou

onnance (voir

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1039-1043.

te ou l'envisa

en insuline diminuent généralement la
grossesse et augmentent au cours de
l'administration de votre insuline.
votre régime alimentaire.
Demandez conseil à votre médecin.

Conduite de véhicules et uti

Vos capacités de concentratio