

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-536287

ND 30298

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 01651 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : M^r AMINE Abderrahmane
 Date de naissance : 24-10-1949
 Adresse : 122 - lot EL FATI 2 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 Tél. : 0661312672 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 24/04/2020

Nom et prénom du malade : AMINE Abderrahmane

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

HTA grade II

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA

Le : 27/04/2020

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

[illegible][illegible]

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	28.04.2013	BAS forte	1860,80

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES																		
Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.																		
Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.																		
SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>														
				MONTANTS DES SOINS <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>														
				DEBUT D'EXECUTION <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>														
				FIN D'EXECUTION <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>														
	<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession																	
					DATE DU DEVIS <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>													
				DATE DE L'EXECUTION <table border="1" style="width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></table>														
VISA ET CACHET DU PRACTICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRACTICIEN ATTESTANT L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur ASKOUR Meryem

Spécialiste en Cardiologie et Maladies Vasculaires
DU de Cardiologie Congénitale et Pédiatrique
Ancienne interne du CHRU de Lille
Echodoppler Cardiaque - Holter ECG
Holter tensionnel - Epreuve d'effort

الدكتورة مريم أسكور
اختصاصية أمراض القلب و الشرايين
خريجة كلية الطب ليل بفرنسا

Casablanca le : 24/04/2020

M^r AMINE Abdelahmane

(208,00 x 3)
COVERANE 5/5 (75) 1cf ; matin
(79,00 x 3)
AHOR 10mg (75) 1cf ; matin

T_{III} 3 mois

861,00

MAPHARMAC Dr. ASKOUR Meryem
30 Bis Edh II Sidi Maârouf
CASABLANCA
Tél: 0522 78 62 05

Dr. ASKOUR Meryem
Cardiologue
Tél: 0522 78 62 05

TAHOR® 10 mg, 20 mg, 40 mg

comprimé pelliculé

Atorvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TAHO® comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TAHO®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TAHO®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TAHO®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TAHO®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

- Réduction des hypercholestérolémies pures (types 2a) ou mixtes (types 2 b et 3) en complément d'un régime adapté et assidu. • Hypercholestérolémie familiale homozygote, en addition à d'autres traitements hypolipémiants (notamment LDL aphasés) ou lorsque des tels traitements ne sont pas disponibles. • Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec 3 facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée. • Prévention des événements coronaires et cérébrovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans hyperlipidémie associée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAHO®, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TAHO®, comprimé pelliculé : • si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, • si vous avez eu ou avez une maladie du foie, • si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables, • si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable, • si vous êtes enceinte ou essayez de l'être, • si vous allaitez.

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre TAHO®, comprimé pelliculé. • si vous avez une insuffisance respiratoire sévère, • si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de TAHO® peut provoquer des problèmes musculaires graves (voir rubrique 4). • si vous avez eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez eu de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral, • si vous avez eu des problèmes aux reins, • si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie), • si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires, • si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibraté), • si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool, • si vous avez eu des antécédents de maladie du foie, • si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans. Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par TAHO® afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut-être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec TAHO® (voir rubrique 2. Autres médicaments et TAHO®, comprimé pelliculé). • Prévenez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire constante. Des examens complémentaires et un traitement peuvent être nécessaires pour la diagnostiquer et la traiter. Au cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes diabétique ou si vous présentez un risque de survenue d'un diabète, vous serez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez débiter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevés dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée.

Sans
Si v
pre

4.

Comme

ne survient

Si vous ressentez l'un

vos comp

urgence

Rare : pa

en, gonfle

difficulté

sur la p

cutané

pièd,

muscu

atteint

dispara

et/ou

Très ra

inhabitue

de votre

Autres eff

indésirables éventuels de TAHO® :

Fréquent :

Peu fréquent :

Très rare :

Les

symptômes

peuvent inclure

une respiration

bruyante, une

douleur ou

oppression

dans la

poitrine, un

gonflement

de la paupière,

du visage,

des lèvres,

de la bouche,

de la langue

ou de la

gorge, une

difficulté à

respirer, une

perte de

conscience,

une perte

d'audition,

un gynécoste

(augmentation

de la taille

de la poitrine

chez l'homme).

Fréquence

indéterminée :

si vous

êtes estimée

sur la base

des données

disponibles

• faiblesse

musculaire

constante.

Effets

indésirables

éventuels

rapportés

avec certains

statins (médicaments

du même

type) :

• troubles

sexuels, •

dépression,

troubles

respiratoires,

troubles

digestifs,

troubles

cutanés,

troubles

visuels,

troubles

cardiovasculaires,

troubles

hépatiques,

troubles

musculaires,

troubles

neurologiques,

troubles

généralisés,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

mémoire,

troubles

de la

conscience,

troubles

de la

coordination,

troubles

de la

force,

troubles

de la

température,

troubles

de la

transpiration,

troubles

de la

digestion,

troubles

de la

respiration,

troubles

de la

circulation

sanguine,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

audition,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

coordination,

troubles

de la

force,

troubles

de la

température,

troubles

de la

transpiration,

troubles

de la

digestion,

troubles

de la

respiration,

troubles

de la

circulation

sanguine,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

audition,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

coordination,

troubles

de la

force,

troubles

de la

température,

troubles

de la

transpiration,

troubles

de la

digestion,

troubles

de la

respiration,

troubles

de la

circulation

sanguine,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

audition,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

coordination,

troubles

de la

force,

troubles

de la

température,

troubles

de la

transpiration,

troubles

de la

digestion,

troubles

de la

respiration,

troubles

de la

circulation

sanguine,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

audition,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

coordination,

troubles

de la

force,

troubles

de la

température,

troubles

de la

transpiration,

troubles

de la

digestion,

troubles

de la

respiration,

troubles

de la

circulation

sanguine,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

audition,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

coordination,

troubles

de la

force,

troubles

de la

température,

troubles

de la

transpiration,

troubles

de la

digestion,

troubles

de la

respiration,

troubles

de la

circulation

sanguine,

troubles

de la

vision,

troubles

de la

audition,

troubles

de la

parole,

troubles

de la

coordination,

TAHOR® 10 mg, 20 mg, 40 mg

comprimé pelliculé

Atorvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TAHO® comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TAHO®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TAHO®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TAHO®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TAHO®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

- Réduction des hypercholestérolémies pures (types 2a) ou mixtes (types 2 b et 3) en complément d'un régime adapté et assidu. • Hypercholestérolémie familiale homozygote, en addition à d'autres traitements hypolipémiants (notamment LDL aphasés) ou lorsque des tels traitements ne sont pas disponibles. • Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec 3 facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée. • Prévention des événements coronaires et cérébrovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans hyperlipidémie associée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAHO®, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TAHO®, comprimé pelliculé : • si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, • si vous avez eu ou avez une maladie du foie, • si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de fonction hépatique anormaux et inexplicables, • si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable, • si vous êtes enceinte ou essayez de l'être, • si vous allaitez.

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre TAHO®, comprimé pelliculé. • si vous avez une insuffisance respiratoire sévère, • si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de TAHO® peut provoquer des problèmes musculaires graves (voir rubrique 4). • si vous avez eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez eu de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral, • si vous avez eu des problèmes aux reins, • si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie), • si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires, • si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibraté), • si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool, • si vous avez eu des antécédents de maladie du foie, • si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans. Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par TAHO® afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut-être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec TAHO® (voir rubrique 2. Autres médicaments et TAHO®, comprimé pelliculé). • Prévenez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire constante. Des examens complémentaires et un traitement peuvent être nécessaires pour la diagnostiquer et la traiter. Au cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes diabétique ou si vous présentez un risque de survenue d'un diabète, vous serez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez débiter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevés dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée.

Sans
Si v
pre

4.

Comme

ne survient

Si vous ressentez l'un

vos comp

urgence

Rare : pa

en, gonfle

difficulté

sur la p

cutané

piéds,

muscu

atteint

dispara

et entr

Très ra

inhabitue

de votre h

Autres eff

indésirables éventuels de TAHO® :

Fréquent :

Peu fréquent :

Très rare :

Les

symptômes

peuvent inclure

une respiration

bruyante, une

douleur ou

oppression

dans la

poitrine, un

gonflement

de la paupière,

du visage,

des lèvres,

de la bouche,

de la langue

ou de la

gorge, une

difficulté à

respirer, une

perte de

conscience,

une perte

d'audition,

un gynécoste

(augmentation

de la taille

de la poitrine

chez l'homme).

Fréquence

indéterminée :

si vous

êtes estimée

sur la base

des données

disponibles

• faiblesse

musculaire

constante.

Effets

indésirables

éventuels

rapportés

avec certains

statins (médicaments

du même

type) :

• troubles

sexuels, •

dépression,

troubles

respiratoires,

trou

et/ou essoufflement

persistant

ou fièvre, •

diabète : vous

pourrez

débiter un

diabète si

vous avez

un taux de

suc

(glycémie)

et de

gr

élevés

dan

s le

san

, si

vous

êtes

en

sur

poids

et

si

vous

avez

une

pression

artérielle

(tension)

élevée.

De

claration

des

effets

secondaires

Si

vous

ressentez

un

quelconq

un

eff

et

indésir

able, par

lez-en

à

vo

tre

me

de

ci

ou

vo

tre

in

fir

m

ère

. Ce

ç

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

a

p

l

u

s

<

TAHOR® 10 mg, 20 mg, 40 mg

comprimé pelliculé

Atorvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que TAHO® comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TAHO®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TAHO®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TAHO®, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TAHO®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Hypocholestérolémiant et hypotriglycéridémiant, inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

- Réduction des hypercholestérolémies pures (types 2a) ou mixtes (types 2 b et 3) en complément d'un régime adapté et assidu. • Hypercholestérolémie familiale homozygote, en addition à d'autres traitements hypolipémiants (notamment LDL aphasés) ou lorsque des tels traitements ne sont pas disponibles. • Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec 3 facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée. • Prévention des événements coronaires et cérébrovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans hyperlipidémie associée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAHO®, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TAHO®, comprimé pelliculé : • si vous êtes allergique à l'atorvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, • si vous avez eu ou avez une maladie du foie, • si vous avez eu des résultats d'analyse des tests de votre fonction hépatique anormaux et inexplicables, • si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que vous n'utilisez pas une méthode de contraception fiable, • si vous êtes enceinte ou essayez de l'être, • si vous allaitez.

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre TAHO®, comprimé pelliculé. • si vous avez une insuffisance respiratoire sévère, • si vous prenez ou avez pris au cours des 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique, (médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes) par voie orale ou injectable. L'association de l'acide fusidique et de TAHO® peut provoquer des problèmes musculaires graves (voir rubrique 4). • si vous avez eu un accident vasculaire cérébral avec saignement dans le cerveau, ou si vous avez eu de petites poches de liquide dans le cerveau suite à un accident vasculaire cérébral, • si vous avez eu des problèmes aux reins, • si l'activité de votre glande thyroïde est insuffisante (hypothyroïdie), • si vous avez présenté dans le passé des courbatures ou des douleurs musculaires répétées et inexplicables, ou si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires, • si vous avez eu des problèmes musculaires pendant un traitement avec d'autres médicaments diminuant les lipides du sang (par exemple une autre statine ou un fibraté), • si vous buvez régulièrement d'importantes quantités d'alcool, • si vous avez eu des antécédents de maladie du foie, • si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans. Si vous présentez l'une des situations ci-dessus, votre médecin vous prescrira une analyse de sang avant, et peut-être pendant, votre traitement par TAHO® afin d'évaluer votre risque de survenue d'effets indésirables musculaires. En effet, le risque d'effets indésirables musculaires, notamment de rhabdomyolyse, peut-être majoré en cas de prise simultanée de certains médicaments avec TAHO® (voir rubrique 2. Autres médicaments et TAHO®, comprimé pelliculé). • Prévenez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire constante. Des examens complémentaires et un traitement peuvent être nécessaires pour la diagnostiquer et la traiter. Au cours de votre traitement avec ce médicament, si vous êtes diabétique ou si vous présentez un risque de survenue d'un diabète, vous serez suivi attentivement par votre médecin. Vous pouvez débiter un diabète si vous avez un taux de sucre (glycémie) et de graisses élevés dans le sang, si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression artérielle (tension) élevée.

Sans
Si v
pre

4.

Comme

ne survient

Si vous ressentez l'un

vos comp

urgence

Rare : pa

en, gonfle

difficulté

sur la p

cutané

piéds,

muscu

atteint

dispara

et entr

Très ra

inhabitue

de votre h

Autres eff

indésirables éventuels de TAHO® :

Fréquent :

Peu fréquent :

Très rare :

Les

symptômes

peuvent inclure

une respiration

bruyante, une douleur

ou oppression

dans la

poitrine, un gonflement

de la paupière, du visage,

des lèvres, de la bouche

ou de la langue

ou de la

gorge, une difficulté à respirer,

une perte de conscience,

une perte d'audition,

un gynécosté

(augmentation de la taille de la poitrine

chez l'homme).

Fréquence indéterminée :

si vous êtes

estimée sur la base des données disponibles

• faiblesse musculaire constante.

Effets indésirables éventuels rapportés avec certaines statines (médicaments du même type) :

• troubles sexuels,

• dépression,

• troubles respiratoires,

• tout toux et/ou essoufflement

persistant ou fibré,

• diabète :

vous pouvez débiter un diabète si vous avez un taux de sucre

(glycémie) et de graisses élevés dans le sang,

si vous êtes en surpoids et si vous avez une pression

artérielle (tension) élevée.

Vous serez suivi attentivement par votre médecin, au cours de votre traitement avec ce médicament.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le Centre National de pharmacovigilance ou sécurité du médicament Pfizer. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER TAHO®, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament

après la date de péremption indiquée sur la boîte après EXP. La date de péremption fait

référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

5.

Comment

conserv

TAHO®,

comprimé

pelliculé ?

Tenir ce

médicament

hors de la

vue et de la

portée des

enfants.

N'utilisez

pas ce

médicament

après la

date de

péremption

indiquée

sur la

boîte après

EXP. La

date de

péremption

fait

référence

au

dernier

jour de

ce

mois.

Pas de

précautions

particulières

de

conservation.

5.

Comment

conserv

TAHO®,

comprimé

pelliculé ?

Tenir ce

médicament

hors de la

vue et de la

portée des

enfants.

N'utilisez

pas ce

médicament

après la

date de

péremption

indiquée

sur la

boîte après

EXP. La

date de

péremption

fait

référence

au

dernier

jour de

ce

mois.

Pas de

précautions

particulières

de

conservation.

5.

Comment

conserv

TAHO®,

comprimé

pelliculé ?

Tenir ce

médicament

hors de la

vue et de la

portée des

enfants.

N'utilisez

pas ce

médicament

après la

date de

péremption

indiquée

sur la

boîte après

EXP. La

date de

péremption

fait

référence

au

dernier

jour de

ce

mois.

Pas de

précautions

particulières

de

conservation.

5.

Comment

conserv

TAHO®,

comprimé

pelliculé ?

Tenir ce

médicament

hors de la

vue et de la

portée des

enfants.

N'utilisez

pas ce

médicament

après la

date de

péremption

indiquée

sur la

boîte après

EXP. La

date de

péremption

fait

référence

au

dernier

jour de

ce

mois.

Pas de

précautions

particulières

de

conservation.

5.

Comment

conserv

TAHO®,

comprimé

pelliculé ?

Tenir ce

médicament

hors de la

vue et de la

portée des

enfants.

N'utilisez

pas ce

médicament

après la

date de

péremption

indiquée

sur la

boîte après

EXP. La

date de

péremption

fait

référence

au

dernier

jour de

ce

mois.

Pas de

précautions

particulières

de

conservation.

5.

Comment

conserv

TAHO®,

comprimé

pelliculé ?

Tenir ce

médicament

hors de la

vue et de la

portée des

enfants.

N'utilisez

pas ce

médicament

après la

date de

péremption

indiquée

sur la

boîte après

EXP. La

date de

péremption

fait

référence

au

dernier

jour de

ce

mois.

Pas de

précautions

particulières

de

conservation.

5.

Comment

Docteur ASKOUR Meryém

Spécialiste en Cardiologie et Maladies Vasculaires
DU de Cardiologie Congénitale et Pédiatrique
Ancienne interne du CHRU de Lille
Echodoppler Cardiaque - Holter ECG
Holter tensionnel - Epreuve d'effort

الدكتورة مريم أسكور

اختصاصية أمراض القلب و الشرايين
خريجة كلية الطب ليل بفرنسا

Casablanca le : 24/04/2020

Anine Abderrahmane

Tono brée Great

NFS-Ploq, HbA1c, GAT

CT, TG, LDL, HDL

Ac. urique, TP

PSA, TSH, VS

GOT, GPT,

Dr. ASKOUR Meryém
Cardiologue
Tél : 05 22 89 07 07

LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALS MADAGASCAR
679, boulevard el Ghor, 20450 - Casablanca
Tél.: 0522 52 03 86 - Fax.: 0522 21 92 41



مختبر منظرنا للتحاليل الطبية
LABORATOIRE MANDARONA
D'ANALYSES MEDICALES

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Casablanca le 28 avril 2020

Monsieur AMINE ABDERRAHMANE

FACTURE N° 120946

Analyses :

Numération formule sanguine -----	B	80	
Vitesse de sédimentation -----	B	30	
Taux de Prothrombine -----	B	40	
Ionogramme sanguin -----	B	160	
Bilan lipidique -----	B	190	
Glycémie -----	B	30	
Hémoglobine glyquée -----	B	100	
Urée -----	B	30	
Créatinine -----	B	30	
Acide urique -----	B	30	
Transaminases OT -----	B	50	
Transaminases PT -----	B	50	
Thyreostimuline (TSH us) -----	B	250	
PSAus total -----	B	300	Total : B 1370

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER

1 860,80 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Mille Huit Cent Soixante Dirhams et Quatre vingt Centimes

LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA
679, boulevard Al Qods 20460 - Casablanca
Tél.: 0522 52 83 88 - Fax: 0521 21 92 41

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste
Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste
Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20
Prélèvement effectué à 08:48
Edition du : 28/04/20

Monsieur AMINE ABDERRAHMANE
Docteur MERYEM ASKOUR
Réf. : 20D723

Compte Rendu d'Analyses

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE

(SYSMEX XS-1000i)

GLOBULES ROUGES

			Normales (Homme Adulte)	Antériorités 30/10/19
Hématies -----:	4,76	M/mm ³	4,5 - 5,55	4,78
Hémoglobine -----:	15,1	g/100 ml	14 - 17	14,8
Hématocrite -----:	45	%	40 - 50	45
- V.G.M. -----:	95	μ ³	80 - 95	
- T.C.M.H. -----:	32	pg	28 - 32	
- C.C.M.H. -----:	34	g/100 ml	30 - 35	

GLOBULES BLANCS

Numération des leucocytes -----:	7 470	/mm ³	4000 - 10000	7020
Formule leucocytaire				
Polynucléaires Neutrophiles -----:	35,9	* %	50 - 70	
Soit :	2 682	/mm ³	2000 - 7500	
Polynucléaires Eosinophiles -----:	1,6	%	1 - 3	
Soit :	120	/mm ³	40 - 300	
Polynucléaires Basophiles -----:	0,3	%	< 1	
Soit :	22	/mm ³	< 100	
Lymphocytes -----:	50,7	* %	20 - 40	
Soit :	3 787	/mm ³	1500 - 4000	
Monocytes -----:	11,5	%	1 - 14	
Soit :	859	/mm ³	40 - 1000	

PLAQUETTES

Résultat -----:	274 000	/mm ³	150000 - 400000	264000
-----------------	---------	------------------	-----------------	--------



Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20

Prélèvement effectué à 08:48

Edition du : 28/04/20

Monsieur AMINE ABDERRAHMANE

Docteur MERYEM ASKOUR

Réf. : 20D723

Compte Rendu d'Analyses

VITESSE DE SEDIMENTATION

(Vacuette Grainer)

			Normales	Antériorités
1 ^{ère} heure -----:	8	mm	< 10	<u>02/02/18</u>
2 ^{ème} heure -----:	17	mm	< 20	2
				10

HEMOSTASE

TAUX DE PROTHROMBINE -----:	100	%	70-100
(STA SATELLITE STAGO)			

BIOCHIMIE SANGUINE

(Cobas Roche C-311)

IONOGRAMME SANGUIN

Sodium -----:	145	mmol/l	136 - 145	30/10/19
Potassium -----:	5,35 *	mEq/l	3,5 - 5,1	143
Calcium -----:	97,60	mg/l	86 - 107	3,97
Chlore -----:	108,8 *	mmol/l	95 - 105	94,00
Protéines Totales -----:	72	g/l	60 - 80	106,9
Bicarbonates -----:	29,50 *	mmol/l	23 - 29	70
				26,30



Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20

Prélèvement effectué à 08:48

Edition du : 28/04/20

Monsieur AMINE ABDERRAHMANE


Docteur MERYEM ASKOUR

Réf : 20D723

Compte Rendu d'Analyses

BILAN LIPIDIQUE

		Normales	Antériorités
Cholesterol total----- :	1,94 g/l	< 2	1,63
Soit :	5 mmol/l	< 5,15	4,2




Cholesterol HDL----- :	0,71 g/l	> 0,4**	0,63
------------------------	----------	---------	------

Cholestérol LDL** ----- :	1,04 g/l	< 1,6 **	0,80
Soit :	2,68 mmol/l	< 4,12	2,06

**Valeurs indicatives , à confronter avec le risque cardio- vasculaire du patient

Triglycérides ----- :	0,94 g/l	< 1,5	0,98
Soit :	1,07 mmol/l	< 1,71	1,12





Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20

Prélèvement effectué à 08:48

Edition du : 28/04/20

Monsieur AMINE ABDERRAHMANE

Docteur MERYEM ASKOUR

Réf. : 20D723


Compte Rendu d'Analyses

Normales

Antériorités

14/03/19

Glycémie à jeûn -----: 1,06 g/l 0,7 - 1,1 0,99
Soit : 5,9 mmol/l 3,88 - 6,11 5,5



Hémoglobine glyquée-----: 5,40 % 4,5 - 6,3 5,50
(Technique HPLC D10 BIO-RAD)

30/10/19

Les valeurs usuelles sont de 4,5 à 6,3 % lorsque les glycémies sont normales.


Les études modernes ont montré que le diabète est :

Bien équilibré lorsque le taux est inférieur à 6,5%

Moyennement lorsqu'il est entre 6,5 à 7,5 %

Mal équilibré au-delà de 8%

A l'évidence les exigences doivent tenir compte de l'âge, de l'ancienneté du diabète et des autres problèmes.





Dr Yahya BENGHALEM

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier


Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20
Prélèvement effectué à 08:48
Edition du : 28/04/20


Monsieur AMINE ABDERRAHMANE
Docteur MERYEM ASKOUR
Réf. : 20D723

Compte Rendu d'Analyses


			Normales	Antériorités
Urée -----	0,27	g/l	0,15 - 0,5	0,27
Soit :	4,5	mmol/l	2,5 - 8,34	4,5



Créatinine -----	8,6	mg/l	6 - 13	8,5
Soit :	76	μmol/l	53 - 115	75



Acide urique -----	59	mg/l	35 - 72	72
Soit :	354	μmol/l	208 - 428	432





Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20

Prélèvement effectué à 08:48

Edition du : 28/04/20


Monsieur AMINE ABDERRAHMANE

Docteur MERYEM ASKOUR


Réf. : 20D723

Compte Rendu d'Analyses

			Normales	Antériorités
Transaminases - SGOT / ASAT -----:	16	UI/l	< 45	16



Transaminases - SGPT / ALAT -----:	17	UI/l	< 49	13
------------------------------------	----	------	------	----




HORMONOLOGIE

TSH us-----:	1,53	μUI/ml	0,27 - 5	1,18
(Chimiluminescence COBAS ROCHE E411)				

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.

Une variation minime de T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH.

Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.



679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste

Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste

Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 28/04/20

Prélèvement effectué à 08:48

Edition du : 28/04/20

Monsieur AMINE ABDERRAHMANE

Docteur MERYEM ASKOUR

Réf. : 20D723


Compte Rendu d'Analyses

MARQUEURS

	Normales	Antériorités
P.S.A. us Total ----- : 3,130 ng/ml		3,090
(Chimiluminescence COBAS ROCHE E411)		

Interprétation

< 40ans	: < 1,4
40 à 50 ans	: < 2,0
50 à 60 ans	: < 3,1
60 à 70 ans	: < 4,1
> 70 ans	: < 4,4



LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA
679, boulevard Al Qods 20460 - Casablanca
Tél.: 0522 52 83 88 - Fax: 0522 87 22 82

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347

M^r Arine Abderrahmane


FC 61/min

QWERT:

DFFFF:


Résultats mesures:

QRS : 76 ms
 QT/QTcB : 374 / 379 ms
 PQ : 190 ms
 P : 102 ms
 RR/PP : 972 / 970 ms
 P/QRS/T : 25 / 0 / 30 degrés
 QTD/QTcBD : 62 / 63 ms
 Sokolow : 2.1 mV
 NK : 3



Interprétation:

*** ATTENTION! MAUVAISE QUALITE DE L'ECG
 onde T près de la ligne isoélectrique (anterior)
 problème d'électrode possible
 Attention peu de QRS similaires !
 ECG normal probable



27/04/2020

Dr. ASKOUR Maryem
Cardiologue

01-Jan-2001 00:53:58

25mm/s 10mm/mV ADS 50Hz 0.08 - 40Hz 4x2.5R3 Mode auto. U6.2 121 (1)