

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

rmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 068539

ND: 31672

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1775 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : MOURCHIEL ABBES

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0669 884975 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 23/05/2023

Nom et prénom du malade : VOLUNTEER YERIE Age:

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : MOURCHIEL SAMIRA

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/06/22		3	3000	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29/06/22	3990

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	29.6.22	328 Fr 303712	4287

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan d

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	[Création, remont, adjonction]		MONTANTS DES SOINS														
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

مصحة الاختصاصات الشفاء

Clinique des Spécialités Achifaa



Angle Rues Laheem El Arjouné et Lavoisier (face Hôpital 20 Août) - Tél. : 05 22 86 22 86
05 22 85 92 20 (19 L.G.) - Fax : 05 22 86 22 23 - Casablanca - Maroc

E-mail : cliniqueachifaa@menara.ma

ABID-ALLAH
عبد الله محسن
Chirurgien Cardio Vascular
جراح القلب والأوعية الدموية
Gsm : 06 61 23 61 24

Casablanca, le : 29/06/2020

Docteur :

M - MOURMID SAMIRA.

Sintrom 4g

Ator 12 NR

Ator 12g 24/7

Ator 12g 24/7

398,00

ABID-ALLAH Mouhcine
عبد الله محسن
Chirurgien Cardio Vascular
جراح القلب والأوعية الدموية
Gsm : 06 61 23 61 24

مصلحة الاختصاصات الشفاء

Clinique des Spécialités Achifaa



Angle Rues Lahcen El Arjouné et Lavoisier (face Hôpital 20 Août) - Tél. : 05 22 86 22 86
05 22 85 92 20 (10 L.G.) - Fax : 05 22 86 22 23 - Casablanca - Maroc

E-mail : cliniqueachifaa@menara.ma

Casablanca, le : 23/06/2020

Docteur :

Mourad SAMIRA

TP

INR

T

PRABID-ALLAH MOUNCINE

الأستاذ عبيد الله محسن

Chirurgien Cardio Vasculaire

جراح للقلب والشرايين

Gsm : 06 61 23 61 24



مختبر المستقبل للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Bahija LAHRAR

Médecin Spécialiste en Analyses Médicales (Biologiste)
Spécialiste en Diagnostic et Thérapeutique des couples infertiles
(IA-FIV-ICSI) Paris - France
Ex Enseignante à la faculté de médecine
CHU Ibn Rochd Casablanca
DU de management de la qualité université Bordeaux

Edité le : 29-juin-20



INPE 093060754

Facture N°: 3037/20

Référence:



2 290620 167278

Date de prélèvement lundi 29 juin 2020

Nom Prénom MOURCHID SAMIRA

Médecin:

Patente (TP) 36155845

ICE 001635929000031

Analyses	Cotation B	Total
1z-Sang (Prise de..)	7	9,38
TP (Contrôle AVK)	25	33,50
	32 B	42,88 dh
	Remise	0,00 dh

Net à payer TTC 42,88 dh

Arrête la présente facture à la somme de

QUARANTE-DEUX DIRHAMS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES

Dr bahija LAHRAR
Médecin Biologiste

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL
Dr LAHRAR BAHIJA
Médecin Biologiste
Résidence Al Madina
Sidi Maarouf Casablanca
05 22 97 35 23



مختبر المستقبل للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Bahija LAHRAR

Médecin Spécialiste en Analyses Médicales (Biologiste)
Spécialiste en Diagnostic et Thérapeutique des couples infertiles
(IA-FIV-ICSI) Paris - France

Ex Enseignante à la faculté de médecine

CHU Ibn Rochd Casablanca

DU de management de la qualité université Bordeaux

Edité le : 29-juin-20

MOURCHID SAMIRA

Date de prélèvement : lundi 29 juin 2020
Référence : 2 290620 167278
Nom Prénom : MOURCHID SAMIRA
Médecin :

SURVEILLANCE DES ANTI-COAGULANTS

Analyse	Résultat	Zone thérapeutique
Taux de Prothrombine	24,7 %	25 à 35 %
INR:	2,98 isi	2,0 à 3,4

Observations:

AVK Sintrom ®
Posologie
Dose moyenne mg, par jour.

Aliments riches en vitamines K. (liste indicative des principaux aliments)

Richesse en vit. K (mg Vit.K pour 100 g)	Quantité inhibant l'activité d'1/2 à 3/4 de comprimé de SINTROM®	Aliments	Commentaire
3,0	30 g	Chou, choucroute, chou-fleur, épinards, brocolis, persil.	À éviter
0,8	125 g	Tomates, carotte	Consommation possible sans exagération
0,6	160 g	Foie de veau	
0,5	200 ml	Huile de tournesol	
0,3	330 g	Mûres, fraises, pêches	
0,3	330 g	Haricots verts, haricots blancs, asperges, champignons.	

Certains médicaments : Signaler toujours que vous êtes sous AVK. Votre médecin vérifie avant la prescription de tout nouveau médicament l'absence d'interaction avec les AVK.

Nous vous rappelons cependant **de ne pas prendre d'anti-inflammatoires** (VOLTARENE®, FELDENE®, PROFENID®, SURGAM®, NIFLURIL® ...) **ni d'aspirine** (ASPEGIC®, SOLUPSAN®, CATALGINE®...) **sans en parler à votre médecin.**

Si votre **TP est < à 15% et/ou l'INR > 4,5** même sans signes hémorragiques, **vous devez également consulter votre médecin.**

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL
Dr LAHRAR BAHJA
Médecin Biologiste
29, Résidence Al Madina
Sidi Maârouf Casablanca
Tél: 05 22 97 36 87
Bahija LAHRAR
Médecin Biologiste

إقامة المدينة العمارة (ج) رقم 29، شارع أبو بكر القادري، سيدي معروف - الدار البيضاء

Résidence Al Madina, Immeuble J N° 29, Bd Abou Bakr El kadiri, Sidi Maârouf - Casablanca

05 22 97 35 23 - 05 22 97 36 87



FACTURE

Le : 29/06/2020

NOM : MOURCHID

PRENOM : Samira

Examen :

Consultation : 300 Dhs

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois cent dirhams.

Pr M Abid-Allah

Chirurgien Cardiovasculaire



• En cas de risque court de saignement
 • En cas d'insuffisance rénale sévère
 • En association avec :
 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf paracétamol)
 - les anticoagulants et par extension, les agents capteurs (médicaments
 antiplaquettaires)

• En cas de risque court de saignement
 • En cas d'insuffisance rénale sévère
 • En association avec :
 - l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale
 - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf paracétamol)
 - les anticoagulants et par extension, les agents capteurs (médicaments
 antiplaquettaires)

Le médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :
- des anticoagulants oraux ;
- des anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes) ;
- des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
- des médicaments capables d'augmenter le risque de saignement (médicaments antiplaquettaires, antiagrégants plaquettaires, héparine, aspirine, etc.).

[illegible]

Le médecin vous prescrira un traitement. Le carnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et de suivi médical) est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'antécédents de saignement sévère.
- En association avec :
- des médicaments anticoagulants ;
- des médicaments anti-inflammatoires ;
- des médicaments à effet capteur (antidépresseurs).

Le médicament est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin.

- En cas de risque connu de saignement.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.
- En association avec :
- des anticoagulants oraux ;
- des anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes) ;
- des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
- des médicaments capables d'augmenter le risque de saignement (médicaments antiplaquettaires).

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazoles),
- le fluorouracile et, par extrapolation, le galur et capecitabine (médicaments anticancéreux).

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.

2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.

5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

• Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),

• Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),

• Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),

• Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),

• Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),

• Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),

• Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),

• Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),

• Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),

• Hypotension (diminution de la pression artérielle),

révenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez informer le médecin qui vous soigne.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec :

• clofazémine (médicament de la dermatite) ;

• système nerveux (voir Contre-indications) ;

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec :

• diltiazem ou le verapamil (médicaments pour le cœur) ;

• les médicaments à effet sédatif (voir la notice de garde spéciales).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement surveillé.

Certains effets du traitement sont observés chez le nouveau-né.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le système cardiovasculaire.

Un principe actif pouvant induire une baisse de la tension artérielle lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire d'un véhicule

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et de la réponse à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA POSOLOGIE MÉDICALE.

Précautions d'emploi

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou années.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.

2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.

5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

• Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).

• Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement).

• Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).

• Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).

• Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine).

• Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).

• Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque).

• Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères).

• Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère).

• Hypotension (diminution de la pression artérielle).

révenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez en informer votre médecin.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec :

• clofazimine (médicament de la dermatite).

• système nerveux (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec :

• diltiazem ou le verapamil (médicaments pour le cœur).

• garde spéciales).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement surveillé.

Certains effets du traitement sont observés chez le nouveau-né.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le système cardiovasculaire.

Un principe actif pouvant induire une baisse de la tension artérielle.

Il est recommandé de surveiller la tension artérielle pendant le traitement.

Effets sur l'aptitude à conduire d'un véhicule

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie.

Adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA POSOLOGIE MÉDICALE.

Précautions d'emploi

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou années.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.

2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.

5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

• Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),

• Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),

• Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),

• Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),

• Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),

• Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),

• Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),

• Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),

• Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),

• Hypotension (diminution de la pression artérielle),

révenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez en informer votre médecin.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec :

• clofazimine (médicament de la dermatite) ;

• système nerveux (voir Contre-indications) ;

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec :

• diltiazem ou le verapamil (médicaments pour le cœur) ;

• garde spéciales).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement surveillé.

Certains effets du traitement sont observés chez le nouveau-né.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le système cardiovasculaire.

Un principe actif pouvant induire une baisse de la tension artérielle lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire d'un véhicule

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et de la réponse à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, la durée de traitement est prolongée de quelques mois ou années.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.

2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.

5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

• Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).

• Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement).

• Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).

• Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).

• Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine).

• Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).

• Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque).

• Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères).

• Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère).

• Hypotension (diminution de la pression artérielle).

révenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention, informez le médecin. Il vous indiquera le traitement à prendre.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec des médicaments à base de flécaféline (médicament de la douleur).

Ce médicament DOIT ETRE pris avec des médicaments à base de diltiazem ou le verapamil (médicaments pour le cœur).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, informez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, un traitement de substitution du nouveau-né est nécessaire pour éviter certains effets du traitement.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le système cardiovasculaire.

Il est donc recommandé de ne pas conduire ou de ne pas utiliser de machines pendant le traitement.

Effets sur l'aptitude à conduire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et de la réponse à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.

2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.

5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

• Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement).

• Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement).

• Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque).

• Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque).

• Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine).

• Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).

• Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque).

• Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères).

• Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère).

• Hypotension (diminution de la pression artérielle).

prévenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez informer le médecin.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ avec d'autres médicaments (voir Contre-indications).

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.

2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.

3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.

4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.

5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?

3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire.

Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

• Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),

• Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),

• Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),

• Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),

• Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),

• Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),

• Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),

• Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),

• Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),

• Hypotension (diminution de la pression artérielle),

révenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez en informer votre médecin.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec des médicaments à base de clofénine (médicament de la douleur).

Ce médicament DOIT ÊTRE pris avec des médicaments à base de diltiazem ou le verapamil (médicaments pour le cœur).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, un traitement de substitution du nouveau-né est nécessaire pour éviter certains effets du traitement.

Ce traitement est contre-indiqué pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le principe actif pouvant induire une baisse de la tension artérielle lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire d'un véhicule

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et doit être adaptée à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA PRESCRIPTION MÉDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, la durée de traitement est prolongée de quelques mois ou années.

ATENOR® 100 mg

Comprimés sécables

Aténolol

Boîtes de 14 ; 28 ou 56

1. Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes.
2. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'elle.
3. Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
4. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif.
5. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
6. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

37,00

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ATENOR et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ATENOR, Comprimés ?
3. Comment prendre ATENOR, Comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ATENOR, Comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ATENOR, Comprimés ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique BETA-BLOQUANT/SELECTIF.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un «bêta-bloquant». Il diminue certains effets, (dits effets bêta) du système sympathique de régulation cardiovasculaire. Ce médicament est préconisé dans les cas suivants :

- Hypertension artérielle,
- Prévention des crises douloureuses de l'angine de poitrine,
- Après un infarctus du myocarde,
- Certains troubles du rythme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATENOR ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais ATENOR :

- Asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement),
- Insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement),
- Choc cardiogénique (choc d'origine cardiaque),
- Bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (certains cas de troubles de la conduction cardiaque),
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (variété de crises d'angine de poitrine),
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- Bradycardie importante (< 45 - 50 battements par minute) (ralentissement du rythme cardiaque),
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères),
- Pheochromocytome non traité (excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère),
- Hypotension (diminution de la pression artérielle),

revenir le médecin en cas d'insuffisance rénale, certaines (Raynaud).

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, vous devez en informer votre médecin.

Autres médicaments et ATENOR

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament NE DOIT PAS être pris avec des médicaments à base de flécaféline (médicament de la douleur) ou de la diltiazem ou le verapamil (médicament contre l'hypertension). Ce médicament DOIT ETRE EVITE avec des médicaments à base de flécaféline (médicament de la douleur) ou de la diltiazem ou le verapamil (médicament contre l'hypertension).

Si vous prenez ou avez pris récemment un médicament obtenu sans ordonnance, consultez votre pharmacien.

Interactions avec les aliments

Sans objet.

Interactions avec les produits naturels

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse. Si ce traitement est pris en fin de grossesse, le nouveau-né est nécessairement surveillé pour certains effets du traitement. Ce traitement est contre-indiqué pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que ce médicament agit sur le système cardiovasculaire. Un principe actif pouvant induire une baisse de la tension artérielle lors des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire d'un véhicule

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE ATENOR

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie

La posologie est variable en fonction de la maladie et de la réponse à chaque patient.

Mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés entiers.

Fréquence d'administration

DANS TOUS LES CAS, SEULEMENT LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Durée de traitement

Dans la majorité des affections, le traitement est prolongé de quelques mois ou années.