

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Déclaration : contact@mupras.com
Mise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 065415

35676

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11236 Société : R.A.M.

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : EL HANKAOUI NOUREDDINE

Date de naissance : 31/10/1957

Adresse : F7, 3 D, Residence AL WAHDA

Boulevard MOHAMMED V - BERRECHID

Tél. : 06-41-24-65-43 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : EL MOATAQID - LAILA Age : 40

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Trucule de Cycle

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 25 / 8 / 2020

Signature de l'adhérent(e) : ANG

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/08/2020	C2	25000		
20/07/2020	C2	25000		

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
05-08-20	14010	
20-07-20	18680	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E



معيمة (السفءاء - برشيد)
CLINIQUE CHIFA - BERRECHID



060002557

ORDONNANCE

Berrechid le : 20/07/2020

Mme: EL MOATAAD LAILA



46.70 - Primolut NDR (ou 3aile)

x 4

186.80

1cl/1

1m → 125

2 mois

Pharmacie 2005
Docteur Kadiri L. Zineb
12, bd Mohammed V - BERRECHID
Téléphone : 05 22 32 75 98



Dr. EL MOATAAD LAILA
Gynécologue - Accoucheur
7 Lot JADDAH - BERRECHID
Tél: 0522 327598 Fax: 0522 328081



Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Norethistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
3. Comment utiliser Primolut-Nor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour décaler la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de norethistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la norethistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte
- si vous allaitez

• si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

• si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

• si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

• si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

• si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

• si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor. L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en oestrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue

46,70

Primolut® Nor

10 mg 30 comprimés



Si vous développez des symptômes d'angoisse, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'oestrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'angoisse.

Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Précaution de Primolut-Nor

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux oestroprogestatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poulmon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits oestrogéniques combinés (faible dose d'oestrogène, moins de 50 microgrammes d'éthinylestradiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement.

QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?

Examens médicaux réguliers

Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions » ; n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches parents)



Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Norethistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
3. Comment utiliser Primolut-Nor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour décaler la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de norethistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la norethistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte
- si vous allaitez

• si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

• si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

• si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

• si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

• si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

• si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor. L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en oestrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

Primolut® Nor

10 mg 30 comprimés



6 118000 120568

Si vous développez des symptômes d'angoisse, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'oestrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'angoisse. Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Primolut-Nor et thrombose
Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux oestroprogestatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poulmon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits oestrogéniques combinés (faible dose d'oestrogène, moins de 50 microgrammes d'éthinylestradiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement.

QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?

Examens médicaux réguliers

Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si

- vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions » ; n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches parents)



Primolut-Nor® 10 mg

Comprimés

Acétate de Norethistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut-Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
3. Comment utiliser Primolut-Nor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour décaler la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de norethistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la norethistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte
- si vous allaitez

• si vous avez ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

• si vous avez ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

• si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

• si vous avez ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

• si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

• si vous avez ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor. L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en oestrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

Primolut® Nor

10 mg 30 comprimés



6 118000 120568

Si vous développez des symptômes d'angoisse, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'oestrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'angoisse.

Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Précautions d'usage de Primolut-Nor

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux oestroprogestatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poulmon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits oestrogéniques combinés (faible dose d'oestrogène, moins de 50 microgrammes d'éthinylestradiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement.

QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?

Examens médicaux réguliers

Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions » ; n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches parents)



مصحف (الشفا) - برشيد
CLINIQUE CHIFA - BERRECHID



060002557

ORDONNANCE

Berrechid le : 05/08/2020

Mme : EMATAQID. LAILA



46.70 - primolut not (033 seule)

x3

140.10

14/11

111 -> 125

/ pelt 6 mois

Dr. EL KADRI, J
Gynécologue - Accoucheur
7 Lot JADDAH BERRECHID
Tél: 05 22 32 75 98 Fax: 05 22 32 80 81

Pharmacie 2000
Docteur Kadiri L. Zineb
22, bd Mohammed V - BERRECHID
Téléphone 022.53.36.05





Primolut® Nor 10 mg

Comprimés

Acétate de Norethistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
3. Comment utiliser Primolut-Nor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour décaler la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de norethistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la norethistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

• si vous allaitez

- si vous avez eu ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez eu ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

• si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez eu ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

• si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

- si vous avez eu ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

• si vous avez eu ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez eu ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor. L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en oestrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

Primolut® Nor

10 mg 30 comprimés



6 118000 120568

Si vous développez des symptômes d'angoisse, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'oestrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'angoisse. Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Primolut-Nor et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux oestroprogestatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poulmon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits oestrogéniques combinés (faible dose d'oestrogène, moins de 50 microgrammes d'éthinylestradiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement.

QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?

Examens médicaux réguliers

- Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions » ; n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches parents)



Primolut® Nor 10 mg

Comprimés

Acétate de Norethistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
3. Comment utiliser Primolut-Nor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour décaler la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de norethistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la norethistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

• si vous allaitez

- si vous avez eu ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez eu ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

- si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez eu ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologiques focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

- si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

- si vous avez eu ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

- si vous avez eu ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez eu ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor. L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en oestrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

Primolut® Nor

10 mg 30 comprimés



6 118000 120568

Si vous développez des symptômes d'angoisse, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'oestrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'angoisse. Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Primolut-Nor et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau.

Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux oestroprogestatifs augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poulmon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits oestrogéniques combinés (faible dose d'oestrogène, moins de 50 microgrammes d'éthinylestradiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement.

QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?

Examens médicaux réguliers

- Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions » ; n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches parents)



Primolut® Nor 10 mg

Comprimés

Acétate de Norethistérone

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser les comprimés Primolut Nor car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?
3. Comment utiliser Primolut-Nor ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver les comprimés Primolut-Nor ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Primolut-Nor et dans quel cas est-il utilisé ?

Primolut-Nor est un produit dit progestatif (produit à progestérone) c.-à-d. un produit hormonal de synthèse possédant des caractéristiques similaires à celles de la progestérone, qui est une hormone féminine naturelle.

Primolut-Nor est utilisé pour le traitement de différentes hémorragies dysfonctionnelles et de l'absence de règles (aménorrhée) due à diverses causes, pour soulager les symptômes du syndrome prémenstruel, pour le traitement d'une affection de la glande mammaire (mastopathie), pour décaler la menstruation et pour le traitement de l'endométriose.

Primolut-Nor contient de l'acétate de norethistérone, qui est parfois utilisé pour traiter des maladies autres que celles mentionnées dans cette notice. Si nécessaire, demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien ou un autre professionnel de santé et suivez toujours leurs instructions.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Primolut-Nor ?

N'utilisez jamais Primolut-Nor

- si vous êtes allergique à la norethistérone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6)
- si vous êtes enceinte ou si vous pensez être enceinte

• si vous allaitez

- si vous avez eu ou vous avez eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (causés par une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau)

- si vous avez eu ou vous avez eu une maladie qui peut être un signe précurseur soit d'une crise cardiaque (par ex. angine de poitrine, causant une douleur thoracique intense et pouvant irradier vers le bras gauche) soit d'un accident vasculaire cérébral (par ex. accident ischémique transitoire sans séquelles irréversibles)

- si vous présentez plusieurs facteurs de risque de thrombose

- si vous avez eu ou vous avez eu un certain type de migraine (accompagné de symptômes des neurologues focaux, comme des troubles de la vision, des difficultés d'élocution ou des sensations de faiblesse ou d'engourdissement dans une partie du corps)

- si vous avez un diabète accompagné de lésions vasculaires

- si vous avez eu ou vous avez eu une maladie sévère du foie et que votre médecin vous a dit que votre fonction hépatique ne s'est pas encore normalisée ; les symptômes d'une maladie du foie peuvent être, par exemple, une jaunisse et/ou des démangeaisons généralisées

- si vous avez eu ou vous avez eu une tumeur du foie bénigne ou maligne

- si vous avez eu ou vous avez eu une tumeur maligne dont la croissance est influencée par les hormones sexuelles, comme un cancer du sein ou un cancer des organes de reproduction.

Si vous développez l'une des maladies ou l'un des états mentionnés ci-dessus pour la première fois pendant l'utilisation des comprimés Primolut-Nor, arrêtez leur utilisation et contactez un médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Primolut-Nor. L'hormone sexuelle (la progestérone) contenue dans ce produit se transforme partiellement en oestrogène. Pour cette raison, il faut prendre en considération, non seulement les mises en garde concernant les comprimés Primolut-Nor, mais aussi les mises en garde générales concernant les contraceptifs combinés.

Pendant l'utilisation de Primolut-Nor, une prudence spéciale s'impose dans certaines situations. Des examens médicaux réguliers peuvent être nécessaires. Discutez avec votre médecin avant de commencer l'utilisation de Primolut-Nor si l'un des états suivants vous concerne ou si vous développez ces états ou qu'ils

s'aggravent pendant l'utilisation de ce médicament :

- si vous fumez
- si vous êtes diabétique
- si vous avez un surpoids important
- si vous êtes hypertendue

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

• si vous

Primolut® Nor

10 mg 30 comprimés



Si vous développez des symptômes d'ango-œdème, comme un gonflement du visage, de la langue ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire accompagnée de difficultés respiratoires. Les produits contenant de l'oestrogène peuvent causer ou aggraver ces symptômes d'ango-œdème. Consultez votre médecin en cas d'apparition pour la première fois, de récidive ou d'aggravation d'un des états mentionnés ci-dessus pendant l'utilisation de Primolut-Nor.

Précaution de Primolut-Nor

Thrombose et thrombose

Une thrombose est un caillot sanguin à l'intérieur d'un vaisseau sanguin pouvant causer l'obstruction du vaisseau. Les résultats des recherches indiquent que l'utilisation de contraceptifs oraux œstrogéniques augmente le risque de thrombose chez la femme comparé à une femme qui ne prend aucun contraceptif oral.

Une thrombose peut survenir dans les veines profondes de la jambe (thrombose veineuse profonde). Une thrombose veineuse peut se développer même si vous n'utilisez pas de contraceptifs oraux. Elle peut aussi se développer pendant la grossesse. Si le caillot sanguin se détache et se met en mouvement dans la veine où il s'est formé, il peut migrer jusqu'aux artères pulmonaires, les boucher et causer un caillot de sang dans un vaisseau du poulmon (une embolie pulmonaire). Dans de rares cas, des thromboses peuvent aussi survenir dans les vaisseaux cardiaques et elles peuvent entraîner une crise cardiaque. Une thrombose ou une rupture d'un vaisseau sanguin du cerveau peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Le risque total de thromboembolie veineuse chez les utilisatrices de produits œstrogéniques combinés (faible dose d'oestrogène, moins de 50 microgrammes d'éthinylestradiol) est 2-3 fois plus élevé que chez les non-utilisatrices qui ne sont pas enceintes. Le risque accru est inférieur au risque lié à la grossesse ou à l'accouchement.

La thromboembolie veineuse qui se manifeste sous forme d'une thrombose veineuse profonde et/ou d'une embolie pulmonaire peut apparaître au cours de l'utilisation de tout contraceptif combiné.

Dans des cas extrêmement rares, une thrombose peut survenir dans d'autres organes, comme le foie, les intestins, les reins, le cerveau ou les yeux.

Le risque de thrombose est accru aussi immédiatement après l'accouchement. **QUAND CONTACTER VOTRE MÉDECIN ?**

Examens médicaux réguliers

Lorsque vous utilisez Primolut-Nor, votre médecin vous dira dans quels cas vous devez vous faire examiner à intervalles réguliers.

Contactez votre médecin dans les plus brefs délais si vous observez des changements dans votre état de santé, tout particulièrement si ces changements se rapportent à des aspects mentionnés dans cette notice (voir aussi rubriques « N'utilisez jamais Primolut-Nor » et « Avertissements et précautions » ; n'oubliez pas les facteurs concernant vos proches parents)