

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0045519

☐ Maladie ☐ Dentaire ☒ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 552 Société : RAN
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : EL Biri My abdellah
Date de naissance : 31/4/63
Adresse : Agence HM ALITHRA DES ORAL AL MAROCC
N° 06
Tél. : 06 Total des frais engagés : 228,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. RUDAIA Nina
Gynécologue-Obstétricienne
21, Av. Massoud Witquawi
Boite No 11 Hay Es-Saloni
20000 Casablanca

Date de consultation : 10/02/2020
Nom et prénom du malade : Dussikiss Age : 47

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Metron

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 04/02/2020

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/02/2020	ca		Cachet	Dr. RUDALA Aina Gynécologue-Obstétricienne 21, Av. Massaoud Wilqawi Appt. N° 11 Hay Es-Salam AGADIR - 05 29 31 26 93

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ADLOUM F. ADLOUM EL HADJ Bt. El Houde Bloc K N° 370 T : 05.28.32.11.12 AGADIR	10-02-20	228,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 G 35533411 11433553 B [Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Alina RUDAIA
Spécialiste
en Gynécologie-Obstétrique



الدكتورة ألينا رودايا
إختصاصية
في أمراض النساء و التوليد

أكادير في: 10 FEB 2020 Agadir le:

Oussikriss Archa

57.00 x 4

Luteryl

1 cp/j

du J15 ... J24.



228.00

Dr. RUDAIA Alina
Gynécologue-Obstétricienne
N° 21, Av. Massaoud Wifqawi
Appt. N° 11 Hay Es-Salam
05 28 21 26 05

N° 21 Av. Massaoud Wifqawi, Appt. N° 11, Hay Es-Salam - Agadir

21 شارع مسعود الوفاوي, رقم 11, حي السلام - أكادير

www.gynecologue-agadir.com

05 28 21 26 05

LUTENYL®

comprimé sécable
Nomégestrol acétate

maphar
km 10, route côtière 117,
quartier Industriel, Zouafra, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
LUTENYL 5mg CP SEC. B10
P.N°: 57.00 DH
6 118000 010989

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LUTENYL, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LUTENYL, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LUTENYL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PROGESTATIFS,

(G: Hormones sexuelles et système génito-urinaire).

Classe pharmaco-thérapeutique: PROGESTATIFS,

Code ATC: G03DB04.

- Chez la femme avant la ménopause :
les troubles du cycle liés à une sécrétion
progestéronique insuffisante ou
absente, notamment :
 - o les anomalies de la durée du cycle :
oligoménorrhée (diminution quantitative des
règles), polyménorrhée (règles trop fréquentes,
cycles menstruels dont la durée est inférieure
à 24 jours), spanioménorrhée (allongement du
cycle menstruel au-delà de 35 jours),
aménorrhée (absence de règles) ;
 - o saignements gynécologiques ;
 - o les manifestations fonctionnelles précédant ou
accompagnant les règles: douleurs des règles,
syndrome prémenstruel, douleurs des seins.
- Chez la femme ménopausée : cycles artificiels
en association avec un œstrogène.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LUTENYL, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais LUTENYL, comprimé sécable :

- Accidents ou antécédents thrombo-emboliques
artériels (en particulier infarctus du myocarde,
accident vasculaire cérébral).
- Accidents thrombo-emboliques ou antécédents

Posologie/Fréquence d'administration/ Durée de traitement

Avant la ménopause, habituellement un comprimé par
jour, par voie orale, du 16^{ème} au 25^{ème} jour du cycle.

A la ménopause, le traitement sera pris pendant
12 à 14 jours par mois en association avec
un œstrogène.

La posologie et la durée du traitement pourront être
modifiées en fonction de la nature de l'indication et
de la réponse au traitement.

Se conformer strictement à la prescription du
médecin traitant.

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de
ce médicament, demandez plus d'informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout
le monde.

Parfois, modification des règles, aménorrhée (absence
de règles), saignements intercurrents, aggravation
d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs.

Exceptionnellement :

- allergie cutanée, fièvre, troubles visuels, accidents
thrombo-emboliques veineux (phlébite),
- prise de poids, insomnie, pilosité, troubles
gastro-intestinaux.

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

LUTENYL®

comprimé sécable
Nomégestrol acétate

maphar
km 10, route côlière 117,
quartier Industriel, Zouafra, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
LUTENYL 5mg CP SEC. B10
P.N°: 57.00 DH
6 118000 010989

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LUTENYL, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LUTENYL, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LUTENYL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PROGESTATIFS,

(G: Hormones sexuelles et système génito-urinaire).
Classe pharmaco-thérapeutique: PROGESTATIFS,
Code ATC: G03DB04.

- Chez la femme avant la ménopause :
les troubles du cycle liés à une sécrétion
progestéronique insuffisante ou
absente, notamment :
 - o les anomalies de la durée du cycle :
oligoménorrhée (diminution quantitative des
règles), polyménorrhée (règles trop fréquentes,
cycles menstruels dont la durée est inférieure
à 24 jours), spanioménorrhée (allongement du
cycle menstruel au-delà de 35 jours),
aménorrhée (absence de règles) ;
 - o saignements gynécologiques ;
 - o les manifestations fonctionnelles précédant ou
accompagnant les règles: douleurs des règles,
syndrome prémenstruel, douleurs des seins.
- Chez la femme ménopausée : cycles artificiels
en association avec un œstrogène.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LUTENYL, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais LUTENYL, comprimé sécable :

- Accidents ou antécédents thrombo-emboliques
artériels (en particulier infarctus du myocarde,
accident vasculaire cérébral).
- Accidents thrombo-emboliques ou antécédents

Posologie/Fréquence d'administration/ Durée de traitement

Avant la ménopause, habituellement un comprimé par
jour, par voie orale, du 16^{ème} au 25^{ème} jour du cycle.
A la ménopause, le traitement sera pris pendant
12 à 14 jours par mois en association avec
un œstrogène.

La posologie et la durée du traitement pourront être
modifiées en fonction de la nature de l'indication et
de la réponse au traitement.

Se conformer strictement à la prescription du
médecin traitant.

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de
ce médicament, demandez plus d'informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout
le monde.

Parfois, modification des règles, aménorrhée (absence
de règles), saignements intercurrents, aggravation
d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs.

Exceptionnellement :

- allergie cutanée, fièvre, troubles visuels, accidents
thrombo-emboliques veineux (phlébite),
- prise de poids, insomnie, pilosité, troubles
gastro-intestinaux.

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

LUTENYL®

comprimé sécable
Nomégestrol acétate

maphar
km 10, route côlière 117,
quartier Industriel, Zouafra, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
LUTENYL 5mg CP SEC. B10
P.N°: 57.00 DH
6 118000 010989

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LUTENYL, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LUTENYL, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LUTENYL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PROGESTATIFS,

(G: Hormones sexuelles et système génito-urinaire).
Classe pharmaco-thérapeutique: PROGESTATIFS,
Code ATC: G03DB04.

- Chez la femme avant la ménopause :
les troubles du cycle liés à une sécrétion
progestéronique insuffisante ou
absente, notamment :
 - o les anomalies de la durée du cycle :
oligoménorrhée (diminution quantitative des
règles), polyménorrhée (règles trop fréquentes,
cycles menstruels dont la durée est inférieure
à 24 jours), spanioménorrhée (allongement du
cycle menstruel au-delà de 35 jours),
aménorrhée (absence de règles) ;
 - o saignements gynécologiques ;
 - o les manifestations fonctionnelles précédant ou
accompagnant les règles: douleurs des règles,
syndrome prémenstruel, douleurs des seins.
 - Chez la femme ménopausée : cycles artificiels
en association avec un œstrogène.
- ## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LUTENYL, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais LUTENYL, comprimé sécable :

- Accidents ou antécédents thrombo-emboliques
artériels (en particulier infarctus du myocarde,
accident vasculaire cérébral).
- Accidents thrombo-emboliques ou antécédents

Posologie/Fréquence d'administration/ Durée de traitement

Avant la ménopause, habituellement un comprimé par
jour, par voie orale, du 16^{ème} au 25^{ème} jour du cycle.
A la ménopause, le traitement sera pris pendant
12 à 14 jours par mois en association avec
un œstrogène.

La posologie et la durée du traitement pourront être
modifiées en fonction de la nature de l'indication et
de la réponse au traitement.

Se conformer strictement à la prescription du
médecin traitant.

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de
ce médicament, demandez plus d'informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout
le monde.

Parfois, modification des règles, aménorrhée (absence
de règles), saignements intercurrents, aggravation
d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs.

Exceptionnellement :

- allergie cutanée, fièvre, troubles visuels, accidents
thrombo-emboliques veineux (phlébite),
- prise de poids, insomnie, pilosité, troubles
gastro-intestinaux.

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne

LUTENYL®

comprimé sécable
Nomégestrol acétate

maphar
km 10, route côlière 117,
quartier Industriel, Zouafra, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
LUTENYL 5mg CP SEC. B10
P.N°: 57.00 DH
6 118000 010989

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que LUTENYL, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
3. Comment prendre LUTENYL, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LUTENYL, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE LUTENYL, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PROGESTATIFS,

(G: Hormones sexuelles et système génito-urinaire).

Classe pharmaco-thérapeutique: PROGESTATIFS,

Code ATC: G03DB04.

- Chez la femme avant la ménopause :
les troubles du cycle liés à une sécrétion
progestéronique insuffisante ou
absente, notamment :
 - o les anomalies de la durée du cycle :
oligoménorrhée (diminution quantitative des
règles), polyménorrhée (règles trop fréquentes,
cycles menstruels dont la durée est inférieure
à 24 jours), spanioménorrhée (allongement du
cycle menstruel au-delà de 35 jours),
aménorrhée (absence de règles) ;
 - o saignements gynécologiques ;
 - o les manifestations fonctionnelles précédant ou
accompagnant les règles: douleurs des règles,
syndrome prémenstruel, douleurs des seins.
- Chez la femme ménopausée : cycles artificiels
en association avec un œstrogène.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LUTENYL, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais LUTENYL, comprimé sécable :

- Accidents ou antécédents thrombo-emboliques artériels (en particulier infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral),
- Accidents thrombo-emboliques ou antécédents

Posologie/Fréquence d'administration/ Durée de traitement

Avant la ménopause, habituellement un comprimé par jour, par voie orale, du 16^{ème} au 25^{ème} jour du cycle.

A la ménopause, le traitement sera pris pendant 12 à 14 jours par mois en association avec un œstrogène.

La posologie et la durée du traitement pourront être modifiées en fonction de la nature de l'indication et de la réponse au traitement.

Se conformer strictement à la prescription du médecin traitant.

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Parfois, modification des règles, aménorrhée (absence de règles), saignements intercurrents, aggravation d'une insuffisance veineuse des membres inférieurs.

Exceptionnellement :

- allergie cutanée, fièvre, troubles visuels, accidents thrombo-emboliques veineux (phlébite),
- prise de poids, insomnie, pilosité, troubles gastro-intestinaux.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne