

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 047899

ND: 28877

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1069 Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : ZALBI Mohamed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : ☐ Lui-même

☐ Conjoint

Age :

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-047899

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des travaux

O.D.F. Prothèses dentaires	Détermination du coefficient masticatoire	Coefficient des travaux												
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D 00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">G</td> </tr> </table>	H		25533412	21433552	D 00000000	00000000	00000000	00000000	35533411	11433553	G		
	H													
	25533412	21433552												
	D 00000000	00000000												
00000000	00000000													
35533411	11433553													
G														

(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession	Date du devis	Fin de

VOLET ADHERENT	NOM :	Mle
DECLARATION N°	W18-348616	
Date de Dépôt	Montant engagé	Nbre de pièces Jointes

Durée de validité de cette feuille est de (3) trois mois
Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle



W18-348616

DATE DE DEPOT

...../...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT	Mle
Nom & Prénom	
Fonction :	Phones
Mail	

MEDECIN	Prénom du patient
Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant ☐	Age
Nature de la maladie	Date
	Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires
05/06/2020	9+15=24	2800 DH

PHARMACIE	Date
Montant de la facture	05.06.2020
693,50	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES	Date
Désignation des Coefficients	05/06/2020
Montant détaillé des Honoraires	
Echodoppler	800 DH
des vaisseaux du CDR	

AUXILIAIRES MEDICAUX	Date
Nombre	Montant détaillé des Honoraires
AM PC IM IV	

Siham BELAICHE
Cardiologue
Bd. Ibn Tachfine et Adra
El Mourakouchi 3ème étage
Casablanca - Tel: 0522 0171 53

MAACIE TAL
05 22 91 31 00
Boulevard de la Liberté
Casablanca

MAACIE TAL
05 22 91 31 00
Boulevard de la Liberté
Casablanca

Dr. Siham BELAICHE
Cardiologue
Angle Bd Ibn Tachefine et Ibn El Adraa
El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5
Casablanca - Tél.: 05 22 61 99 85

Dr. Siham BELAICHE
Cardiologue
Angle Bd Ibn Tachefine et Ibn El Adraa
El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5
Casablanca - Tél.: 05 22 61 99 85

Zaouli Hamoud

30,70 x 3

Koe elyic 75

400

57,80 x 3

400

400

56,10 x 4

400

400

489,90

400

زاوية شارع ابن تاشفين وابن العدرء المراكشي . إقامة فاطمة الزهراء II الطابق الثالث رقم 5

(فوق آسيا و BMCE) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 61 11 33

Angle Bd Ibn Tachefine et Ibn El Adraa El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5
Casablanca (au dessus de Acima et BMCE) - Tél : 05 22 61 11 33

LOT : 19E004
PER: 04 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



LOT : 19E004
PER: 04 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



LOT : 19E002
PER: 01 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



LOT : 200129
UT AV : 01/2023
PPV : 57,80 DH

LOT : 200129
UT AV : 01/2023
PPV : 57,80 DH

LOT : 191896
UT AV : 12/2022
PPV : 57,80 DH

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés





د 14/2/2020

Zaegui Hamoud.

30.10

Kardex

زكي

57.80

Labor

ف

56.10

Cher



Dr. Siham Belaiche
Cardiologue
Angle Bd Ibn Tachefine et Adraa
El Mourakouchi 3ème Etage N° 5
Casablanca - Tél: 05 22 61 11 33



زاوية شارع ابن تاشفين و ابن العدرء المراكشي ، إقامة فاطمة الزهراء II الطابق الثالث رقم 5
أفوق أسيا و (BMCE) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 61 11 33

LOT : 19FD03
PER.: 04 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



LD-NCR 10mg

30 comprimés pelliculés



LOT : 200128
UT AV: 01/2023
PPV: 57,80 DH

LOT N°:



20/10/2020

cha confiro

Je vous confiro

M^r Zaiguen Harroushi

AVC ischémique

avec hémiparésie gauche

pour 20 jours

cardiologue

Dr. Siham BELAICHE
Cardiologue
Angle Bd. Ibn Tachefine et Adraa
El Mourakouchi 3ème Etage N°5
Casablanca - Tél: 05 22 61 11 33

زاوية شارع ابن تاشفين المراكشي، إقامة فاطمة الزهراء II الطابق الثالث رقم 5

(فوق أسيا و BMCE) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 61 11 33

Angle Bd Ibn Tachefine et Ibn El Adraa El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5

Casablanca (au dessus de Acima et BMCE) - Tél : 05 22 61 11 33



Dr. Siham BELAICHE

cha confère

Je vous confère

Zaegreen Hammoud

peut-être

AVC inhomogène

recat. R. P. P.

cardiologue

Dr. Siham BELAICHE - Dr. Siham

زاوية شارع ابن تاشفين وابن العدراء المراكشي . إقامة فاطمة الزهراء II الطابق الثالث رقم 5

(فوق أسيا و BMCE) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 61 11 33

Angle Bd Ibn Tachefine et Ibn El Adraa El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5
Casablanca (au dessus de Acima et BMCE) - Tél : 05 22 61 11 33

- cardiopap

a tout l'air sein
deux une coupe de la
spécialité

Cardi-Pap

Dr. Fiham BELAICHE
Cardiologue
Angle Bd. Ibn Tachfine et Adrar
El Mourakchi 3ème Etage N° 5
Casablanca Tel: 0522 61 11 33



de 5/06/2020

Zaigui Hammed
10180x2
3970x3
5780x3
5610x4
Δ pipette x 3
Δ 2000

2000
Δ 2000

Dr. Siham BELAICHE
CARDIOLOGUE

Angle Bd. Ibn Tachfine et Ibn
El Adraâ El Mourakouchi
Casablanca - Tél: 0522 61 11 33

693,50

زاوية شارع ابن تاشفين وابن العدرء المراكشي ، إقامة فاطمة الزهراء II الطابق الثالث رقم 5

(فوق أسيا و BMCE) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 61 11 33

Angle Bd Ibn Tachfine et Ibn El Adraa El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5

Casablanca (au dessus de Acima et BMCE) - Tél : 05 22 61 11 33

LOT : 20E009
PER.: 07 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

LOT : 20E009
PER.: 07 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

LOT : 19E002
PER.: 07 2021

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V : 30DH70



6 118000 061847

COVERSYL®

Péridopril arginine
Comprimés pelliculés sécables

5 mg



6 118000 100294

109,80

COVERSYL®

Péridopril arginine
Comprimés pelliculés sécables

5 mg



6 118000 100294

109,80

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 082217

LOT : 200178
UT AV : 01/2023
PPV : 57,80 DH

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 082217

LOT : 200178
UT AV : 01/2023
PPV : 57,80 DH

LOT : 200129
UT AV : 01/2023
PPV : 57,80 DH

UT AV :

LOT N° :

PPV (DH) :



dc 5/06/20

Zaoui Hammed

AVC ischémique
du Tronc cérébral.

- Echographie
Vasculaire

Lot 341, L'ensemble El Mouzaidine
Bd La Gracie Ceinture Ref. Darrouisseme
Hay Mohammadi Casablanca
Tél: 0611 37 42 89

Dr. Siham BELAICHE
CARDIOLOGUE
Angle Bd. Ibn Tachfine et Ibn
El Adraa El Mourakouchi
Casablanca - Tél: 05 22 61 11 33



زاوية شارع ابن تاشفين وابن العدراء المراكشي . إقامة فاطمة الزهراء II الطابق الثالث رقم 5

(فوق أسيا و BMCE) - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 61 11 33

Angle Bd Ibn Tachfine et Ibn El Adraa El Mourakouchi, Résidence Fatima Zahra II 3ème étage N° 5
Casablanca (au dessus de Acima et BMCE) - Tél : 05 22 61 11 33

مركز الفحص بالأشعة الحزام الكبير
Centre de Radiologie La Grande Ceinture

Casablanca, le 05/06/2020

Facture N° 2323/2020

Nom patient : **ZARGUI HAMMADI**

Examen(s) réalisé(s) :
ECHODOPPLER DES VAISSEAUX DU COU:

Montant : **huit cents (800 DH)**

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
HUIT CENTS dhs

CENTRE DE RADIOLOGIE LA GRANDE CEINTURE
Lot 341, Lotissement Al Mouahidine
Bd La Grande Ceinture Prof. El-Andoussou
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél : 0611.97.42.85 / 0615.58.97.77



مركز الفحص بالأشعة الحزام الكبير CENTRE DE RADIOLOGIE LA GRANDE CEINTURE

Radiologie Numérique - Opacifications - Echographie - Echodoppler - Mammographie
Panoramique Dentaire - Ostéodensitométrie - Scanner - IRM

Dr. ZNIBER Kamar

Casablanca, le 05/06/2020

Cm/s

Patient : **ZARGUI HAMMADI** Age: 73ans.

Médecin Traitant : **DR SIHAM BELAICHE**

ECHODOPPLER DES VAISSEAUX DU COU

Résultats

- Epaissement intimal diffus des parois des carotides primitives et internes, avec des plaques calcifiées bulbaires, régulières et stables, non sténosantes.
- L'analyse spectrale des carotides primitives, carotides internes, carotides externes, des artères vertébrales objective un flux normalement modulé avec des vitesses maximales normales non accélérées et relativement symétriques.
- Les index de résistance sont dans les limites de la normale.
- Sur le plan veineux, les veines jugulaires sont perméables et dépressibles avec un flux normalement modulé par la respiration.

En conclusion :

- Surcharge athéromateuse diffuse des artères carotides, sans sténose hémodynamiquement significative.

Merci de votre confiance.

Signé : **DR ZNIBER**

Lotissement Al Mouahidine
Bd La Grande Ceinture Prof. Mouahidine
Hay Mohammadi - Casablanca
Tél: 0611 97 42 89 / 0612 52 07

JUIN 05 2020 12:14
ID= AGE=

AC, DERIVAT

ZARGUI. HADJAKI



NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml
Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIS.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'appoint de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des allergies.

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin de la posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). À prendre en tenant compte de leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

À titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou liés au vieillissement) et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et soir,
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement à 1200 mg par jour,
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À VOTRE MÉDECIN.**

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Délivrer une dose de 200 mg à 1000 mg par jour.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les autres solutions médicamenteuses.

Diluer la solution dans un peu d'eau.

5610

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml
Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPQUES.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'appoint de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des effets indésirables.

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin de la posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). À prendre avec attention en contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

À titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou liés au vieillissement) et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et soir,
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement à 1200 mg par jour,
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À VOTRE MÉDECIN.**

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Délivrer une dose de 200 mg à 1000 mg par jour.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les autres solutions médicamenteuses.

Diluer la solution dans un peu d'eau.

5610

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml
Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIS.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'appoint de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des effets indésirables.

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin et surveiller la posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). À prendre avec attention en contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

À titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou liés au vieillissement) et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et soir,
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement jusqu'à 1200 mg par jour,
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À VOTRE MÉDECIN.**

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Délivrer une dose de 200 mg à 1000 mg par jour.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les autres solutions médicamenteuses.

Diluer la solution dans un peu d'eau.

5610

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml
Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIQUES.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'appoint de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer des effets indésirables.

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin et surveiller la posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). À prendre avec attention en contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

À titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou liés au vieillissement) et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et 1 dose de 800 mg soir.
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement.
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À VOTRE MÉDECIN.**

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Délivrer une dose de 200 mg à 1000 mg par la mesurette.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les autres solutions médicamenteuses.

Diluer la solution dans un peu d'eau.

5610

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml

Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIQUES.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'appoint de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). A prendre en tenant compte de leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

A titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et soir,
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement à 1000 mg matin et soir,
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA POSOLOGIE RECOMMANDEE PAR VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Ne pas dépasser une dose de 200 mg à 1000 mg de principe actif.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les cuillerées d'autres solutions médicamenteuses.

Diffuser la solution dans un peu d'eau.

Fréquence d'administration

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Durée du traitement

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Si vous avez pris plus de NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre NOOTROPYL 20 %, solution buvable: Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre pharmacien.

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml

Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIQUES.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'appoint de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). A prendre en tenant compte de leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

A titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et soir,
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement à 1000 mg matin et soir,
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA POSOLOGIE RECOMMANDEE PAR VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Ne pas dépasser une dose de 200 mg à 1000 mg de principe actif.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les cuillerées d'autres solutions médicamenteuses.

Diffuser la solution dans un peu d'eau.

Fréquence d'administration

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Durée du traitement

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Si vous avez pris plus de NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre NOOTROPYL 20 %, solution buvable: Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre pharmacien.

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml

Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIQUES.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'apport de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). A prendre en tenant compte de leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

A titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et 1 dose de 800 mg soir.
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement.
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA POSOLOGIE RECOMMANDEE PAR VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Ne pas dépasser une dose de 200 mg à 1000 mg de principe actif.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les ampoules d'autres solutions médicamenteuses.

Diffuser la solution dans un peu d'eau.

Fréquence d'administration

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Durée du traitement

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Si vous avez pris plus de NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre NOOTROPYL 20 %, solution buvable: Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre pharmacien.

NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Flacon de 125 ml

Piracétam

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

DANS CETTE NOTICE

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE NOOTROPYL 20 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES PSYCHOSTIMULANTS ET NOOTROPIQUES.

Ce médicament est indiqué dans les situations suivantes:

Chez l'adulte:

- le traitement d'apport de troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences),
- traitement symptomatique des vertiges,
- les myoclonies d'origine corticale (trouble caractérisé par des secousses musculaires anormales).

Chez l'enfant de plus de 30 kg (soit à partir d'environ 9 ans):

- la dyslexie.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable ?

Ne prenez jamais NOOTROPYL 20 %, solution buvable dans les situations suivantes:

- allergie connue au piracétam, à un dérivé de la pyrrolidone ou parahydroxybenzoate de méthyle et parahydroxybenzoate de propyle ou à l'un des composants du médicament,
- anomalie grave de la fonction des reins,
- hémorragie cérébrale,
- chorée de Huntington (aggravation des symptômes).

Faites attention avec NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Mises en garde spéciales

Prévenir votre médecin:

- si vous devez subir une intervention chirurgicale,
- si vous présentez des troubles de la coagulation.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et peut provoquer

Précautions d'emploi

- En cas d'insuffisance rénale, prévenir votre médecin posologie.

- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 125 mg de solution buvable (= 1 dose de 1000 mg). A prendre en tenant compte de leur apport alimentaire en sodium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation des machines

Les vertiges, pour lesquels ce médicament peut être dangereux la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

3. COMMENT UTILISER NOOTROPYL 20 %, solution buvable

Posologie :

La posologie est fixée par votre médecin.

A titre indicatif, la posologie habituelle est:

- dans les troubles mineurs chroniques (cognitifs ou neurosensoriels) liés au vieillissement et dans les vertiges: 1 dose de 800 mg matin et soir,
 - dans les myoclonies, la dose est augmentée progressivement,
 - dans la dyslexie: la dose varie en fonction du poids de l'enfant.
- DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A LA POSOLOGIE RECOMMANDEE PAR VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Utiliser la mesurette-graduée pour mesurer la dose prescrite. Ne pas dépasser une dose de 200 mg à 1000 mg de principe actif.

Vous ne devez pas l'utiliser pour compter les gouttes ou les cuillerées d'autres solutions médicamenteuses.

Diffuser la solution dans un peu d'eau.

Fréquence d'administration

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Durée du traitement

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance.

Si vous avez pris plus de NOOTROPYL 20 %, solution buvable:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre NOOTROPYL 20 %, solution buvable:
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre pharmacien.