

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M20- 0007805

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00953 Société : R.A.H. 57156
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : LANGUER ZAHRA
Date de naissance : 01/01/1949
Adresse : Rue 22 N 21 Hay EL HANA Casablanca
Tél. 26.61.490824 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. Mohamed AJOUBY - NEPHROLOGUE
3, Rue Abou Baker Ibnou Zahr, Etage 1
Casablanca - R.C: 451643
Tél. 3309 ICE: 0023757700000019
Date de consultation : 25/12/2021
Nom et prénom du malade : LANGUER ZAHRA Age: 72
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Anémie + Hémodialyse
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 25/12/2020

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/12	C	C	gratuit	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	25/12/2008	8784,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	H															
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B	B															
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS															
		DATE DU DEVIS															

Dr. Mohamed AJOUBY

NEPHROLOGUE

Spécialiste des Maladies du Rein

& Voies Urinaires

HEMODIALYSE

Expert Assermenté auprès des Tribunaux

الدكتور محمد عجوبي

إختصاصي في أمراض الكلى

الكلية الإصطناعية

خبير محلف لدى المحاكم

Casablanca, le : 25.12.2020

MANAGAR Zahra

244.00 x 36 = 8784.00

Fermed: Leap + 25

traitement de 03 m

T = 8784.00

**CENTRE HEMODIALYSE
AT HOPITAUX SARI AU
Dr. Mohamed AJOUBY - NEPHROLOGUE
3, Rue Abou Baker ibn al Zuhair Etage 1
Casablanca - RC 451643
T.P. 36370220 - 4CP. 002275770000019**

**PHARMACIE HAY EL MASSARA
Dr. MOUZ KADIM
50-52 Lot 29 Hay El Massara Rue 2
Hay Hassani - Casablanca
Tél. 05 22 90 35 22**

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g

100mg/5ml
complexe fer-saccharose
ampoules de 5ml
6 118001 360031
P.P.V. : 244,00DH

UTILISATEUR

5 ml

Solution injectable/Solution à diluer pour perfusion

Complexe fer-saccharose

Lisez attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toutes autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, il pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. C'est quoi FerMed® et dans quels cas il est utilisé
 2. Avant d'utiliser FerMed®
 3. Comment prendre FerMed®
 4. Les effets indésirables possibles
 5. Comment conserver FerMed®
 6. Informations supplémentaires
- Informations pour les professionnels de santé

1. C'EST QUOI FerMed® ET DANS QUELS CAS IL EST UTILISÉ

FerMed® est une préparation antianémique pour voie intraveineuse utilisée dans le **traitement de la carence en fer** chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus.

FerMed® est une solution pour injection intraveineuse lente ou pour la préparation d'une solution pour perfusion.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments, y compris ceux obtenus sans ordonnance, car FerMed® peut affecter leur métabolisme.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

FerMed® ne doit pas être administré lors des trois premiers mois de grossesse. Au-delà de 3 mois de grossesse, FerMed® ne sera pris que si les produits à base de fer par voie orale ne sont pas efficaces ou tolérés et si votre anémie est considérée comme suffisamment sévère pour constituer un risque pour vous et votre enfant.

Allaitement

Les données sur l'utilisation de FerMed® pendant l'allaitement sont limitées. Compte tenu des renseignements disponibles, il semble peu probable que FerMed® représente un risque pour l'enfant allaité.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En général, FerMed® n'a aucun effet sur la conduite et l'utilisation de machines. La prise de ce médicament peut toutefois entraîner des vertiges, des étourdissements ou une désorientation. Vous ne devrez alors ni conduire ni utiliser de machines jusqu'à disparition des symptômes.

Informations importantes concernant certains composants de FerMed®:

Ce médicament contient du sucre (saccharose). Veuillez avertir votre médecin en cas d'intolérance à certains types de sucre. Dans de rares cas, le saccharose peut provoquer de graves réactions anaphylactiques. (voir aussi "2. Avant d'utiliser FerMed®" sous "Faites attention avec FerMed®").

• Une ampoule de 5 ml de FerMed® contient 1,5 à 2 g