

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-610230

66084

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0003072 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : retraite
 Nom & Prénom : EL KHADIR Larbi
 Date de naissance : 01-01-1954
 Adresse : 20 rue el Rajeb Bourgogne CASAB
 Tél : 06 61 06 60 46 Total des frais engagés 885,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Professeur Hassan EL GHOMARI
 Spécialiste en Endocrinologie
 Diabétologie et Nutrition
 Abdelmoumen Center Angle Boulevard Andal
 et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tel : 05 22 20 45 45
 Cachet du médecin :
 Date de consultation :
 Nom et prénom du malade : CHITJI
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : DIABETE + HYPERTENSION
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASAB Le : 04/02/2021
 Signature de l'adhérent(e) :

Docteur Hassan EL GHOMARI

Professeur à la F.M.P.C

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie

Nutrition & Croissance

Ancien Attaché à l'hôpital Saint Luc
de Montréal - Canada



الدكتور حسن الغماري

أستاذ جامعي بكلية الطب والصيدلة

أخصائي أمراض الغدد - داء السكري

التغذية و النمو

طبيب سابقا بمستشفى سان لوك

مونترéal - كندا

Casablanca, le : 04.02.21 : الدار البيضاء في

Mme CHAJII MALIKA

20.80 x 5 = 104.00

GLUCOPHAGE 500 MG

1 - 0 - 1 pendant 4 mois



LEVOTHYROX 50

1 cp / jour le matin. 30 min avant le repas pendant 4 mois



CARBOSORB

2 cp fin repas midi soir pendant 1 Mois



BAYCUTENE

1 app soir pendant 21 jours



DERMOFIX CREME

1 app /soir



Pharmacie AL FARABI
LAHABRI Amina
45, Bd de Bourgogne - Casablanca
Tél: 05 22 27 35 82
TP: 35601098 - ICE: 001654187000019
INPE 092004639

Professeur Hassan EL GHOMARI
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Abdelmoumen Center Angle Boulevard Anoual
et Abdelmoumen N° 313 - Casa - Tél: 05 22 86 14 14

مركز عبد المومن، زاوية شارع أنوال و شارع عبد المومن، الطابق الثالث - رقم 313 - الدار البيضاء
Abdelmoumen Center, Angle Bd. Anoual et Bd. Abdelmoumen, 3^{ème} étage - N° 313 - Casablanca

الهاتف : 05 22 86 37 44 / 05 22 86 14 14 - البريد الإلكتروني : hassanelghomari@yahoo.fr

N° INP : 091028506 - ICE : 001663750000032



Baycutène® N

Formes et présentations

Baycutène® N crème : tube de 15 g de crème

Composition

Baycutène® N, crème pour application locale
100 g de crème contient 1 g de clotrimazole et 0,0443 g d'acétate de dexaméthasone (soit 0,04 g de dexaméthasone).

Excipients : Alcool benzylique, Alcool cétostéarylique, triglycérides à chaîne moyenne, Hostaphat KW et l'eau purifiée.

Classe Pharmaco-thérapeutique

Association d'un corticostéroïde et d'un antifongique imidazolé à large spectre d'action.

Anti-eczémateux.

Indications

Baycutène® N crème est préconisé dans les infections fongiques cutanées à composante anti-inflammatoire importante.

Contre-indications

Le traitement par Baycutène® N crème est contre-indiqué en cas de :

- Hypersensibilité au clotrimazole,
- Hypersensibilité à l'alcool cétostéarylique ou à l'un des autres composants,
- Affections cutanées spécifiques (syphilis, tuberculose),
- Infections cutanées d'origine virale (herpes, rosacée),
- Varicelle
- Réaction à la vaccination antivariolique,
- Dermite péri-buccale,
- Pansement occlusif en cas d'eczéma atopique,
- Durant le premier trimestre de la grossesse.

Pendant le reste de la grossesse ainsi que chez les nourrissons, Baycutène® N ne doit pas être appliqué sur des surfaces cutanées étendues ou pendant une longue durée. Il ne doit pas non plus être appliqué sur le sein allaitant.



كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف
كلوريدات المنفوخين

زيد من المعلومات من الطبيب
 حتى ولو كانت لديه نفس
 مرغوب لم يرد ذكره في هذه



1 - ما هو كليكوجاف، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
 الصنف الصيدلي العلاجي: A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:
 يحتوي كليكوجاف على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بيقوانين.
 الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدة في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مرضياً بالسكري، لا ينتج البنكرياس ليك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
 إذا كنت تأخذ دواء من وزن زائد، يسهم ذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل المساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.
ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السكري) ذلك (السكري) غير المتوقف على الإنسولين) عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدبير البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. ويستعمل كليكوجاف خاص لي مرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يقسم كليكوجاف للمرضى الباقون تناول كليكوجاف وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قسمة اليان) أو إنسوليناً.
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف، قرص مغلف
موانع الاستعمال:
 لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
 إذا كنت تعاني من الأوعية (المسماة المفرطة) تجاه المنفوخين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المنفوخة في الفقرة 6.
 إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
 إذا كنت تعاني من داء السكري في وظائف الكلى.
 إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم) بصورة صارخة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمى، اضطراب في النظر (فقدان حواس) "اسطه" أو حمض كيتوني. الحمض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبب سكري في الأوعية التي تشمل الدم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة، غيبوبة.
 إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل كلية من شأنها أن تعرضك لخطر العدوى البكتي (انظر "تحذيرات وإحتياطات").
 إذا كنت تعاني من التهاب داء من التهاب المثانة أو القصباء، أو التهاب الكلىتين. قد تؤدي الإصابة بالعدوى إلى مشاكل في الكلىتين من شأنها تعريض لخطر الحمض البكتي (انظر "تنبيهات") من كليكوجاف (أنداء).
 إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفصور البكتي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحمض البكتي (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
 إذا أنشيت عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
 يجب استشارة الطبيب في حالة:
 إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص بالتصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مائية تحتوي على اليود في دورتك الدموية.
 إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
 يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.
 يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحمض البكتي
 قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحمض البكتي، خاصة إذا كانت كلياتك لا تعملان بصورة صحيحة. كما أن خطر الحمض البكتي يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. أوستاكتك المشروبات الكحولية والخفاف، انظر المعلومات الإضافية أنداء (وشمائل) في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).
 إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول جلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بأحماض (فقدان بعض لسوائل الجسم) مثل القيء، الشدي، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو إذا سؤل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول جلوكوجاف على الفور اتصل بالطبيب أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحمض البكتي لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحمض البكتي:
 - اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
 - تقلصات العضلات
 - الإسهال العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
 - صعوبة في التنفس
 - انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
 - الحمض البكتي حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
 إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول جلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر الطبيب متى توقف وتتساقط عائلت باستخدام جلوكوجاف.
 يجب إيقاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم، مثل (المساقط) المضاعفة المعدل للسكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الأحاسيس بالضعف.

أثناء فترة العلاج بكليكوجاف، سيقوم طبيبك بفحص وظيفة كلية مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً / أو وتعتمد وظائف الكلى. الانقطاع لا ينطبق.
معلومات عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.
تأثيرات على استعمال أدوية أخرى
 إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو بالسكاير، عليك إبطاء تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول جلوكوجاف.
 عليك اطلاع الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضبط طبيبك الجرعة.
 من المهم معرفة خاصة الأعلام من الأدوية التالية:
 - الأدوية التي تزيد من كمية البول (إمدادات البول).
 - الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبطات كوكسي-2، إيبوبروفين، ديفلامين، سيبروكسيبرين).
 - بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأدينوسين (A)).
 - مضادات المستقبل بيتا-2 (الأدوية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويدات (للعلاج لالتهاب مختلف الاعتلالات خاصة التهابات الحادة للبلد أو الربو).
 - الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت تأخذ وظائف الكلى منخفضة (مثل فيرأراميل، ديفلامين، سيبروكسيبرين، ديلوتريفير، رانولازين، تريفوتيريم، فانداتيناب، إيزوفلورانتول، كزيتينين، أو ألاباربيز)
 - أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

جلوكوجاف مع الكحول
 تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع أخذ جلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحمض البكتي (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).
الحمل والإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف
كلوريدات المنفوخين

زيد من المعلومات من الطبيب
 حتى ولو كانت لديه نفس
 مرغوب لم يرد ذكره في هذه



1 - ما هو كليكوجاف، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
 الصنف الصيدلي العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال:
 يحتوي كليكوجاف على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الادوية المسماة بيقوانين.
 الإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الجلوكوز (السكر) المتواجدة في الدم. يستخدم الجسم الجلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مرضياً باستعمال الإنسولين لديك الجلوكوز بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل طبيعي. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الجلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
 إذا كنت تأخذ دواء من وزن زائد، يسهم ذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل المساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.
ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
 يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري" غير المتوقف على الإنسولين) عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدبير البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الجلوكوز في الدم. ويستعمل كليكوجاف خاص لنوع المرضي الذين يعانون من زيادة الوزن. يقسم المرضي الباقون لتناول كليكوجاف وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قسمة اليانثرا أو إنسولين).
 يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الإنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف، قرص مغلف
موانع الاستعمال:
 لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
 إذا كنت تعاني من الأوعية (المسماة المفرطة) تجاه المنفوخين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المنفوخة في الفقرة 6.
 إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
 إذا كنت تعاني من تشاوش في وظائف الكلى.
 إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم) بصورة صارخة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمى، اضطراب في النظر (فقدان حواس "ليتي" أو اسطه) أو حمض كيتوني. الحمض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبب سكري في الأوعية التي تشمل الدم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة، غيبوبة.
 إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا بقيت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل كلية من شأنها أن تعرضك لخطر التعرض البطني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").
 إذا كنت تعاني من التهاب داء، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكلىتين. قد تؤدي الالتهابات إلى إحالة إلى مشاكل في الكلىتين من شأنها تعريض لخطر الحمض البطني (انظر "تنبيه" من كليكوجاف أدناه).
 إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفصور البطني الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحمض البطني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
 إذا أنشيت عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
 يجب استشارة الطبيب في حالة:
 إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص بالتصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مائية تحتوي على اليود في دورتك الدموية.
 إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
 يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.
 يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحمض البطني
 قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحمض البطني، خاصة إذا كانت كنتاً لا تعلن بصورة صحيحة. كما أن خطر الحمض البطني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية والخفاف. انظر المعلومات الإضافية أدناه (وشمل كل والكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).
 إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول جلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بأحماض (فقدان بعض لسوائل الجسم) مثل القيء، الشدي، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو إذا سؤل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول جلوكوجاف على الفور اتصل بالطبيب أو بآخر مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحمض البطني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحمض البطني:
 - اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
 - تقلصات العضلات
 - الإسهال العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
 - صعوبة في التنفس
 - انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
 - الحمض البطني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
 إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول جلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر الطبيب متى توقف وتتساقط عائلت باستخدام جلوكوجاف.

يجب إيقاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم (مثل المضاعفات الخافضة لمعدل السكر في الدم، الإنسولين، المغليتينيدات، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فاشرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الأحاسيس بالضعف.
 أثناء فترة العلاج بكليكوجاف، سيقيم طبيبك بفحص وظيفة كلية مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً / أو وتعورت وظائف الكلى.
 الانقطاع لا ينطبق.

عوامل عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.
تأثيرات على استعمال أدوية أخرى
 إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو بالسكاير، يجب إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول جلوكوجاف.
 عليك اطلاع الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضيف طبيبك الجرعة.
 من المهم معرفة خاصة الأعلام من الأدوية التالية:
 - الأدوية التي تزيد من كمية البول (إمدادات البول).
 - الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبطات كوكسي-2، إيبوبروفين، ديفلامين، سيكلوكسيكس).
 - بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأدينوسين (A)).
 - مضادات المستقبل بيتا-2 (الأدوية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويدات (للعلاج لالتهابات مختلفة (الغلات خاصة التهابات الحادة للربو).
 - الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت تأخذ وظائف الكلى منخفضة (مثل فيرابراميل، ديفلامين، سيكلوكسيكس، ديلوتريفير، رانولازين، تريفوتيريم، فانداتيناب، إيزوفلوكاتازول، كزيتينين، أو ألاباربي)
 - أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

جلوكوجاف مع الكحول
 تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع أخذ جلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحمض البطني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).
الحمل والإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف
كلوريدات المنفورمين

زيد من المعلومات من الطبيب
حتى ولو كانت لديه نفس
مغروب لم يرد ذكره في هذه



1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال :
يحتوي كليكوجاف على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الادوية المسماة بيقوانين.
الانسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) المتواجدة في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مرضياً باستعمال البنكرياس لديك الانسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الانسولين الذي ينتجه بشكل طبيعي. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت تأخذ دواء من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.
ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري" غير المتوقف على الانسولين) عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدبير البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستعمل كليكوجاف خاص لنوع المرضي الذين يعانون من زيادة الوزن. يقسم المرضي الباقون لتناول كليكوجاف وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قسمة البنية أو إنسولين).
يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الانسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف
موانع الاستعمال :

لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
إذا كنت تعاني من الأوعية (المسماة المفرطة) تجاه المنفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
إذا كنت تعاني من تدهور في وظائف الكلى.
إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارخة، غثاين، قيح، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمضيات (انظر فقرة حمض ليني" اسئلة" أو حمض كيتوني. الحمض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبب سكري في الأوعية التي تشمل الدم في الحمة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة، غيبوبة.
إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل كلية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض البني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").
إذا كنت تعاني من التهاب داء، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكلىتين. قد تؤدي الاصابات بالحادة إلى مشاكل في الكلىتين من شأنها تعريض لخطر الحماض البني (انظر "تنبيه" من كليكوجاف أدناه).
إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفصور الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض البني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
إذا أنظمت عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
يجب استشارة الطبيب في حالة:
إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص بالتصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مائية تحتوي على اليود في دورتك الدموية.
إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.
يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت كلياتك لا تعملان بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية والخفاف. انظر المعلومات الإضافية أدناه (وشمائل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).

إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بأحماض (قداد من لسائل الجسم) مثل القي، الشدي، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو فقدان سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف على الفور اتصل بالطبيب أو بآخر مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
- تقلصات العضلات
- الإنسداد العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض البني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية.
- سوف يقرر الطبيب متى توقف وتتساقط عائلتك باستخدام غلوكوجاف.
- يجب إيقاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم، مثل المضاعفات (التي تسمى الحماض البني) في الدم، الانسولين، المغليتينيدات، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فإن شرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الأحاسيس بالضعف.
- أثناء فترة العلاج بكليكوجاف، سيقيم طبيبك بفحص وظيفة كلية مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً / أو وتدهورت وظائف الكلى.

الانقطاع لا ينطبق.
عوامل عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.
تناول أو استعمال أدوية أخرى
إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو بالسكاير، يجب إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.
عليك اطلاع الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أو بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضيف طبيبك الأدوية.
من المهم معرفة خاصة الأعلام عن زيادة التآلية من الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبطات كوكسي-2، إيبوبروفين، ديفلامين، سيبروكسيبرين).
بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأدينوسين (A)).
مضادات المستقبل بيتا-2 (الأدوية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويدات (للعلاج لالتهاب مختلف الاعلالات خاصة التهابات الحادة للبلد أو الربو).
الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت تأخذ وظائف الكلى منخفضة (مثل فيرأراميل، ديفلامين، سيبروكسيبرين، ديلوتريفير، رانولازين، تريوتيرين، فانتانيد، إيزوفلورانتول، كزيتوبين، أو ألاباربي).
أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع أخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).

الحمل والإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف
كلوريدات المنفورمين

زيد من المعلومات من الطبيب
حتى ولو كانت لديه نفس
مغروب لم يرد ذكره في هذه



1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال :
يحتوي كليكوجاف على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الادوية المسماة بيقوانين.
الانسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) المتواجدة في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مرضياً باستعمال البنكرياس لديك الانسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الانسولين الذي ينتجه بشكل طبيعي. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت تأخذ دواء من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.
ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري" غير المتوقف على الانسولين) عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدبير البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستعمل كليكوجاف خاص لنوع المرضي الذين يعانون من زيادة الوزن. يقسم المرضي الباقون لتناول كليكوجاف وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قسمة البنية أو إنسولين).
يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الانسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف
موانع الاستعمال :

لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
إذا كنت تعاني من الأوعية (المسماة المفرطة) تجاه المنفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.
إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
إذا كنت تعاني من تدهور في وظائف الكلى.
إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل السكر في الدم) بصورة صارخة، غثاين، قيح، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمضيات (انظر فقرة حمض ليني" اسئلة" أو حمض كيتوني. الحمض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبب سكري في الأوعية التي تشمل الدم في الحمة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة، غيبوبة.
إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل كلية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض البني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").
إذا كنت تعاني من التهاب داء، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكلىتين. قد تؤدي الاصابات بالحادة إلى مشاكل في الكلىتين من شأنها تعريض لخطر الحماض البني (انظر "تنبيه" من كليكوجاف أدناه).
إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفصور الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض البني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
إذا أنظمت عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
يجب استشارة الطبيب في حالة:
إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص بالتصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مائية تحتوي على اليود في دورتك الدموية.
إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بديل خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.
يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحماض البني

قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت كلياتك لا تعملان بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو انقطاع طويل عن الطعام. أوستاوتك المشروبات الكحولية والخفاف، انظر المعلومات الإضافية أدناه (وشمائل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).
إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بأحماض (قداد من لسائل الجسم) مثل القي، الشدي، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، أو فقدان سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف على الفور اتصل بالطبيب أو بآخر مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:

- اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
- تقلصات العضلات
- الإنسداد العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
- صعوبة في التنفس
- انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
- الحماض البني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
- إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر الطبيب متى توقف وتتساقط عائلت باستخدام غلوكوجاف.
- يجب إيقاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم، مثل المضادبات، فاحرص من انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فاشرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الأحاسيس بالضعف.
- أثناء فترة العلاج بكليكوجاف، سيقيم طبيبك بفحص وظيفة كلية مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً / أو وتدهورت وظائف الكلى.

الانقطاع لا ينطبق.
معلومات عن سوافاتها لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.
تأثيرات على استعمال أدوية أخرى
إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو بالسكاير، يجب إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.
عليك اطلاع الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضيف طبيبك الأدوية.
من المهم معرفة خاصة الأعلام عن زيادة التآلية من الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبطات كوكسي-2، إيبوبروفين، ديفلامين، سيكلوكسيكس).
بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأدينوسين 2A)
مضادات المستقبل بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويدات (للعلاج لالتهابات مختلفة)، الغلات خاصة التهابات الحادة للبلد أو (الربو).
الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت تأخذ وظائف الكلى منخفضة (مثل فيرأراميل، ديفلامين، سيكلوكسيكس، ديلوتريفير، رانولازين، تريوتيريم، فانداتيناب، إيزوفلوكاتازول، كزيتروين، أو ألاباربي)
أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الكحول

تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع أخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).
الحمل والإرضاع

كليكوجاف 500 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 850 مغ، قرص مغلف
كليكوجاف 1000 مغ، قرص مغلف
كلوريدات المنفوخين

زيد من المعلومات من الطبيب
حتى ولو كانت لديه نفس
مزغوب لم يرد ذكره في هذه



1 - ما هو كليكوجاف ، قرص مغلف وما هي حالات استعماله؟
A10BA02 code ATC

دواعي الاستعمال :
يحتوي كليكوجاف على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الادوية المسماة بيقوانين.
الانسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) المتواجدين في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مرضى بالسكري لا ينتج البنكرياس ليك الأنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادراً على استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد كليكوجاف على تخفيض معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي.
إذا كنت تأخذ دواء من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوجاف على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري. يشترك كليكوجاف بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن.
ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوجاف؟
يستعمل كليكوجاف لعلاج السكري من النوع 2 (السكري ذلك "السكري" غير المتوقف على الأنسولين) عندما لا يسمح النظام الغذائي والتدبير البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستعمل كليكوجاف خاص لي مرضى الذين يعانون من زيادة الوزن. يمتص كليكوجاف المرضي الباقون تناول كليكوجاف وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قسمة البنية أو إنسولين).
يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والمراهقون تناول كليكوجاف وحده أو مع الأنسولين.

2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوجاف ، قرص مغلف
موانع الاستعمال :
لا تتناول أبدا كليكوجاف في الحالات التالية:
إذا كنت تعاني من الأوعية (المسماة المفرطة) تجاه المنفوخين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المنفوخة في الفقرة 6.
إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
إذا كنت تعاني من داء السكري في وظائف الكلى.
إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع معدل الجلوكوز في الدم) بصورة صارخة، غثيان، قيء، إسهال، فقدان سريع للوزن، حمى، اضطراب في النظر (فقدان حواس "ليتي" أو "اسلطة" أو حمض كيتوني، الحماض الكيتوني إصابة تكمن في تراكم مواد في الدم تسمى "أحماض كيتونية" والتي من شأنه التسبب بسبب سكري في الأوعية) الأمراض التي تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة، غثاء في معدته.
إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (جفاف)، مثلاً على إثر إسهال مستمر أو جفاف، أو إذا تقيأت عدة مرات على التوالي. قد يؤدي الجفاف إلى مشاكل كلية من شأنها أن تعرضك لخطر الحماض البني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").
إذا كنت تعاني من التهاب داء من التهاب المثانة أو القصباء، أو التهاب الكلىتين. قد تؤدي الاصابات الجادة إلى مشاكل في الكلىتين من شأنها تعريض لخطر الحماض البني (انظر "تنبيه" من كليكوجاف أدناه).
إذا كنت تتناول علاجاً ضد الفصور الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل جادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض البني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

إذا كنت تستهلك بكثرة المشروبات الكحولية.
إذا أنظمت عليك إحدى هذه الحالات، عليك مراجعة الطبيب قبل البدء بتناول هذا الدواء.
يجب استشارة الطبيب في حالة :
إذا كنت مقبلاً على الخضوع لفحص بالتصوير الشعاعي أو السكاير والذي قد يقتضي حقن مادة مائية تحتوي على اليود في دورتك الدموية.
إذا كنت مقبلاً على الخضوع لعملية جراحية كبيرة.
يجب التوقف عن تناول كليكوجاف بعض الوقت قبل وبعد هذه الفحوصات أو العمليات الجراحية. سيقدر الطبيب إذا كنت بحاجة أم لا إلى علاج بدلي خلال هذه الفترة. من المهم أن تتبع بدقة تعليمات الطبيب.
يجب الانتباه مع كليكوجاف

خطر الحماض البني
قد يسبب كليكوجاف مضاعفة نادرة لكن خطيرة تسمى الحماض البني، خاصة إذا كانت كلىكأت لا تعملان بصورة صحيحة. كما أن خطر الحماض البني يزداد في حال وجود سكري غير متحكم به أو التهابات شديدة أو ارتفاع طويل عن الطعام أو استهلاك المشروبات الكحولية والخفاف. انظر المعلومات الإضافية أدناه (وشمائل في الكبد وغيرها من الحالات الطبية حيث يقل الأكسجين (على سبيل المثال، أمراض القلب الحادة).
إذا كان أي من هذه الحالات تطبق عليك، اتصل بطبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف لفترة قصيرة إذا كانت تعاني من مرض من المحتمل أن يكون مرتبطاً بأحماض (فقدان بعض لسوائل الجسم) مثل القيء، الشدي، والإسهال، والحمى، والتعرض للحرارة، ارتفاع سائل أقل من المعتاد. تحدث مع طبيبك للحصول على مزيد من التعليمات. توقف عن تناول غلوكوجاف على الفور اتصل بالطبيب أو باقرص مستشفى إذا كنت تعاني من أعراض الحماض البني لأنه قد يؤدي إلى غيبوبة.

وتشمل أعراض الحماض البني:
القيء.
اضطراب في المعدة (الآم في البطن)
تقلصات العضلات
الإنسداد العام بعدم الراحة مرتبطة بتعب كبير
صعوبة في التنفس
انخفاض درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب
الحماض البني حالة طوارئ طبية يجب معالجتها في المستشفى
إذا اضطرت إلى إجراء عملية جراحية، توقف عن تناول غلوكوجاف في وقت و بعد العملية. سوف يقرر الطبيب متى توقف وتتساقط عائلت باستخدام غلوكوجاف.
يجب إيقاف وحده لا يسبب انخفاض معدل السكر في الدم. لكن، إذا تناولت كليكوجاف في نفس الوقت مع أدوية أخرى لعلاج السكري والتي قد تؤدي إلى انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الأدوية المسماة بالحقن لخفض معدل السكر في الدم، الأنسولين، المغليتينيدات، هناك خطر انخفاض معدل السكر في الدم. إذا أحسست بأعراض انخفاض معدل السكر في الدم، مثل الشعور بالوهن، الدوخة، زيادة نصب العرق، تسارع نظم القلب، اضطرابات بصرية، صعوبة التركيز الذهني، فاشرب أو أكل شيء ما يحتوي على سكر قد يساعدك على تخفيف وإزالة الأحاسيس بالضعف.

أثناء فترة العلاج بكليكوجاف، سيقيم طبيبك بفحص وظيفة الكلى مرة واحدة على الأقل سنوياً أو أكثر بشكل متكرر إذا كنت مسناً / أو وتعتمد وظائف الكلى.
الانقطاع لا ينطبق.
عوامل عن سواغات لها تأثير ملحوظ لا ينطبق.
تأثيرات على استعمال أدوية أخرى
إذا كنت مقبلاً على حقن وعاني من مادة مائية تحتوي على اليود، مثلاً لفحص الأشعة أو بالسكاير، يجب إيقاف تناول كليكوجاف قبل وبعد الحقن. سوف يقرر طبيبك متى يجب التوقف واستئناف تناول غلوكوجاف.
عليك اطلاع الطبيب إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من الممكن أن تتناول أي دواء. عندئذ قد تحتاج إلى إجراء اختبارات جلوكوز أكثر بشكل متكرر أو اختبارات وظائف الكلى وقد يكون يجب أن يضيف طبيبك الأدوية.
من المهم معرفة خاصة الأعلام عن الجفاف التالية
من الأدوية التي تزيد من كمية البول (مدرات البول).
الأدوية المستخدمة لعلاج الألم والالتهاب مثل (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مثبطات كوكسي-2، إيبوبروفين، ديفلامين، سيكلوكسيكس).
بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مثبطات ECA ومضادات مستقبلات الأدينوسين 2A)
مضادات المستقبل بيتا-2 الأدرينالية مثل سالبوتامول أو تريوبتالين (التي تستخدم لعلاج الربو)، كورتيكوستيرويدات لعلاج التهابات مختلفة (الغلطات خاصة التهابات الحادة للبلد أو الربو).
الأدوية التي قد تؤثر على كمية الجلوكوز في الدم، وخاصة إذا كنت تأخذ وظائف الكلى منخفضة (مثل فيرأراميل، ديفلامين، سيكلوكسيكس، ديلوتريفير، رانولازين، تريوتيريم، فانداتيناب، إيزوفلوكاتازول، كزيتروين، وأولاباري)
أدوية أخرى مستعملة لعلاج السكري.

غلوكوجاف مع الكحول
تجنب الإفراط في استهلاك الكحول مع أخذ غلوكوجاف لأن هذا قد يزيد من خطر الحماض البني (انظر التحذيرات وقسم الإحتياطات).
الحمل والإرضاع

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

MYCODERME® 1 % Crème
Tube de 40 g
Bata d'éconazole

LOT: 08020052

Intégralité de cette notice avant de

ins, si vous avez besoin de la relire, demandez
lecin ou votre pharmacien.

Topique

• C
• S
plu
• C
vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez
jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques,
cela pourrait lui être nocif.
• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez
un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à
votre médecin ou votre pharmacien. Voir la rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **MYCODERME® 1 % Crème** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **MYCODERME® 1 % Crème** ?
3. Comment prendre **MYCODERME® 1 % Crème** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **MYCODERME® 1 % Crème** ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE MYCODERME® 1 % Crème ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

MYCODERME® 1 % Crème contient un antifongique (actif contre les champignons) de la famille des imidazolés.

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines mycoses (affections cutanées dues à des champignons).

• Candidoses :

- Traitement de mycose des plis non macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, interdigital.
- Traitement d'appoint des mycoses des ongles : onychis, périonyxis. Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif.

• Dermatophytes :

Traitement :

- Dermatophytes de la peau glabre.
- Intertrigos génitaux et cruraux non macérés.
- Traitement d'appoint des teignes. Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire.
- Erythrasma.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE MYCODERME® 1 % Crème ?

- Ne prenez jamais **MYCODERME® 1 % Crème** dans les cas suivants :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste à la rubrique 6.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• Mise en garde et précaution d'emploi :

- Faites attention avec **MYCODERME® 1 % Crème** :
- chez l'enfant,

- sur une grande surface de peau,
- sur une peau lésée (abîmée),
- dans les situations où le phénomène d'occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, lésions sous mammaire).

Dans ces cas, il faut respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquées dans la notice car le produit pénètre plus facilement dans la peau.

- Vous devez arrêter d'utiliser ce médicament si une allergie (reconnaissable par des rougeurs, des boutons...) ou une irritation apparaissent.

• Ne pas appliquer dans l'œil, le nez ou en général sur des muqueuses.

• Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication de *Candida*).

• En raison de la présence d'acide benzoïque, ce médicament peut provoquer une irritation de la peau, des yeux, et des muqueuses.

• Ce médicament contient du butylhydroxyanisole et peut provoquer des réactions cutanées locales (eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Interactions avec d'autres médicaments

• Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Prévenez votre médecin si vous prenez un médicament pour fluidifier le sang (les antivitamines K (comme acénocoumarol, fluidione, phénindione, ticloomarol, warfarine) car **MYCODERME® 1 % Crème**, peut modifier l'action des antivitamines K chez certaines personnes. Par conséquent, vous devrez surveiller fréquemment l'INR (examens sanguins). Selon votre situation, votre médecin peut également décider de modifier la dose de votre antivitamines K pendant ou après le traitement **MYCODERME® 1 % Crème**.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

• Grossesse et allaitement :

Compte tenu d'un passage systémique limité après application par voie topique et du recul clinique, l'utilisation du **MYCODERME® 1 % Crème**, est envisageable au cours de la grossesse quel qu'en soit le terme ainsi qu'au cours de l'allaitement.

Ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

• Effets sur la capacité à conduire et l'utilisation des machines : Sans objet.

• Informations importantes concernant certains composants de **MYCODERME® 1 % Crème** :

Ce médicament contient de l'acide benzoïque et du butylhydroxyanisole (voir le paragraphe "Faites attention avec **MYCODERME® 1 % Crème**").

3. COMMENT PRENDRE MYCODERME® 1 % Crème ?

MYCODERME® 1 % Crème est à usage local : il s'applique directement sur la peau.

Respectez bien les étapes suivantes pour l'application :

- Nettoyez la zone atteinte ainsi que son contour, puis séchez bien la peau avant l'application.
- Appliquez **MYCODERME® 1 % Crème** sur et autour de la zone



CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

Lot: 200658

À consommer de
préférence avant le: 11/2025

PPC: 79,50 DH

COMPOSITION (par comprimé)

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucrose, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et





CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

Lot: 200658

À consommer de
préférence avant le: 11/2025

PPC: 79,50 DH

COMPOSITION (par comprimé)

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucrose, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et





CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

Lot: 200658

À consommer de
préférence avant le: 11/2025

PPC: 79,50 DH

COMPOSITION (par comprimé)

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucrose, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et





CARBOSORB®

Charbon végétal activé, chondrus et huiles essentielles de fenouil

Lot: 200658

À consommer de
préférence avant le: 11/2025

PPC: 79,50 DH

COMPOSITION (par comprimé)

Charbon végétal, chondrus (chondrus crispus) en poudre, argile alimentaire, fructo-oligosaccharide, dioxyde de silice, sucrose, phosphate de calcium; cellulose, amidon, fenouil (foeniculum vulgare) huile essentielle, polyvinylpyrrolidone, magnésium stéarate, carboxyméthylcellulose.

PROPRIETES :

CARBOSORB® est un produit naturel à base de :

- Charbon végétal activé à grande capacité d'absorption de gaz intestinaux et de toxines ce qui permet de soulager les patients ballonnés et de faciliter la digestion.
- Chondrus (algue rouge); Argile alimentaire; FOS (Fructo-Oligo-Saccharides) et





6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336

MERCK

نشرة: معلومات الاستعمال

ليفوتيروكس® قرص قابل للقطع

ليفوتيروكسين صودي، عن طريق الفم

يجب قراءة هذه النشرة بكاملها بانتباه قبل استعمال هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها من جديد
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى، اسأل طبيبك أو صيدليك
 - وصف لك هذا الدواء شخصياً. لا تعطيه لأحد سواك، حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض التي لديك، لأن ذلك قد يسبب له الضرر
 - إذا كنت تواجه أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو صيدليك. وهذا ينطبق أيضاً على أي من الآثار الجانبية المحتملة غير المذكورة في هذه النشرة
- انظر الفقرة 4

تحتوي هذه النشرة:

فترة الحمل.

الاشتراك بين ليفوتيروكس مع مضادات الغدة الدرقية في علاج فرط التدرق لا يشار إليه خلال فترة الحمل. في الواقع، ليفوتيروكس يجتاز قليلاً جداً حاجز المشيمة، في حين مضادات الغدة الدرقية تجتازها بسهولة. لهذا قد يؤدي إلى خطورة حدوث قصور الغدة الدرقية عند الجنين.

الرضاعة الطبيعية هي ممكنة خلال فترة العلاج.

قصور الغدة الدرقية أو فرط التدرق قد يضعف الخصوبة. وينبغي تكييف علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة ليفوتيروكس على أساس المراقبة البيولوجية لأن أخذ تحت الجرعة قد لا

- 1 - ماهو ليفوتيروكس قرص قابل للقطع و ما هي حالات استعماله؟
- 2 - ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 3 - ما هي طريقة استعمال ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 4 - ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟
- 5 - ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس قرص قابل للقطع ؟
- 6 - محتويات العلبة و معلومات أخرى