

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-567831

66426

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 03677 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : MENNI MUSTAPHA
 Date de naissance : 07/09/60
 Adresse : 442 MASSIRA 3 B Manakch
 Tél. : 06 61 21 19 11 Total des frais engagés : 1476,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 23/03/2021
 Nom et prénom du malade : Boutaleb Sophie
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : HTA Diabète
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Manakch Le : / /
 de l'adhérent(e) :

[illegible][illegible]

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	23/03/21	H-T	800,00



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 D H 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 00000000 11433553 B			
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			
				MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. AMINE Soufiane

Spécialiste en cardiologie

Maladies du cœur et des vaisseaux

Diplômé en Echographie cardiaque - Vienne

Attestation en échodoppler vasculaire - Paris

Cardiologie et explorations cardiovasculaires

Electrocardiogramme

Epreuve d'effort

Holter Tensionnel

Holter Rythmique



الدكتور أمين سفيان
اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

طب القلب والأوعية الدموية

ارتفاع ضغط الدم

دبلوم في الفحص القلب بالصدى - فيينا

شهادة فحص الشرايين بالصدى و الدوبلر - باريس

تخطيط القلب

فحص اختبار الجهد

قياس الضغط الدموي بالهولتير

فحص تخطيط القلب بالهولتير

Casablanca le : : الدار البيضاء في

23/03/2021

Mme BOUTALEB Sophia

NOTE D'HONORAIRE : 2021/197

Actes	Montant
Consultation+ECG	300,00
Holter tensionnel	800,00
Total :	1 100,00

Arrêtée la présente note d'honoraire à la somme de :

MILLE CENT DIRHAMS

Dr. AMINE
CARDIOLOGUE
1. Tantan et Avenue Sami
Sami 1er étage - Bourgogne
Casablanca
Tel : 06 59 39 40 40 / Gsm: 06 59 39 40 40

Angle boulevard Dr. Mohamed Sijilmassi (ex Bd du Phare) et boulevard Tantan, Résidence SAMI,
1^{er} étage, Bourgogne-Casablanca

Tel : 05 22 36 55 55 / Urgences : 06 59 39 40 40

زاوية شارع طانطان وشارع الدكتور السجلماسي (شارع المنار سابقا)، إقامة سامي، بوركون - الدار البيضاء

الهاتف : 05 22 36 55 55 / مستعجلات : 06 59 39 40 40

Bipreterax® Arginine 5 mg

125/60



pelliculé

Périndopril arginine/Indapamide

Prenez cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Il ne faut pas avoir besoin de la relire.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (Cf. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
7. **QUEST-CE QUE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : périndopril et diurétiques, code ATC : C09BA04
BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est une association de deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide. Ce médicament est un anti-hypertenseur et est indiqué dans le traitement de l'hypertension chez l'adulte.

Le périndopril appartient à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Il agit en dilatant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. « Contenu de l'emballage et autres informations »).
 - si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un brusque gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes (quelles qu'en soient les circonstances (angioedème)).
 - si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aldiskine pour diminuer votre pression artérielle,
 - si vous avez une maladie sévère du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (troubles neurologiques au cours d'atteinte du foie),
 - si vous avez une maladie sévère du rein avec diminution de l'apport sanguin au niveau rénal (sténose artérielle rénale),
 - si vous êtes dialysé ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, BIPRETERAX Arginine peut ne pas être adapté,
 - si vous avez un taux anormalement bas de potassium sanguin,
 - si vous avez une décompensation cardiaque non traitée suspectée (importante rétention d'eau, difficultés à respirer),
 - si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse (Cf. « Grossesse et allaitement »)),
 - si vous allaitez,
 - si vous êtes actuellement traité par sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque (voir les rubriques « Avertissements et précautions » et « Contenus des médicaments » de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg).
- Avertissements et précautions**
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :
- si vous avez une sténose aortique (rétrécissement de l'artère principale alimentant le cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (maladie du muscle cardiaque) ou une sténose de l'artère rénale (rétrécissement de l'artère rénale),
 - si vous avez une insuffisance cardiaque ou tout autre problème cardiaque,
 - si vous avez des troubles rénaux, ou si vous êtes sous dialyse,
 - si vous avez des taux anormalement élevés d'une hormone appelée aldostérone dans le sang (aldostéronisme primaire).

- l'amlisulpride, le sulpiride, le sultopride, le tiapride, l'halopéridol, le drospéridol),
 - tétracosactide (pour traiter la maladie de Cohn),
 - triméthoprim (pour le traitement d'infections),
 - vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins),
 - médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex : éphédrine, noradrénaline ou adrénaline).
- BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l'alcool**
Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec un repas.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Si vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire très gravement à votre enfant.

Allaitement

vous ne devez pas prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez.

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement. BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent.

Votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématuré.

Consultez votre médecin immédiatement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Généralement, BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des réactions individuelles comme des étourdissements ou de la fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé contient du lactose monohydraté

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée est de un comprimé par jour. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie si vous souffrez d'insuffisance rénale. Le comprimé doit être avalé avec un verre d'eau en une prise quotidienne, de préférence le matin et avant le repas.

si vous avez pris plus de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris trop de comprimés, contactez immédiatement votre médecin ou l'hôpital le plus proche. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension. Si une hypotension importante se produit (associée à des nausées, vomissements, crampes, étourdissements, somnolence, état confusionnel, changements dans la quantité d'urine produite par les reins), elle peut être combattue en allongeant le patient, jambes relevées.

si vous oubliez de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé

Bipreterax® Arginine 5 mg

125/60



pelliculé

Périndopril arginine/Indapamide

Prenez cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Il ne faut pas avoir besoin de la relire.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (Cf. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
7. **QUEST-CE QUE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : périndopril et diurétiques, code ATC : C09BA04
BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est une association de deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide. Ce médicament est un anti-hypertenseur et est indiqué dans le traitement de l'hypertension chez l'adulte.

Le périndopril appartient à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Il agit en dilatant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. « Contenu de l'emballage et autres informations »).
 - si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un brusque gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes (quelles qu'en soient les circonstances (angioedème).
 - si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aldiskine pour diminuer votre pression artérielle,
 - si vous avez une maladie sévère du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (troubles neurologiques au cours d'atteinte du foie),
 - si vous avez une maladie sévère du rein avec diminution de l'apport sanguin au niveau rénal (sténose artérielle rénale),
 - si vous êtes dialysé ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, BIPRETERAX Arginine peut ne pas être adapté,
 - si vous avez un taux anormalement bas de potassium sanguin,
 - si vous avez une décompensation cardiaque non traitée est suspectée (importante rétention d'eau, difficultés à respirer),
 - si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse (Cf. « Grossesse et allaitement »),
 - si vous allaitez,
 - si vous êtes actuellement traité par sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque (voir les rubriques « Avertissements et précautions » et « Contenus des médicaments » de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg).
- Avertissements et précautions**
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :
- si vous avez une sténose aortique (rétrécissement de l'artère principale alimentant le cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (maladie du muscle cardiaque) ou une sténose de l'artère rénale (rétrécissement de l'artère rénale),
 - si vous avez une insuffisance cardiaque ou tout autre problème cardiaque,
 - si vous avez des troubles rénaux, ou si vous êtes sous dialyse,
 - si vous avez des taux anormalement élevés d'une hormone appelée aldostérone dans le sang (aldostéronisme primaire).

- l'amlisulpride, le sulpiride, le sultopride, le tiapride, l'halopéridol, le drospéridol),
 - tétracosactide (pour traiter la maladie de Cohn),
 - triméthoprim (pour le traitement d'infections),
 - vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins),
 - médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex : éphédrine, noradrénaline ou adrénaline).
- BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec un repas.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Si vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire très gravement à votre enfant.

Allaitement

vous ne devez pas prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez.

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement. BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent.

Vous pouvez choisir de cesser tout traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématuré.

Consultez votre médecin immédiatement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Généralement, BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des réactions individuelles comme des étourdissements ou de la fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé contient du lactose monohydraté

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée est de un comprimé par jour. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie si vous souffrez d'insuffisance rénale. Le comprimé doit être avalé avec un verre d'eau en une prise quotidienne, de préférence le matin et avant le repas.

si vous avez pris plus de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris trop de comprimés, contactez immédiatement votre médecin ou l'hôpital le plus proche. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension. Si une hypotension importante se produit (associée à des nausées, vomissements, crampes, étourdissements, somnolence, état confusionnel, changements dans la quantité d'urine produite par les reins), elle peut être combattue en allongeant le patient, jambes relevées.

si vous oubliez de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé

Bipreterax® Arginine 5 mg

125/60



pelliculé

Périndopril arginine/Indapamide

Prenez cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Il ne faut pas avoir besoin de la relire.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentiez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (Cf. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
7. **QUEST-CE QUE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : périndopril et diurétiques, code ATC : C09BA04
BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est une association de deux principes actifs, le périndopril et l'indapamide. Ce médicament est un anti-hypertenseur et est indiqué dans le traitement de l'hypertension chez l'adulte.

Le périndopril appartient à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC). Il agit en dilatant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux. L'indapamide est un diurétique. Les diurétiques augmentent la quantité d'urine produite par les reins. Cependant, l'indapamide est différent des autres diurétiques ; il n'entraîne qu'une légère augmentation de la quantité d'urine produite. Ces deux principes actifs réduisent la pression artérielle et agissent ensemble pour la contrôler.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique au périndopril ou à d'autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à l'indapamide ou à tout autre sulfamide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (Cf. « Contenu de l'emballage et autres informations »).
 - si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un brusque gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes (quelles qu'aient été les circonstances (angioedème).
 - si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle,
 - si vous avez une maladie sévère du foie ou si vous souffrez d'une encéphalopathie hépatique (troubles neurologiques au cours d'atteinte du foie),
 - si vous avez une maladie sévère du rein avec diminution de l'apport sanguin au niveau rénal (sténose artérielle rénale),
 - si vous êtes dialysé ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, BIPRETERAX Arginine peut ne pas être adapté,
 - si vous avez un taux anormalement bas de potassium sanguin,
 - si vous avez une décompensation cardiaque non traitée suspectée (importante rétention d'eau, difficultés à respirer),
 - si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse (Cf. « Grossesse et allaitement »),
 - si vous allaitez,
 - si vous êtes actuellement traité par sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque (voir les rubriques « Avertissements et précautions » et « Contenus des médicaments » de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg).
- Avertissements et précautions**
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé :
- si vous avez une sténose aortique (rétrécissement de l'artère principale alimentant le cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (maladie du muscle cardiaque) ou une sténose de l'artère rénale (rétrécissement de l'artère rénale),
 - si vous avez une insuffisance cardiaque ou tout autre problème cardiaque,
 - si vous avez des troubles rénaux, ou si vous êtes sous dialyse,
 - si vous avez des taux anormalement élevés d'une hormone appelée aldostérone dans le sang (aldostéronisme primaire).

- l'amlisulpride, le sulpiride, le sultopride, le tiapride, l'halopéridol, le drospéridol),
 - tétracosactide (pour traiter la maladie de Cohn),
 - triméthoprim (pour le traitement d'infections),
 - vasodilatateurs incluant les dérivés nitrés (produits permettant de dilater les vaisseaux sanguins),
 - médicaments utilisés dans le traitement de l'hypotension, du choc ou de l'asthme (ex : éphédrine, noradrénaline ou adrénaline).
- BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec des aliments, boissons et de l'alcool**
Il est conseillé de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avec un repas.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez d'être enceinte, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Si vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire très gravement à votre enfant.

Allaitement

vous ne devez pas prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé si vous allaitez.

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement. BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé est contre-indiqué chez les femmes qui allaitent.

Vous pouvez choisir de cesser tout traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est nouveau-né ou prématuré.

Consultez votre médecin immédiatement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Généralement, BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé n'affecte pas la vigilance mais des réactions individuelles comme des étourdissements ou de la fatigue en relation avec une baisse de la pression artérielle peuvent survenir chez certains patients. Par conséquent, votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines peut être diminuée.

BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé contient du lactose monohydraté

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE BIPRETERAX ARGININE 5 MG/1,25 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée est de un comprimé par jour. Votre médecin pourra être amené à modifier la posologie si vous souffrez d'insuffisance rénale. Le comprimé doit être avalé avec un verre d'eau en une prise quotidienne, de préférence le matin et avant le repas.

si vous avez pris plus de BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris trop de comprimés, contactez immédiatement votre médecin ou l'hôpital le plus proche. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension. Si une hypotension importante se produit (associée à des nausées, vomissements, crampes, étourdissements, somnolence, état confusionnel, changements dans la quantité d'urine produite par les reins), elle peut être combattue en allongeant le patient, jambes relevées.

si vous oubliez de prendre BIPRETERAX Arginine 5 mg/1,25 mg, comprimé pelliculé

Dr. AMINE Soufiane

Spécialiste en cardiologie
Maladies du cœur et des vaisseaux



الدكتور أمين سفيان
اختصاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية

Casablanca 23/03/2021

Mme BOUTALEB Sophia

125,60
x 3
BIPRETERAX 5/1.25 MG

1 comprimé le matin, pendant 3 mois

RÉGIME PEU SALÉ

PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE, 17/06/2021 POUR CONSULTATION

Dr. Soufiane AMINE
CARDIOLOGUE
Angle Bd. Tantan et Avenue Dr Sijjmassi
Rés. Sami 1er Etage, Bourgogne
Casablanca
Tél: 0522 36 55 55 / Gsm: 06 59 39 40 40

NamBOUTALEB SOPHIA

ECG

Sex :

Age :

Clinic No. :


Section :

SN : 0008890

Case No. :

Bed No. :

Date 23/03/2021



Frequency:	1000Hz	PR Interval:	136 ms	Prompt: Total Beats 39, Normal Beats 39, SVE 0, VE 0. in gear Sinus mode Target rate; Longitudinal Left axis deviation; aVL Abnormal T wave; <i>Rykegla normal; FC = 76 bpm</i> <i>vec: +25°</i> <i>Qrde Tc) en V6</i> Dr. Soufiane AMINE CARDIOLOGUE Angle Bd. Tantan et Avenue Dr Sijlmassat Rés. Sami 1er Etage Bourgogne Casablanca Tél: 33 36 55 55 / Gsm: 36 59 39 40 40
Sample Time:	32s	QT Interval:	389 ms	
HR:	76bpm	QTc Interval:	436 ms	
P Interval:	81ms	P Axis:	38.30°	
RS Interval:	85 ms	QRS Axis:	28.40°	
Interval:	189 ms	T Axis:	54.30°	

Physician Signature:

Rapport de pression artérielle ambulatoire

Nom : BOUTALEB Sophia Homme/Femme: Female Âge:
ID : 2103091648 N ° de lit: Département No .:
Début du test: 2021/03/23 16:15 Fin du test: 2021/03/24 15:49 Durée: 23Heure34Minute

Information patient

Adresse: Taille: --cm
Poids: --kg
N° sortie patient : Nationalité:
N ° d'entrée: Téléphone:
Email:

Médicaments actuels

Bipreterax 5/1.25 mg

Examiner le résultat

Toutes les moyennes de BP:	119/76mmHg	Seuil BP:	130/40mmHg
Moyennes Bp du jour :	123/79mmHg	Seuil BP:	135/85mmHg
Moyennes Bp de Nuit :	106/66mmHg	Seuil BP:	120/70mmHg

Valeur de charge BP de jour: Normale<40%

SYS(>135mmHg) 18.6%

DIA(>85mmHg) 25.4%

Valeur de charge BP de nuit: Normale<50%

SYS(>120mmHg) 12.5%

DIA(>70mmHg) 18.8%

SYS Maximum	146mmHg	Heure	2021/3/24 13:30	SYS Minimum	93mmHg	Heure	2021/3/24 04:30
Maximum DIA	98mmHg	Heure	2021/3/23 17:00	Minimum DIA	54mmHg	Heure	2021/3/24 04:30
Rythme circadien BP:SYS Nuit Dec.	14.1%	DIA Nuit Dec.	16.6%	Normal:10%-20%			

BP CV:	Tous:SYS	12.3%	DIA	13.8%
	Jour:SYS	10.8%	DIA	11.7%
	Nuit:SYS	10.5%	DIA	12.4%

Commentaires & diagnostique

Holter tensionnel dans les limites de la normale sous traitement (bipreterax 5/1.25 mg)

Dr. Soufiane AMINE
CARDIOLOGUE
Angle Bd. Tadjan et Avenue Dr Sijilmassi
Rés. Sami Ter Etage Bourgogne
Casablanca
Tél: 0522 36 55 55 / Gsm: 06 59 39 40 40

Docteur


Assistant

Date

Rapport de pression artérielle ambulatoire

Nom : BOUTALEB Sophia Homme/Femme: Female Âge:
ID : 2103091648 N ° de lit: Département No .:
Début du test: 2021/03/23 16:15 Fin du test: 2021/03/24 15:49 Durée: 23Heure34Minute




Tendance BP



Rapport de pression artérielle ambulatoire

Nom : BOUTALEB Sophia **Homme/Femme:** Female **Âge:**
ID : 2103091648 **N ° de lit:** **Département No .:**
Début du test: 2021/03/23 16:15 **Fin du test:** 2021/03/24 15:49 **Durée:** 23Heure34Minute

Histogramme(Tout)





Rapport de pression artérielle ambulatoire

Nom : BOUTALEB Sophia **Homme/Femme:** Female **Âge:**
ID : 2103091648 **N ° de lit:** **Département No .:**
Début du test: 2021/03/23 16:15 **Fin du test:** 2021/03/24 15:49 **Durée:** 23Heure34Minute



Camembert(Tout)

Max: 146(mmHg)(13:30)
Min: 93(mmHg)(04:30)
Moy: 119(mmHg)





Systole (mmHg)

Max: 98(mmHg)(17:00)
Min: 54(mmHg)(04:30)
Moy: 76(mmHg)



Diastole (mmHg)

Max: 110(BPM)(17:31)
Min: 71(BPM)(11:30)
Moy: 86(BPM)



FC (bpm)

Rapport de pression artérielle ambulatoire

Nom :	BOUTALEB Sophia	Homme/Femme:	Female	Âge:	
ID :	2103091648	N ° de lit:		Département No .:	
Début du test:	2021/03/23 16:15	Fin du test:	2021/03/24 15:49	Durée:	23Heure34Minute

Données Mesurées

Num	Date	Heure	Sys	Moy	Dia	PP	FC	Etat	Commentaire
1	2021/3/23	16:15	146 ↑	105	94 ↑	52	84	0	
2	2021/3/23	16:30	135	96	87 ↑	48	82	0	
3	2021/3/23	16:45	146 ↑	111	96 ↑	50	97	0	
4	2021/3/23	17:00	144 ↑	118	98 ↑	46	100	0	
5	2021/3/23	17:15	119	88	76	43	86	0	
6	2021/3/23	17:31	146 ↑	96	87 ↑	59	110	0	
7++	2021/3/23	17:49	138 ↑	98	81	57	94	0	
8	2021/3/23	18:00	130	92	86 ↑	44	88	0	
9	2021/3/23	18:15	134	95	74	60	94	0	
10	2021/3/23	18:30	137 ↑	93	85	52	93	0	
11	2021/3/23	18:45	129	96	86 ↑	43	93	0	
12	2021/3/23	19:00	138 ↑	114	86 ↑	52	87	0	
13	2021/3/23	19:15	134	92	83	51	96	0	
14	2021/3/23	19:30	121	90	79	42	91	0	
15	2021/3/23	19:45	123	91	80	43	91	0	
16	2021/3/23	20:00	120	91	78	42	92	0	
17	2021/3/23	20:16	112	76	66	46	88	0	
18	2021/3/23	20:45	123	91	79	44	93	0	
19	2021/3/23	21:00	129	97	87 ↑	42	97	0	
20	2021/3/23	21:15	113	81	69	44	88	0	
21	2021/3/23	21:30	130	98	84	46	101	0	
22	2021/3/23	21:45	135	97	86 ↑	49	96	0	
23	2021/3/23	22:00	127	101	92 ↑	35	106	0	
24	2021/3/23	23:01	135 ↑	92	84 ↑	51	84	0	
25	2021/3/23	23:30	109	82	72 ↑	37	85	0	
26	2021/3/24	00:00	104	84	64	40	82	0	
27	2021/3/24	00:30	101	74	66	35	80	0	
28	2021/3/24	01:00	101	73	61	40	87	0	
29	2021/3/24	01:30	130 ↑	99	84 ↑	46	103	0	
30	2021/3/24	02:00	98	68	60	38	80	0	
31	2021/3/24	02:30	106	76	66	40	83	0	
32	2021/3/24	03:00	98	70	63	35	83	0	
33	2021/3/24	03:30	98	67	56	42	85	0	
34	2021/3/24	04:00	102	72	59	43	82	0	
35	2021/3/24	04:30	93	65	54	39	85	0	
36	2021/3/24	05:00	98	75	65	33	84	0	
37	2021/3/24	05:30	103	72	63	40	83	0	
38	2021/3/24	06:00	111	82	69	42	83	0	
39	2021/3/24	06:30	104	76	65	39	78	0	
40	2021/3/24	07:00	104	72	63	41	83	0	
41	2021/3/24	07:15	106	80	68	38	83	0	

Rapport de pression artérielle ambulatoire

Nom :	BOUTALEB Sophia	Homme/Femme:	Female	Âge:	
ID :	2103091648	N ° de lit:		Département No.:	
Début du test:	2021/03/23 16:15	Fin du test:	2021/03/24 15:49	Durée:	23Heure34Minute

Données Mesurées

Num	Date	Heure	Sys	Moy	Dia	PP	FC	Etat	Commentaire
42	2021/3/24	07:30	110	77	66	44	76	0	
43	2021/3/24	07:45	108	80	71	37	83	0	
44	2021/3/24	08:00	102	73	61	41	80	0	
45	2021/3/24	08:15	105	79	68	37	77	0	
46	2021/3/24	08:30	111	75	64	47	76	0	
47	2021/3/24	08:45	104	74	62	42	79	0	
48	2021/3/24	09:00	98	79	70	28	78	0	
49	2021/3/24	09:15	101	76	64	37	80	0	
50	2021/3/24	09:30	94	72	60	34	77	0	
51	2021/3/24	09:45	111	79	71	40	73	0	
52	2021/3/24	10:00	113	87	70	43	72	0	
53	2021/3/24	10:15	146 ↑	93	81	65	101	0	
54	2021/3/24	10:30	120	95	91 ↑	29	79	0	
55	2021/3/24	10:45	121	94	83	38	82	0	
56	2021/3/24	11:00	134	93	83	51	95	0	
57	2021/3/24	11:15	131	92	79	52	83	0	
58	2021/3/24	11:30	124	100	77	47	71	0	
59	2021/3/24	11:45	119	93	81	38	76	0	
60	2021/3/24	12:00	121	94	82	39	78	0	
61	2021/3/24	12:15	123	91	81	42	79	0	
62	2021/3/24	12:30	118	83	73	45	74	0	
63	2021/3/24	12:45	113	87	75	38	76	0	
64	2021/3/24	13:01	138 ↑	108	93 ↑	45	89	0	
65	2021/3/24	13:16	123	87	76	47	90	0	
66	2021/3/24	13:30	146 ↑	108	93 ↑	53	100	0	
67	2021/3/24	13:45	139 ↑	102	88 ↑	51	85	0	
68	2021/3/24	14:00	124	91	78	46	92	0	
69	2021/3/24	14:15	121	91	82	39	88	0	
70	2021/3/24	14:30	119	90	76	43	98	0	
71	2021/3/24	14:47	134	101	84	50	84	0	
72	2021/3/24	15:00	114	91	83	31	90	0	
73	2021/3/24	15:15	124	85	76	48	88	0	
74	2021/3/24	15:31	113	87	79	34	86	0	
75++	2021/3/24	15:49	120	86	75	45	85	0	