

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



75055

Déclaration de Maladie : N° P19- 0020987

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10347 Société :
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : Ouaziz Mustafa Date de naissance : 01/01/1948
 Adresse : WIFAK 3 Rue 73 N° 3 Casablanca
 Tél : 0706 37 59 98 Total des frais engagés : 3 798,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 14/06/2021
 Nom et prénom du malade : Ouaziz Mustafa Age : 73ans
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Cardopathie ischémique Label
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 14/06/2021
 Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/06/21				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. Imane TAOUSS	14/06/21	3754,80
Wifaq 4, Rue 109 N° 46	14/06/21	44,00
Casablanca - Tél: 022 922 922		

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'exécution.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	[Création, remont, adjonction]		MONTANTS DES SOINS														
	Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



وصفة طبية Ordonnance

14/06/2021

Casablanca, le :

Mr OUAZIZ Mustapha

374,00 x 3

①
376,00 x 3

②
30,20 x 3

③
208,00 x 3

④
4200

⑤
29.90 x 3

⑥
269,00 x 3

⑦
3754,80

TRIENTA

1 cp 15 le matin

Plavix 75

1 cp 15 le matin

KARDECIC 75

1515 cps le reps
de midi

TAHOL 80

1 cp 15 le soir

CANPROL 30

1 cp 15 le soir

Biprol 5

1 cp 15

COVERAM 10/5

1 cp 15

de 0200



6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg
(Linagliptine)

28 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV : 374 DH 00
10010704/01

6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg
(Linagliptine)

28 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV : 374 DH 00
10010704/01

6 118001 040773

TRAJENTA® 5 mg
(Linagliptine)

28 comprimés pelliculés

BOTTU S.A.

PPV : 374 DH 00
10010704/01

BIAFINE



MAROC AMM
N° 18DM/21/NTT

44,00 DHS
Prix Public de Vente

Maroc

9 400000 050242

377698

avant de prendre ce médicament.
nites pour votre traitement.
avez un doute, demandez plus
à pharmacien.
desoin de la ruelle.
ions et de conseils, adressez-vous à
sistent, consulter un médecin.
nles non mentionnés dans cette notice,
ommes comme étant grave, veuillez en
con.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BIAFINE, émission pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER BIAFINE, ÉMISSION POUR APPLICATION CUTANÉE ?
3. COMMENT UTILISER BIAFINE, émission pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BIAFINE, émission pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

- Indications thérapeutiques**
- Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapeutiques.
 - Brûlures du premier et du second degré et toute autre plaie cutanée non infectée.
- 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER BIAFINE, ÉMISSION POUR APPLICATION CUTANÉE ?**
- N'utilisez jamais BIAFINE, émission pour application cutanée dans les cas suivants :**
- Allergie connue à l'un des composants de la préparation.
 - Lésion hémorragique (avec saignements).
 - Lésion infectée.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**
- Faites attention avec BIAFINE, émission pour application cutanée.**
- Mises en garde spéciales
- d'appliquer un médicament sur la lésion.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- Précautions d'emploi
- Le médicament n'est pas un protecteur solaire. Ce médicament ne doit pas être utilisé comme crème de soins sur une peau saine.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- Prise ou utilisation d'autres médicaments :**
- Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Informations importantes concernant certains composants de BIAFINE, émission pour application cutanée :**
- Les excipients suivants sont des composants dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :
- Propylène glycol
 - Sorbate de potassium
 - Parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219)
 - Parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217)
- Grossesse - Allaitement**
- Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Février 2011.

MAROC
93 g AMM N° 18DM/21/NTT
186 g AMM N° 11283012

TUNISIE
93 g AMM 11283012
186 g AMM 11283012

MÉDICAMENT AUTOISÉ

JANSEN CILAG
DOMAINE DE MAIGREMONT
27100 VAL DE REUIL

Titulaire/Expéditeur :
JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTE FRANCE
1 RUE CAMILLE DESMOLINS
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Qu'est-ce que BIAFINE, émission pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?
Emulsion pour application cutanée
Tube de 83 g, ou 186 g.

Les autres composants sont :
Stéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, palmitate de cétyle, paraffine solide, paraffine liquide, polypropylène glycol, propylène glycol, huile d'avocat, alginate de troiane et de sodium, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E 217), arôme yerbatone, eau purifiée.

La substance active est :
Troiane
Pour 100 g d'émission pour application cutanée, 0,670 g

Que contient BIAFINE, émission pour application cutanée ?

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ne pas conserver à une température inférieure à 0°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

5. COMMENT CONSERVER BIAFINE, émission pour application cutanée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser BIAFINE, émission pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
Ne pas conserver à une température inférieure à 0°C.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BIAFINE, émission pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

• Douleurs (picotements) modérées et transitoires (15 à 30 minutes) pouvant survenir après l'application.
• Rare allergie de contact.

• Très rares cas d'eczéma de contact nécessitant l'arrêt immédiat du traitement. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Mode et voie d'administration :

Voie cutanée
par jour.
jusqu'à refus de la peau. Faire pénétrer par un léger massage. Renouveler 2 à 4 fois

• Brûlures du premier degré : en cas de brûlure étendue, une consultation auprès de votre médecin est indispensable (voir Mises en garde). Appliquer en couche épaisse lésion. Recouvrir si besoin d'une compresse humidifiée et terminer le pansement. Ne pas utiliser de pansement absorbant sec.

• Brûlures du second degré et autres plaies cutanées : une consultation auprès de votre médecin est nécessaire (voir Mises en garde). Après nettoyage de la plaie, appliquer en couche épaisse en débordant largement la surface de la lésion et renouveler les applications afin de maintenir toujours un excédent d'émission sur la lésion. Recouvrir si besoin d'une compresse humidifiée et terminer le pansement. Ne pas utiliser de pansement absorbant sec.

3. COMMENT UTILISER BIAFINE, émission pour application cutanée ?

Posologie
Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapeutiques : suivre les recommandations de votre médecin. En général, 2 à 3 applications quotidiennes, régulièrement espacées, en faisant pénétrer par un léger massage.



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI 

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament : (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique, • En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j), • En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce n
adri

d) I

AFIL

MEL

AUT

PHARMAC

oraux (nota

doses) ou d

anti-infla

à des doses > 3 g/j).

LOT : 21E002
P.N. 09 2022

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V. : 30DH70



6 118000 061847

Titulaire de l'AMM : sanofi-synthelabo



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI 

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament : (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique, • En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j), • En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce n
adri

d) I

AFIL

MEL

AUT

PHARMAC

oraux (nota

doses) ou d

anti-infla

à des doses > 3 g/j).

LOT : 21E002
P.N. 09 2022

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V. : 30DH70



6 118000 061847

Titulaire de l'AMM : sanofi-synthelabo



KARDEGIC® 75mg

Acétylsalicylate de DL-Lysine
poudre pour solution buvable en sachet-dose

SANOFI 

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) Dénomination :

KARDEGIC 75 mg, poudre pour solution buvable.

b) Composition :

ACETYLSALICYLATE DE DL-LYSINE 135 mg (quantité correspondante en acide acétylsalicylique : 75 mg).

Excipients : Glycocolle, arôme mandarine, glycyrrhizinate d'ammonium.

c) Forme pharmaceutique :

poudre pour solution buvable ; sachet-dose ; boîte de 30.

d) Classe pharmaco-thérapeutique :

ANTI-THROMBOTIQUE / INHIBITEUR DE L'AGREGATION PLAQUETTAIRE, HEPARINE EXCLUE.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (Indications)

Ce médicament contient de l'aspirine, mais ce dosage est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur ou des vaisseaux, seul ou associé aux autres traitements prescrits par votre médecin.

Il ne devra pas être entrepris sans l'avis de celui-ci, seul juge de l'établissement et de la conduite de ce traitement.

3. ATTENTION

a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament : (Contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- En cas d'allergie connue à l'aspirine ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (telle qu'éruption cutanée ou asthme),
- En cas de maladie hémorragique, • En cas de traitement concomitant par le méthotrexate, ou par les anticoagulants oraux (lorsque l'aspirine est prescrite à fortes doses (>3 g/j), • En dehors d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une

surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3 g/j) (cf. Interactions médicamenteuses et autres interactions). L'allaitement est déconseillé pendant le traitement (cf. Grossesse et Allaitement).

b) Mises en garde spéciales :

Réservé à l'adulte.

Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale.

c) Précautions d'emploi :

Il est important de signaler à votre médecin certains problèmes de santé ou situations : - maladie des reins, - asthme, - antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, ou d'hémorragies digestives, hypertension artérielle, - diabète, - port de stérilet. L'aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours. Prévenir votre médecin traitant, le chirurgien, l'anesthésiste ou simplement votre dentiste au cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.

Ce n
adri

d) I

AFIL

MEL

AUT

PHARMAC

oraux (nota

doses) ou d

anti-infla

à des doses > 3 g/j).

LOT : 21E002
P.N. 09 2022

KARDEGIC 75MG
SACHETS B30

P.P.V. : 30DH70



6 118000 061847

Titulaire de l'AMM : sanofi-synthelabo

Plavix® 75 mg

comprimés pelliculés
clopidogrel

SANOFI

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
3. Comment prendre Plavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Plavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agrégent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation, les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé thrombose).

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides. Cette maladie également appelée athérosclérose peut conduire à la survenue d'événements athéromotobiotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit Plavix pour empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque de survenue de tels événements graves car :

- Vous avez des artères qui se sont rigidifiées (aussi connu sous le nom d'athérosclérose), et
- Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
- Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom d'angor instable* ou d'infarctus du myocarde* (crise cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin doit également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, mais aussi pour prévenir la formation de caillots sanguins).
- Vous avez une fréquence cardiaque irrégulière, maladie appelée fibrillation auriculaire, et vous ne pouvez pas être traité par les médicaments appelés « anticoagulants oraux » (antivitamines K) qui empêchent la formation de nouveaux caillots sanguins et la croissance de caillots sanguins déjà présents. Les antivitamines K sont plus efficaces que l'acide acétylsalicylique pour que l'association de Plavix et d'acide acétylsalicylique pour cette maladie. Votre médecin vous a prescrit Plavix et de l'acide acétylsalicylique si vous ne pouvez pas être traité par des anticoagulants oraux et si vous ne présentez pas de risque majeur de saignement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais Plavix

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au clopidogrel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;
- Si vous avez une maladie actuellement responsable d'un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac ou un saignement dans le cerveau ;
- Si vous souffrez d'insuffisance hépatique sévère.

Si vous pensez être dans l'un de ces cas ou en cas de doute, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous s'applique à votre cas, vous devez vous en tenir à la prudence avant de prendre Plavix :

- Si vous avez un risque hémorragique tel que :
 - une maladie qui peut provoquer un saignement interne (comme un ulcère de l'estomac)
 - des troubles de la coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation)
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale récente (y compris dentaire)
 - une intervention chirurgicale (y compris dentaire) prévue dans les 7 jours
- Si vous avez eu un caillot dans une artère de votre cerveau (accident vasculaire ischémique) survenu dans les sept derniers jours
- Si vous présentez une maladie du foie ou des reins
- Si vous avez des antécédents d'allergie ou de réactions allergiques à tout médicament utilisé pour traiter votre maladie.

Pendant la prise de Plavix :

- Vous devez avertir votre médecin si une intervention chirurgicale est programmée (y compris dentaire).
- Vous devez aussi avertir votre médecin immédiatement si vous présentez une maladie (appelée purpura thrombopénique thrombotique ou PTT) incluant fièvre et bleus sous la peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non

de fatigue extrême inexpliquée, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").

- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison de l'absence d'efficacité.

Autres médicaments et Plavix

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même si l'arrêt d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix ou vice-versa.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement tels que :
 - o des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer la coagulation du sang), un anti-inflammatoire non-stéroïdien, médicament utilisé habituellement pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations, de l'héparine ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang
 - o de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquettaire,
 - o un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,
- de l'oméprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux d'estomac,
- du fluconazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement d'infections fongiques,
- de l'éfavirenz, un médicament utilisé pour traiter les infections au VIH (virus de l'immunodéficience humaine),
- de la carbamazépine pour le traitement de certaines formes d'épilepsies,
- du moclobémide, pour le traitement de la dépression,
- du répaglinide, médicament utilisé pour traiter le diabète,
- du paclitaxel, médicament utilisé pour traiter un cancer.

Si vous avez eu une douleur thoracique grave (angor instable ou crise cardiaque), Plavix peut vous être prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique, substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

Plavix avec des aliments et boissons

Plavix peut être pris avec ou sans aliment.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous êtes enceinte, vous devez en avertir votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Plavix. Si vous débutez une grossesse pendant un traitement par Plavix, consultez immédiatement votre médecin traitant. Il est recommandé de ne pas prendre de clopidogrel lorsque vous êtes enceinte.

Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par ce médicament. Si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter prochainement, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Plavix ne devrait pas modifier votre aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Plavix contient du lactose

En cas d'intolérance à certains sucres (par ex. : lactose), consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Plavix contient de l'huile de ricin hydrogénée

L'huile de ricin hydrogénée est susceptible d'entraîner des maux d'estomac ou une diarrhée.

3. COMMENT PRENDRE PLAVIX

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée, y compris chez les patients atteints d'une maladie appelée fibrillation auriculaire (fréquence cardiaque irrégulière), est de un comprimé de Plavix 75 mg par jour, à prendre pendant ou en dehors des repas et tous les jours au même moment de la journée.

En cas de douleur thoracique grave (angor instable ou crise cardiaque), vous devez prendre 300 mg de Plavix (1 comprimé de 300 mg ou 4 comprimés de 75 mg) pour débuter le traitement. Puis, la dose recommandée est de un comprimé de 75 mg par jour, comme décrit ci-dessus.

Plavix aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Ain sebaâ Casablanca

Plavix 75 mg cp pel b 28

P.P.V : 316,00 DH

116001 081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

Plavix[®] 75 mg

comprimés pelliculés

clopidogrel

SANOFI

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
3. Comment prendre Plavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Plavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agregent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation, les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé thrombose).

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides. Cette maladie également appelée athérosclérose peut conduire à la survenue d'événements athéromotobiotiques (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit Plavix pour empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque de survenue de tels événements graves car :

- Vous avez des artères qui se sont rigidifiées (aussi connu sous le nom d'athérosclérose), et
- Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
- Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom d'angor instable* ou d'infarctus du myocarde* (crise cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin doit également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, mais aussi pour prévenir la formation de caillots sanguins).
- Vous avez une fréquence cardiaque irrégulière, maladie appelée fibrillation auriculaire, et vous ne pouvez pas être traité par les médicaments appelés « anticoagulants oraux » (antivitamines K) qui empêchent la formation de nouveaux caillots sanguins et la croissance de caillots sanguins déjà présents. Les antivitamines K sont plus efficaces que l'acide acétylsalicylique pour que l'association de Plavix et d'acide acétylsalicylique pour cette maladie. Votre médecin vous a prescrit Plavix et de l'acide acétylsalicylique si vous ne pouvez pas être traité par des anticoagulants oraux et si vous ne présentez pas de risque majeur de saignement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais Plavix

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au clopidogrel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;
- Si vous avez une maladie actuellement responsable d'un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac ou un saignement dans le cerveau ;
- Si vous souffrez d'insuffisance hépatique sévère.

Si vous pensez être dans l'un de ces cas ou en cas de doute, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous s'applique à votre cas, vous devez vous en informer avant de prendre Plavix :

- Si vous avez un risque hémorragique tel que :
 - une maladie qui peut provoquer un saignement interne (comme un ulcère de l'estomac)
 - des troubles de la coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation)
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale récente (y compris dentaire)
 - une intervention chirurgicale (y compris dentaire) prévue dans les 7 jours
- Si vous avez eu un caillot dans une artère de votre cerveau (accident vasculaire ischémique) survenu dans les sept derniers jours
- Si vous présentez une maladie du foie ou des reins
- Si vous avez des antécédents d'allergie ou de réactions allergiques à tout médicament utilisé pour traiter votre maladie.

Pendant la prise de Plavix :

- Vous devez avertir votre médecin si une intervention chirurgicale est programmée (y compris dentaire).
- Vous devez aussi avertir votre médecin immédiatement si vous présentez une maladie (appelée purpura thrombopénique thrombotique ou PTT) incluant fièvre et bleus sous la peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non

de fatigue extrême inexpliquée, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").

- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

Enfants et adolescents

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison de l'absence d'efficacité.

Autres médicaments et Plavix

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même si l'arrêt d'un médicament obtenu sans ordonnance. Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix ou vice-versa.

Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement tels que :
 - o des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer la coagulation du sang), un anti-inflammatoire non-stéroïdien, médicament utilisé habituellement pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations, de l'héparine ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang
 - o de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquettaire,
 - o un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,
- de l'oméprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux d'estomac,
- du fluconazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement d'infections fongiques,
- de l'éfavirenz, un médicament utilisé pour traiter les infections au VIH (virus de l'immunodéficience humaine),
- de la carbamazépine pour le traitement de certaines formes d'épilepsies,
- du moclobémide, pour le traitement de la dépression,
- du répaglinide, médicament utilisé pour traiter le diabète,
- du paclitaxel, médicament utilisé pour traiter un cancer.

Si vous avez eu une douleur thoracique grave (angor instable ou crise cardiaque), Plavix peut vous être prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique, substance présente dans de nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

Plavix avec des aliments et boissons

Plavix peut être pris avec ou sans aliment.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou si vous pensez que vous êtes enceinte, vous devez en avertir votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Plavix. Si vous débutez une grossesse pendant un traitement par Plavix, consultez immédiatement votre médecin traitant. Il est recommandé de ne pas prendre de clopidogrel lorsque vous êtes enceinte.

Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par ce médicament. Si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter prochainement, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Plavix ne devrait pas modifier votre aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

Plavix contient du lactose

En cas d'intolérance à certains sucres (par ex. : lactose), consultez votre médecin avant de prendre ce médicament.

Plavix contient de l'huile de ricin hydrogénée

L'huile de ricin hydrogénée est susceptible d'entraîner des maux d'estomac ou une diarrhée.

3. COMMENT PRENDRE PLAVIX

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La dose recommandée, y compris chez les patients atteints d'une maladie appelée fibrillation auriculaire (fréquence cardiaque irrégulière), est de un comprimé de Plavix 75 mg par jour, à prendre pendant ou en dehors des repas et tous les jours au même moment de la journée.

En cas de douleur thoracique grave (angor instable ou crise cardiaque), vous devez prendre 300 mg de Plavix (1 comprimé de 300 mg ou 4 comprimés de 75 mg) pour débuter le traitement. Puis, la dose recommandée est de un comprimé de 75 mg par jour, comme décrit ci-dessus.

Plavix aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Ne prenez pas de Plavix que vous n'auriez dû.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1

Ain sebaâ Casablanca

Plavix 75 mg cp pel b 28

P.P.V : 316,00 DH

116001 081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

081257

1



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TAHOR[®] 40 mg
Atorvastatine Calcium

TAHOR[®] 80 mg
Atorvastatine Calcium

Laboratoires
Pfizer S.A.

TAHOR 80MG 28 CPs
P.P.V. : 208DH00



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que TAHOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TAHOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TAHOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TAHOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
1. **QU'EST-CE QUE TAHOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

TAHOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (grasses).

TAHOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, TAHOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAHOR, comprimé pelliculé ?

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et TAHOR, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de TAHOR ou l'effet de ces médicaments peut aussi être modifié en cas d'association avec TAHOR. Ces interactions peuvent diminuer l'efficacité de l'un des médicaments ou des deux. Dans d'autres cas, cette interaction pourrait augmenter le risque de survenue ou la sévérité d'effets indésirables, y compris une dégradation importante des muscles appelée rhabdomyolyse, décrits à la rubrique 4 :

- des médicaments utilisés pour modifier le fonctionnement du système immunitaire, tels que la ciclosporine,
- certains médicaments antibiotiques ou antifongiques, tels que l'érythromycine, la clarithromycine, la tétracycline, le kétoconazole, l'itraconazole, le voriconazole, le fluconazole, le posaconazole, la rifampicine, l'acide fusidique,
- d'autres médicaments utilisés pour réguler les taux de lipides, tels que le gemfibrozil, d'autres fibrates ou le colestipol,
- certains inhibiteurs calciques utilisés en cas d'angine de poitrine ou d'hypertension artérielle, tels que l'amlodipine, le diltiazem ; ou des médicaments utilisés pour contrôler le rythme cardiaque, tels que la digoxine, le vérapamil ou l'amiodarone,
- des médicaments utilisés pour le traitement de l'infection au VIH, tels que le ritonavir, le lopinavir, l'atazanavir, l'indinavir, le darunavir, l'association tipranavir/ritonavir, etc,
- certains médicaments utilisés pour le traitement de l'hépatite C, tels que le télaprévir, le bocoprévir et l'association élastavir/grazoprévir,
- d'autres médicaments connus pour interagir avec TAHOR tels que l'éthinilbe (qui diminue le cholestérol), la warfarine (qui diminue la coagulation sanguine), les contraceptifs oraux, le streptokin (un anticoagulant utilisé pour le traitement de l'épilepsie), la crémidine (utilisée pour les brûlures d'estomac et les ulcères d'estomac), la phénylazine (un antidouleur), la colchicine (utilisée pour le traitement de la goutte) et les antacides (contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisés pour soulager les problèmes d'estomac).

• des médicaments utilisés pour soulager les problèmes d'estomac.



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TAHOR[®] 40 mg
Atorvastatine Calcium

TAHOR[®] 80 mg
Atorvastatine Calcium

Laboratoires
Pfizer S.A.

TAHOR 80MG 28 CPs
P.P.V. : 208DH00



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que TAHOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TAHOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TAHOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TAHOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
1. **QU'EST-CE QUE TAHOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

TAHOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (grasses).

TAHOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, TAHOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAHOR, comprimé pelliculé ?

Enfants
Sans objet.

Autres médicaments et TAHOR, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de TAHOR ou l'effet de ces médicaments peut aussi être modifié en cas d'association avec TAHOR. Ces interactions peuvent diminuer l'efficacité de l'un des médicaments ou des deux. Dans d'autres cas, cette interaction pourrait augmenter le risque de survenue ou la sévérité d'effets indésirables, y compris une dégradation importante des muscles appelée rhabdomyolyse, décrits à la rubrique 4 :

- des médicaments utilisés pour modifier le fonctionnement du système immunitaire, tels que la ciclosporine,
- certains médicaments antibiotiques ou antifongiques, tels que l'érythromycine, la clarithromycine, la tétracycline, le kétoconazole, l'itraconazole, le voriconazole, le fluconazole, le posaconazole, la rifampicine, l'acide fusidique,
- d'autres médicaments utilisés pour réguler les taux de lipides, tels que le gemfibrozil, d'autres fibrates ou le colestipol,
- certains inhibiteurs calciques utilisés en cas d'angine de poitrine ou d'hypertension artérielle, tels que l'amlodipine, le diltiazem ; ou des médicaments utilisés pour contrôler le rythme cardiaque, tels que la digoxine, le verapamil ou l'amiodarone,
- des médicaments utilisés pour le traitement de l'infection au VIH, tels que le ritonavir, le lopinavir, l'atazanavir, l'indinavir, le darunavir, l'association tipranavir/ritonavir, etc,
- certains médicaments utilisés pour le traitement de l'hépatite C, tels que le télaprévir, le bocoprévir et l'association élastavir/grazoprévir,
- d'autres médicaments connus pour interagir avec TAHOR tels que l'éthinilbe (qui diminue le cholestérol), la warfarine (qui diminue la coagulation sanguine), les contraceptifs oraux, le streptol (un anticoagulant utilisé pour le traitement de l'épilepsie), la crémidine (utilisée pour les brûlures d'estomac et les ulcères d'estomac), la phénazone (un antidouleur), la colchicine (utilisée pour le traitement de la goutte) et les antacides (contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisés pour soulager les problèmes d'estomac).

• des médicaments utilisés pour soulager les problèmes d'estomac.



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

TAHOR[®] 40 mg
Atorvastatine Calcium

TAHOR[®] 80 mg
Atorvastatine Calcium

Laboratoires
Pfizer S.A.

TAHOR 80MG 28 CPs
P.P.V. : 208DH00



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que TAHOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TAHOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TAHOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TAHOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.
1. **QU'EST-CE QUE TAHOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

TAHOR appartient à un groupe de médicaments appelés statines, qui interviennent dans la régulation des lipides (grasses).

TAHOR est utilisé pour diminuer le taux sanguin des lipides appelés cholestérol et triglycérides lorsqu'un régime pauvre en graisses associé à des modifications du mode de vie ne sont pas suffisants. Si vous présentez des facteurs de risque de survenue de maladie du cœur, TAHOR peut également être utilisé pour réduire ce risque même si votre taux de cholestérol est normal. Vous devez continuer à poursuivre un régime alimentaire standard pauvre en cholestérol pendant toute la durée du traitement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TAHOR, comprimé pelliculé ?

Enfants

Sans objet.

Autres médicaments et TAHOR, comprimé pelliculé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent modifier l'effet de TAHOR ou l'effet de ces médicaments peut aussi être modifié en cas d'association avec TAHOR. Ces interactions peuvent diminuer l'efficacité de l'un des médicaments ou des deux. Dans d'autres cas, cette interaction pourrait augmenter le risque de survenue ou la sévérité d'effets indésirables, y compris une dégradation importante des muscles appelée rhabdomyolyse, décrits à la rubrique 4 :

- des médicaments utilisés pour modifier le fonctionnement du système immunitaire, tels que la ciclosporine,
- certains médicaments antibiotiques ou antifongiques, tels que l'érythromycine, la clarithromycine, la tétracycline, le kétoconazole, l'itraconazole, le voriconazole, le fluconazole, le posaconazole, la rifampicine, l'acide fusidique,
- d'autres médicaments utilisés pour réguler les taux de lipides, tels que le gemfibrozil, d'autres fibrates ou le colestipol,
- certains inhibiteurs calciques utilisés en cas d'angine de poitrine ou d'hypertension artérielle, tels que l'amlodipine, le diltiazem ; ou des médicaments utilisés pour contrôler le rythme cardiaque, tels que la digoxine, le vérapamil ou l'amiodarone,
- des médicaments utilisés pour le traitement de l'infection au VIH, tels que le ritonavir, le lopinavir, l'atazanavir, l'indinavir, le darunavir, l'association tipranavir/ritonavir, etc,
- certains médicaments utilisés pour le traitement de l'hépatite C, tels que le télaprévir, le bocoprévir et l'association élastavir/grazoprévir,
- d'autres médicaments connus pour interagir avec TAHOR tels que l'éthinilbe (qui diminue le cholestérol), la warfarine (qui diminue la coagulation sanguine), les contraceptifs oraux, le streptokin (un anticoagulant utilisé pour le traitement de l'épilepsie), la crémidine (utilisée pour les brûlures d'estomac et les ulcères d'estomac), la phénazone (un antidouleur), la colchicine (utilisée pour le traitement de la goutte) et les antacides (contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisés pour soulager les problèmes d'estomac).

• des médicaments utilisés pour soulager les problèmes d'estomac.

بيبرول بوليميديك 2.5 و 5 ملغ

أقراص مغلقة قابلة للكسر

عليه 30

بيزويرولول

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات

يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات

الصيدلاني الذي صرفها لك.

إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.

لا تقاطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تكرر صرفا الدواء بدون وصفة طبية.

احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

التركيبة النوعية و الكمية:

المادة الفعالة:

بيزويرولول.....2.5 ملغ في كل قرص

.....5 ملغ في كل قرص

باقي المكونات.....كمية كافية لقرص واحد.

مجموعة من الأدوية تسمى كابتات بيتا

دواعي الاستعمال

كابتات بيتا تعمل عن طريق تعديل استجابة الجسم لبعض نبضات

العصب، وخاصة في القلب بيزويرولول ينظم معدل ضربات القلب

ويسمح للقلب لضخ أكثر كفاءة لدم في جميع أنحاء الجسم.

يحدث قصور القلب عندما تكون عضلة القلب ضعيفة وغير قادرة على

ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

وتستخدم أقراص بيزيرول بوليميديك المغلفة لعلاج المرضى الذين يعانون

من قصور القلب المزمن و المستقر. يستخدم هذا المنتج في تركيبة مع

الأدوية الأخرى (مثل منبهات آيس، مدرات البول، وجليكوسيدات القلب).

موانع الاستعمال

• إذا كانت لديك حساسية من بيزويرولول أو إلى أي من المكونات الأخرى

لهذا الدواء،

• الربو،

• إذا كان لديك اضطرابات في الدورة الدموية في الأطراف (مثل متلازمة

رينود) التي يمكن أن تسبب وخز في الأصابع أو أصابع القدم أو زرقة،

• إذا كان لديك ورم غير معالج في الغدة الكظرية(يسمى ورم القواتم)

• إذا كنت تعاني من الحماض الأيضي، أي وجود حمض زائد في الدم.

• لا تأخذ أقراص بيزيرول بوليميديك إذا كان لديك أي من المشاكل التالية في

القلب:

• قصور القلب الحاد

• تفاقم مشكل فشل القلب و الذي يتطلب الحقن الوريدي للأدوية التي تساعد

على قوة انقباض و تقلص القلب

إذا كنت تعاني من:

• إذا كنت تعاني من:

• إذا كنت تعاني من:

• إذا كنت تعاني من:

عند الراحلة الذبحة الصدرية)

• المشاكل الكلوية أو الكبدية،

• اضطرابات أقل حدة في الدورة الدموية الطرفية،

• مشاكل تنفسية مزمنة أو ربو أقل حدة،

• تاريخ مرض الجلد الحشيشية (الصدفية)

• ورم الغدة الكظرية (ورم القواتم)

• اضطرابات الغدة الدرقية.

أيضا، أخبر طبيبك إذا كان لديك:

• علاج الحساسية (على سبيل المثال في الوقاية من الزكام التحسسي) لأن

بيبرول بوليميديك قد يزيد من خطر حدوث رد فعل تحسسي أو يزيد

من شدة هذه التفاعلات،

• التخدير في حالة الخضوع لعملية جراحية)، لأن بيزيرول بوليميديك

يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية استجابة جسمك

• إذا كان لديك مرض رئوي مزمن أو ربو أقل حدة، يجب عليك إخبار

طبيبك فورا إذا بدأت تعاني من صعوبات في التنفس الجديدة، والسعال،

والتنفس بعد التمرين، وما إلى ذلك حين تأخذ بيزيرول بوليميديك

الأطفال و المراهقين

• لا ينصح بيزيرول بوليميديك في الأطفال أو المراهقين.

التفاعلات الدوائية

بعض العقاقير المستخدمة لعلاج عدم انتظام أو غير طبيعي ضربات القلب

(ديسوبراميد، بروكيتين، فينيتوين، فيليكينيد، بروفيغون)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية أو

عدم انتظام ضربات القلب (فيرايباميل و ديلتيازيم) حاصرات قنوات

الكالسيوم)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم من نوع الكولينيدين،

مينيلوبا، موسكوبين، ريلمينيد. ومع ذلك، لا تقطع هذه العلاجات دون

استشارة الطبيب أولاً

استشر طبيبك قبل تناول الأدوية التالية في نفس الوقت الذي تستخدم

فيه أقراص بيزيرول بوليميديك المغلفة؛ قد يجد طبيبك أنه من الضروري

التحقق من حالتك بشكل متكرر؛

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية

(الكالسيوم حاصرات قناة من ديهيدروبيريدين، أموديبين ونوع فيلوديبين)؛

• أدوية معينة تستخدم لمعالجة المخاض أو إيقاع القلب غير الطبيعي (نوع

الأمبودارون من النوع الثالث مضاد عدم انتظام ضربات القلب).

• حاصرات بيتا المطبقة محليا (مثل تيمولول قطرة العين لعلاج

الجلوكوما)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج لمرض الزهايمر مثلا أو لعلاج

الجلوكوما (أو بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل حادة في القلب

(الودي من نوع إيزوبرينالين و الدوبوتامين)؛

• مضادات السكري، بما في ذلك الأنسولين.

• التخدير (أثناء العمليات الجراحية، على سبيل المثال)

• غليكوزيد قلبي، وتستخدم لعلاج قصور القلب

• العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات) تستخدم لعلاج التهاب المفاصل،

أو ألم التهاب (مثل إيبوبروفين أو ديكلوفيناك)؛

• أي دواء يمكن أن يخفض ضغط الدم، ما إذا كان التأثير المطلوب أو غير

مرغوب فيها مثل انخفاض ضغط الدم، وبعض أدوية ضد الاكتئاب

(مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل إيميبرامين أو أميتريبتيلين)،

وبعض الأدوية المستخدمة في علاج الصرع أو الموظفين أثناء التخدير

(الباربيتورات مثل الفينوباربيتال)، أو بعض الأدوية ضد مرض عثلي

يتميز فقدان الاتصال مع الواقع (مثل الفينوثيازين ليفوميمبرومارين)؛

• مغنوليك، يستخدم للوقاية من الملاريا أو علاجها؛

• علاجات الاكتئاب تسمى مثبطات لوسكسيزيد مونوامين (باستثناء ماي B)

مثل موكلوبيميدي.

الحمل والرضاعة

قد تكون ضارة علي الجنين. أخبري طبيبك إذا كنت حاملا أو لديك خطر

للحمل أثناء المعالجة

ومن غير المعروف ما إذا كان الدواء يمر في حليب الثدي أو إذا كان يمكن

أن تضر ترضيع طفلك

لا تستخدم هذا الدواء دون إبلاغ طبيبك إذا كانت الرضاعة طبيعية

30 90

حذر

بيروول بوليميديك 2.5 و 5 ملغ

أقراص مغلقة قابلة للكسر

عليه 30

بيزويرولول

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات
يعرضك للخطر.

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات
الصيدلاني الذي صرفها لك.

إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.

لا تقاطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تكرر صرفا الدواء بدون وصفة طبية.

احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

التركيبة النوعية و الكمية:

المادة الفعالة:

بيزويرولول.....2.5 ملغ في كل قرص

.....5 ملغ في كل قرص

باقي المكونات.....كمية كافية لقرص واحد.

مجموعة من الأدوية تسمى كابتات بيتا

دواعي الاستعمال

كابتات بيتا تعمل عن طريق تعديل استجابة الجسم لبعض نبضات
العصب، وخاصة في القلب بيزويرولول ينظم معدل ضربات القلب

ويسمح للقلب لضخ أكثر كفاءة لدم في جميع أنحاء الجسم.
يحدث قصور القلب عندما تكون عضلة القلب ضعيفة وغير قادرة على

ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.
وتستخدم أقراص بيزيرول بوليميديك المغلفة لعلاج المرضى الذين يعانون

من قصور القلب المزمن و المستقر. ويستخدم هذا المنتج مع
الأدوية الأخرى (مثل منبهات آيس، مدرات البول، وجليكوسيدات القلب).

موانع الاستعمال

• إذا كانت لديك حساسية من بيزويرولول أو إلى أي من المكونات الأخرى
لهذا الدواء،

• الربو،

• إذا كان لديك اضطرابات في الدورة الدموية في الأطراف (مثل متلازمة
رينود) التي يمكن أن تسبب وخز في الأصابع أو أصابع القدم أو زرق،

• إذا كان لديك ورم غير معالج في الغدة الكظرية(يسمى ورم القواتم)
• إذا كنت تعاني من الحماض الأيضي، أي وجود حمض زائد في الدم.

• لا تأخذ أقراص بيزيرول بوليميديك إذا كان لديك أي من المشاكل التالية في
القلب:

• قصور القلب الحاد

• تفاقم مشكل فشل القلب و الذي يتطلب الحقن الوريدي للأدوية التي تساعد
على قوة انقباض و تقلص القلب

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات، يجب عليك تجنب استخدام
هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات، يجب عليك تجنب استخدام
هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات، يجب عليك تجنب استخدام
هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات، يجب عليك تجنب استخدام
هذا الدواء.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الحالات، يجب عليك تجنب استخدام
هذا الدواء.

عند الراحلة الذبحة الصدرية)

• المشاكل الكلوية أو الكبدية،

• اضطرابات أقل حدة في الدورة الدموية الطرفية،

• مشاكل تنفسية مزمنة أو ربو أقل حدة،

• تاريخ مرض الجلد الحشيشي (الصدفية)

• ورم الغدة الكظرية (ورم القواتم)

• اضطرابات الغدة الدرقية.

أيضا، أخبر طبيبك إذا كان لديك:

• علاج الحساسية (على سبيل المثال في الوقاية من الزكام التحسسي) لأن

بيروول بوليميديك قد يزيد من خطر حدوث رد فعل تحسسي أو يزيد

من شدة هذه التفاعلات،

• التخدير في حالة الخضوع لعملية جراحية)، لأن بيزيرول بوليميديك

يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية استجابة جسمك

• إذا كان لديك مرض رئوي مزمن أو ربو أقل حدة، يجب عليك إخبار

طبيبك فورا إذا بدأت تعاني من صعوبات في التنفس الجديدة، والسعال،

والتنفس بعد التمرين، وما إلى ذلك حين تأخذ بيزيرول بوليميديك

الأطفال و المراهقين

• لا ينصح بيزيرول بوليميديك في الأطفال أو المراهقين.

التفاعلات الدوائية

بعض العقاقير المستخدمة لعلاج عدم انتظام أو غير طبيعي ضربات القلب

(ديسوبراميد، بروكيتين، فينيتوين، فيليكينيد، بروفيغون)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية أو

عدم انتظام ضربات القلب (فيرايميل و ديلتيازيم) حاصرات قنوات

الكالسيوم)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم من نوع الكولينيدين،

مينيلوبا، موسكوبين، ريلمينيد. ومع ذلك، لا تقطع هذه العلاجات دون

استشارة الطبيب أولاً

استشر طبيبك قبل تناول الأدوية التالية في نفس الوقت الذي تستخدم

فيه أقراص بيزيرول بوليميديك المغلفة؛ قد يجد طبيبك أنه من الضروري

التحقق من حالتك بشكل متكرر؛

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية

(الكالسيوم حاصرات قناة من ديهيدروبيريدين، أموديبين ونوع فيلوديبين)؛

• أدوية معينة تستخدم لمعالجة المخاض أو إيقاع القلب غير الطبيعي (نوع

الأميودارون من النوع الثالث مضاد عدم انتظام ضربات القلب).

• حاصرات بيتا المطبقة محليا (مثل تيمولول قطرة العين لعلاج

الجلوكوما)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج لمرض الزهايمر مثلا أو لعلاج

الجلوكوما (أو بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل حادة في القلب

(الودي من نوع إيزوبرينالين و الدوبوتامين)؛

• مضادات السكري، بما في ذلك الأنسولين.

• التخدير (أثناء العمليات الجراحية، على سبيل المثال)

• غليكوزيد قلبي، وتستخدم لعلاج قصور القلب

• العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات) تستخدم لعلاج التهاب المفاصل،

أو ألم التهاب (مثل إيبوبروفين أو ديكلوفيناك)؛

• أي دواء يمكن أن يخفض ضغط الدم، ما إذا كان التأثير المطلوب أو غير

مرغوب فيها مثل خفض ضغط الدم، وبعض أدوية ضد الاكتئاب

(مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل إيميبرامين أو أميتريبتيلين)،

وبعض الأدوية المستخدمة في علاج الصرع أو الموظفين أثناء التخدير

(الباربيتورات مثل الفينوباربيتال)، أو بعض الأدوية ضد مرض عثلي

يتميز فقدان الاتصال مع الواقع (مثل الفينوثيازين ليفوميمبرومارين)؛

• مغنوليك، يستخدم للوقاية من الملاريا أو علاجها؛

• علاجات الاكتئاب تسمى مثبطات لوسكسيزيد مونوامين (باستثناء ماي B)

مثل موكوبيميد.

الحمل والرضاعة

قد تكون ضارة علي الجنين. أخبري طبيبك إذا كنت حاملا أو لديك خطر

للحمل أثناء المعالجة

ومن غير المعروف ما إذا كان الدواء يمر في حليب الثدي أو إذا كان يمكن

أن تضر ترضيع طفلك

لا تستخدم هذا الدواء دون إبلاغ طبيبك إذا كانت الرضاعة طبيعية

لا تستخدم هذا الدواء دون إبلاغ طبيبك إذا كانت الرضاعة طبيعية

30 90

حذر

بيبرول بوليميديك 2.5 و 5 ملغ

أقراص مغلقة قابلة للكسر

عليه 30

بيزويرولول

الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات

يعرضك للخطر

اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

إن الطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره.

لا تقاطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.

لا تكرر صرفا الدواء بدون وصفة طبية.

احفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال

التركيبة النوعية و الكمية:

المادة الفعالة:

بيزويرولول.....2.5 ملغ في كل قرص

.....5 ملغ في كل قرص

باقي المكونات.....كمية كافية لقرص واحد.

مجموعة من الأدوية تسمى كابتات بيتا

دواعي الاستعمال

كابتات بيتا تعمل عن طريق تعديل استجابة الجسم لبعض نبضات

العصب، وخاصة في القلب بيزويرولول يبطئ معدل ضربات القلب

ويسمح للقلب لضخ أكثر كفاءة لدم في جميع أنحاء الجسم.

يحدث قصور القلب عندما تكون عضلة القلب ضعيفة وغير قادرة على

ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

وتستخدم أقراص بيزيرول بوليميديك المغلفة لعلاج المرضى الذين يعانون

من قصور القلب المزمن و المستقر. ويستخدم هذا المنتج مع

الأدوية الأخرى (مثل منبهات آيس، مدرات البول، وجليكوسيدات القلب).

موانع الاستعمال

• إذا كانت لديك حساسية من بيزويرولول أو إلى أي من المكونات الأخرى

لهذا الدواء،

• الربو،

• إذا كان لديك اضطرابات في الدورة الدموية في الأطراف (مثل متلازمة

رينود) التي يمكن أن تسبب وخز في الأصابع أو أصابع القدم أو زرقة،

• إذا كان لديك ورم غير معالج في الغدة الكظرية(يسمى ورم القواتم)

• إذا كنت تعاني من الحماض الأيضي، أي وجود حمض زائد في الدم.

• لا تأخذ أقراص بيزيرول بوليميديك إذا كان لديك أي من المشاكل التالية في

القلب:

• قصور القلب الحاد

• تفاقم مشكل فشل القلب و الذي يتطلب الحقن الوريدي للأدوية التي تساعد

على قوة انقباض و تقلص القلب

إذا كنت تعاني من:

• إذا كنت تعاني من:

• إذا كنت تعاني من:

عند الراحات الذبحة الصدرية)

• المشاكل الكلوية أو الكبدية،

• اضطرابات أقل حدة في الدورة الدموية الطرفية،

• مشاكل تنفسية مزمنة أو ربو أقل حدة،

• تاريخ مرض الجلد الحشيشي (الصدفية)

• ورم الغدة الكظرية (ورم القواتم)

• اضطرابات الغدة الدرقية.

أيضا، أخبر طبيبك إذا كان لديك:

• علاج الحساسية (على سبيل المثال في الوقاية من الزكام التحسسي) لأن

بيبرول بوليميديك قد يزيد من خطر حدوث رد فعل تحسسي أو يزيد

من شدة هذه التفاعلات،

• التخدير في حالة الخضوع لعملية جراحية)، لأن بيزيرول بوليميديك

يمكن أن يكون لها تأثير على كيفية استجابة جسمك

• إذا كان لديك مرض رئوي مزمن أو ربو أقل حدة، يجب عليك إخبار

طبيبك فورا إذا بدأت تعاني من صعوبات في التنفس الجديدة، والسعال،

والتنفس بعد التمرين، وما إلى ذلك حين تأخذ بيزيرول بوليميديك

الأطفال و المراهقين

• لا ينصح بيزيرول بوليميديك في الأطفال أو المراهقين.

التفاعلات الدوائية

بعض العقاقير المستخدمة لعلاج عدم انتظام أو غير طبيعي ضربات القلب

(ديسوبيراميد، بروكائين، فينيتوين، فيليكائيد، بروفيغون)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، الذبحة الصدرية أو

عدم انتظام ضربات القلب (فيرايباميل و ديلتيازيم) حاصرات قنوات

الكالسيوم)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم من نوع الكولينيدين،

مينيلوبا، موسكوبين، ريلمينيد. ومع ذلك، لا تقطع هذه العلاجات دون

استشارة الطبيب أولاً

استشر طبيبك قبل تناول الأدوية التالية في نفس الوقت الذي تستخدم

فيه أقراص بيزيرول بوليميديك المغلفة؛ قد يجد طبيبك أنه من الضروري

التحقق من حالتك بشكل متكرر؛

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو الذبحة الصدرية

(الكالسيوم حاصرات قناة من ديهيدروبيريدين، أموديبين ونوع فيلوديبين)؛

• أدوية معينة تستخدم لمعالجة المخاض أو إيقاع القلب غير الطبيعي (نوع

الأميودارون من النوع الثالث مضاد عدم انتظام ضربات القلب).

• حاصرات بيتا المطبقة محليا (مثل تيمولول قطرة العين لعلاج

الجلوكوما)

• بعض الأدوية المستخدمة لعلاج لمرض الزهايمر مثلا أو لعلاج

الجلوكوما (أو بعض الأدوية المستخدمة لعلاج مشاكل حادة في القلب

(الودي من نوع إيزوبرينالين و الدوبوتامين)؛

• مضادات السكري، بما في ذلك الأنسولين.

• التخدير (أثناء العمليات الجراحية، على سبيل المثال)

• غليكوزيد قلبي، وتستخدم لعلاج قصور القلب

• العقاقير المضادة للالتهابات (المسكنات) تستخدم لعلاج التهاب المفاصل،

أو ألم التهاب (مثل إيبوبروفين أو ديكلوفيناك)؛

• أي دواء يمكن أن يخفض ضغط الدم، ما إذا كان التأثير المطلوب أو غير

مرغوب فيها مثل انخفاض ضغط الدم، وبعض أدوية ضد الاكتئاب

(مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مثل إيميبرامين أو أميتريبتيلين)،

وبعض الأدوية المستخدمة في علاج الصرع أو الموظفين أثناء التخدير

(الباربيتورات مثل الفينوباربيتال)، أو بعض الأدوية ضد مرض عثلي

يتميز فقدان الاتصال مع الواقع (مثل الفينوثيازين ليفوميمبرومارين)؛

• مغشوشين، يستخدم للوقاية من الملاريا أو علاجها؛

• علاجات الاكتئاب تسمى مثبطات لوسكسيزيد مونوامين (باستثناء ماي B)

مثل موكلوبيميدي.

الحمل والرضاعة

قد تكون ضارة علي الجنين. أخبري طبيبك إذا كنت حاملا أو لديك خطر

للحمل أثناء المعالجة

ومن غير المعروف ما إذا كان الدواء يمر في حليب الثدي أو إذا كان يمكن

أن تضر ترضيع طفلك

لا تستخدم هذا الدواء دون إبلاغ طبيبك إذا كانت الرضاعة طبيعية

39 90

حذر

بیراندوهریل / ارجینین / املودیپین

بیراندو بریل / ارجینین / املودیپین

بیراندو سربیل ارجینین / املودیپین

بیراندوهریل / املودیپین

اقرأ بدقّة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لتستند إليها من جديد .
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني .
 - لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً . فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق به الضرر .
 - إذا شعرتم بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني . هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المملية بها في هذه النشرة .
- (أنظر إلى مقطع 4 : ماهر) الجانية المحتملة (٤)»

في هذه النشرة :

1. ما هو كويرام ، حبة في آية حالة يُستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كويرام ، حبة؟
3. كيف يُؤخذ كويرام ، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كويرام ، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية
1. ما هو كويرام ، حبة في آية حالة يُستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كويرام ، حبة؟
3. كيف يُؤخذ كويرام ، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كويرام ، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

إن كانت تلك أساسية من مبادئه ونواياها، فإن صفات أكثر لسلطات الجمعية العامة الاقتصادية (IEC) من أولادها، وأنهم لا يوافقون على أن "حمايتهم الاقتصادية، أو أي نوع آخر من أية منظمة اقتصادية" لن ينعزل في كثير من الدمار، (المرجع للجمعية العامة الاقتصادية، وعلويان، إضافة) إن كانت تلك صفة من صفات تلك المنظمة، فإنهم لا يوافقون على أن "حمايتهم الاقتصادية، أو أي نوع آخر من أية منظمة اقتصادية" لن ينعزل في كثير من الدمار، (المرجع للجمعية العامة الاقتصادية، وعلويان، إضافة) إن كانت تلك صفة من صفات تلك المنظمة، فإنهم لا يوافقون على أن "حمايتهم الاقتصادية، أو أي نوع آخر من أية منظمة اقتصادية" لن ينعزل في كثير من الدمار، (المرجع للجمعية العامة الاقتصادية، وعلويان، إضافة)

أو كنت تشكو من نضج الصمام الأبهري (تضيق أبهرى) أو من القصور القلبي (الحالة التي يمحور فيها القلب من مع ضخ الدم الكافية في تدفق الدم إلى الجسم)
أو كنت تشكو من انخفاض شديد في الضغط (انخفاض ضغط دم منخفض).
أو كنت تعاني من فشل قلبي أو موانئ صمامية أخرى.
أو كنت تشكو من خضاضة خاصة أو إلذباك طريقة أخرى لتضيق الدم. قد يكون كوربام غير مناسب لك
وتستأصل إلى المستشفى.

مذيرات واحتياطات
مستشر مع طبيبك، مع الصيدلاني أو مع المعرض (ة) قبل أخذ كوفيد، حبة إن كانت إحدى
الحالات التالية تابعة لوضعك الراهن:
إن كنت تشكو من إعتلال تضخمي للقلب، عضلة للقلب، أو تضيق في الشريان

فصور قلبی .
ارتفاع شدید فی
ان کنت نشکو
ان کنت نشکو
ان کنت نشکو

روني في دعك

٥٤٩

ليوتاسيوم في الدم شيء أساسي

إذا كنت تستأول أيا من الأدوية التالية
خط الدم المرتفع :

- حاصرات مستقبلات الأفيون
- مثل فالسارتان ، نلبيسارتان ، إريسا

عادة سوف يتحرك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حبة قبل حدوث الحمل أو بمجرد وقوعه حيث سيصف لك دواء آخر بديلاً عنه .
لا ينبغي أخذ كوفيرام حبة في بداية الحمل ، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل .

الإرضاع
لقد ثبت أن الأمولوديين يفرز في حليب الأم بكميات ضئيلة .
أعلمي طبيبكِ أن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع .
لا يوصى بإعطاء كوفيدام حبة للأمهات المرضعات ، ويمكن لطبيبكِ أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت
تفضلين الإرضاع خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابقاً لأوانه .

إلى سائقي السيارات والعاملين على الآليات :
قد يؤثر كوفيرام حبة على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآليات . إذا كانت الأقراص تسبب لك الشعور بالدوخة أو الضعف أو التعب ، أو تسبب لك الصداع ، فيجب أن تتجنب القيادة أو تشغيل الآليات وأن تتصل بطبيبك على الفور .

يحتوي كوفيرام حبة ، على سكر الحليب
إذا كان طبيبك قد سبق وأعلمك بأنك مصاب بعدم تحمل بعض أنواع السكر ، فانصل بالطبيب
قبل المباشرة بتناول هذا الدواء .

3. كيف يؤخذ كوفيد 19 ، حبة ؟
يجب التقيد بالتام بالجرعة التي وصفها لك طبيبك . فإن شككت بأي أمر ، عليك بمراجعة الطبيب أو الصيدلاني .
تأخذ الحبة مع كأس من الماء ، ويستحسن أخذها في الوقت ذاته أي كل يوم في الصباح قبل وجبة الإفطار .

إن طبيبك هو الذي يقرر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك. الجرعة العادية عبارة عن حبة واحدة في اليوم.

يوسف كوفيرام حبة عادة للمتدوين بواسطة البيراندوبريل والأموديين بحبات منفصلة . استعماله لدى الأطفال والمراهقين . لا ينصح يوسف كوفيرام حبة للأطفال والمراهقين .

فإن حدث هذا، يمكن مكافحته بتعميد المريض مع رفع الساقين للأعلى.

في حال سهوت عن تناول كوفيد، حبة :
من الهام جدا أخذ الدواء يوميا بصورة منتظمة كي يعطي أفضل مفعوله. فإن سهوت عن أخذ جرعة
كوفيد، حبة، عليك بأخذ الجرعة التالية في اليوم التالي وفي وقتها المحدد. ولا يجوز على الإطلاق
مضاعفة الجرعة تعويضا عن السهو.

في حال التوقف عن أخذ كوفيد-19، حبة :
نظراً لأن العلاج بواسطة كوفيد-19 حبة يستمر طيلة الحياة، لذا يجب أن تستشير طبيبك قبل التوقف عن تناول هذا الدواء .
إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء ، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني أو العرض (6).

4. ماهي الآثار الجانيّة المحتملة؟

كما هو الحال مع كل دواء، كما هي الحال مع كافة الأدوية، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، رغم أنها لا تصيب كافة الأشخاص.

هذا الدواء ، وأن تتصل بطبيبك على الفور :
 وشعر ، مفاجئ بالأذن أو ألم في الصدر أو غثّة الصدر أو صعوبة التنفس .

- انتفاخ الجفون، الوجه والشفتين،
- انتفاخ اللسان والحلق. يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التنفس،

• تفاعلات جلدية شديدة تتضمن اندفاعات جلدية كثيفة ، طلع واحمرار الجلد المنتشر في جميع أنحاء الجسم ، حكة شديدة وتشكل نفاطات ، وتقشر الجلد وتورمه ، التهاب الأغشية المخاطية

(متلازمة ستيفنس جونسون ، انحلال البشرة السام) أو غير ذلك من التفاعلات التحسسية ،
• دوخة شديدة أو إغماء ،

- نوبة قلبية ، ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة بشكل غير اعتيادي ، ألم في الصدر
- التهاب البنكرياس الذي قد يؤدي إلى آلام شديدة في البطن والظهر مع شعور بالإعياء الشديد .

تم الإبلاغ عن حدوث التأثيرات الجانبية الشائعة التالية. إذا كان أي منها قد سبب لك مشكلة أو استمر لمدة تتجاوز الأسبوع الواحد، فيجب أن تتصل بطبيبك.

• تأثيرات جذ شائعة الحלות (قد يصيب أكثر من مريض من أصل 10) ولوعة (احتباس الماء).
• تأثيرات شائعة الحלות (قد يصيب حتى 1 من 10 مريض): صداع، دوخة، غثاس (وخاصة عند بدء العلاج)، دوار، شعور بالخبط أو التلعثم في الأطراف تشوش الرؤية (بما فيها الرؤية المضاعفة)،

طنين (سماع ضجيج في الأذنين)، خفقان (الإحساس بضربات القلب)، الإحساس بالخونة في الوجه، دوخة تابعة لانخفاض الضغط الشرياني، سعال، ضيق النفس، غثان، قمر، ألم باطن،

إضطرابات في الذوق؛ عسر هضم، اضطرابات معوية، إسهال، إمساك، تفاعلات حساسية (مثل الطفح الجلدي، أو الحكة)، تشنجات عضلية، إرهاق، ضعف، تورم الكاحلين (وذمة محيطية).

بیراندوهریل ارجینین / املودیپین

بیراندو بریل / ارجینین / املودیپین

بیراندو سربیل ارجینین / املودیپین

بیراندوهریل / املودیپین

اقرأ بدقّة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لتستند إليها من جديد .
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني .
 - لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً . فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق به الضرر .
 - إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني . هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المألوفة بها في هذه النشرة .
- (أنظر إلى مقطع 4 : ماهر) الجانبية المحتملة (؟)

في هذه النشرة :

1. ما هو كويرام ، حبة في آية حالة يُستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كويرام ، حبة؟
3. كيف يُؤخذ كويرام ، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كويرام ، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية
1. ما هو كويرام ، حبة في آية حالة يُستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كويرام ، حبة؟
3. كيف يُؤخذ كويرام ، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كويرام ، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

إن كانت تلك أساسية من مبادئ الديمقراطية، فإن صفات أكثر لسلطات الجمعية العامة
والتي هي (IEC) من أولادها. إن حاضرات أكثر الأيدي، أو من أية مادة
التي هي تعذر في كثير من الدماء (المرجع للجمعية العامة والمعلومات الإضافية)
إن كانت حائل في ذلك، فإن (أكثر من الأصل حتى الآن) هي، في أول الحمل (أما
في معظم الحالات والإضافات)
إن سبق وحصلت كل أمانة كالصغير في التفتيش والفرص أو في اللسان، كذلك شديدة
في كل جلد. قد بلغ من الدماء، بالإضافة لتفتيش عديم الجدوى (IEC)، إن كانت تلك
ألا من (الأساءة)، الدماء، قد سبق وحصلت في أوضاع الجسد (أولاد) متلائمة.
إن كانت معيابة، بل الكبرى، أو تشكو من داء كلوي وتنتقل علانياً خلفاً لعضد قدم يحتوي
الألوك - (Laiskinn)

أو كنت تشكو من نضيق الصمام الأبهري (نضيق أبهرى) أو من القصور القلبي (الحالة التي يمحور فيها القلب من مع ضخ الدم الكافية في تدفق الدم إلى الجسم)
أو كنت تشكو من انخفاض شديد في الضغط الشرياني (ضغط دم منخفض)
أو كنت تعاني من فشل قلبي مولي الاصطناعية بروتينية قلبك
أو كنت تشكو من خضاضة الصمام إلى الدبابك طريقة أخرى لتضيق الدم. قد يكون كيروام غير مناسب لك
تستعملون على الدبابك المستعملة
أو كنت تشكو من اضطرابات كلوية مع انخفاض تدفق الدم إلى الكلي (نضيق في الشريان الكلوي)
أو كنت تعاني حاليًا من الفشلان، وقد يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى مقطع غيريات وإحسانات، والأدوية الأخرى وكيروام).

مذيرات واحتياطات
مستشر مع طبيبك، مع الصيدلاني أو مع المعرض (ة) قبل أخذ كوفيد، حبة إن كانت إحدى
الحالات التالية تابعة لوضعك الراهن:
إن كنت تشكو من إعتلال تضخمي للقلب، عضلة للقلب، أو تضيق في الشريان

فصور قلبی .
ارتفاع شدیدی
ان کنت نشکو
ان کنت نشکو
ان کنت نشکو

روني في دعك

٥٤٩

ليوتاسيوم في الدم شيء أساسي

إذا كنت تستأول أيا من الأدوية التالية
خط الدم المرتفع :

- حاصرات مستقبلات الأفيون
- مثل فالسارتان ، نلبيسارتان ، إريسا

عادة سوف يتحرك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حبة قبل حدوث الحمل أو بمجرد وقوعه حيث سيصف لك دواء آخر بديلاً عنه .
لا ينبغي أخذ كوفيرام حبة في بداية الحمل ، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل .

الإرضاع
لقد ثبت أن الأمولوديين يفرز في حليب الأم بكميات ضئيلة .
أعلمي طبيبكِ أن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع .
لا يوصى بإعطاء كوفيدام حبة للأمهات المرضعات ، ويمكن لطبيبكِ أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت
تفضلين الإرضاع خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابقاً لأوانه .

إلى سائقي السيارات والعاملين على الآليات :
قد يؤثر كوفيرام حبة على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآليات . إذا كانت الأقراص تسبب لك الشعور بالدوخة أو الضعف أو التعب ، أو تسبب لك الصداع ، فيجب أن تتجنب القيادة أو تشغيل الآليات وأن تتصل بطبيبك على الفور .

يحتوي كوفيرام حبة ، على سكر الحليب
إذا كان طبيبك قد سبق وأعلمك بأنك مصاب بعدم تحمل بعض أنواع السكر ، فانصل بالطبيب
قبل المباشرة بتناول هذا الدواء .

3. كيف يؤخذ كوفيد 19 ، حبة ؟
يجب التقيد بالجرعة التي وصفها لك طبيبك . فإن شككت بأي أمر ، عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلاني .
تأخذ الحبة مع كأس من الماء ، ويستحسن أخذها في الوقت ذاته أي كل يوم في الصباح قبل وجبة الإفطار .

إن طبيبك هو الذي يقرر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك. الجرعة العادية عبارة عن حبة واحدة في اليوم.

يوسف كوفيرام حبة عادة للمتدوين بواسطة البيراندوبريل والأموديين بحبات منفصلة .
استعماله لدى الأطفال والمراهقين
لا ينصح يوسف كوفيرام حبة للأطفال والمراهقين .

في حال أخذت كوفيد-19، جبة أكثر من اللازم:
إن طرأ وأخذت حبات متعددة، أفضل فوراً بإيقاف منشغلي الطوارئ، أو بطبيبك الخاص.
فأكثر ما يُحتمل وقوعه في حال الإفراط بالجرعة هو هبوط الضغط الشرياني، تنتج عنه أعراض دوخة
وتغول. فإن حدث هذا، يمكن مكافحته بتعميد المريض مع رفع الساقين للأعلى.

في حال سهوت عن تناول كوفيد، حبة :
من الهام جدا أخذ الدواء يوميا بصورة منتظمة كي يعطي أفضل مفعوله. فإن سهوت عن أخذ جرعة
كوفيد، حبة، عليك بأخذ الجرعة التالية في اليوم التالي وفي وقتها المحدد. ولا يجوز على الإطلاق
مضاعفة الجرعة تعويضا عن السهو.

في حال التوقف عن أخذ كوفيد-19، حبة :
نظراً لأن العلاج بواسطة كوفيد-19 حبة يستمر طيلة الحياة، لذا يجب أن تستشير طبيبك قبل التوقف عن تناول هذا الدواء .
إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء ، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني أو العرض (6).

4. ماهي الآثار الجانيّة المحتملة؟

كما هو الحال مع كل دواء، كما هي الحال مع كافة الأدوية، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، رغم أنها لا تصيب كافة الأشخاص.

هذا الدواء ، وأن تتصل بطبيبك على الفور :
 وشعر ، مفاجئ بالأذن أو ألم في الصدر أو غثّة الصدر أو صعوبة التنفس .

- انتفاخ الجفون، الوجه والشفتين،
- انتفاخ اللسان والحلق. يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التنفس،

• تفاعلات جلدية شديدة تتضمن اندفاعات جلدية كثيفة ، طلع واحمرار الجلد المنتشر في جميع أنحاء الجسم ، حكة شديدة وتشكل نفاطات ، وتقشر الجلد وتورمه ، التهاب الأغشية المخاطية

(متلازمة ستيفنس جونسون ، انحلال البشرة السام) أو غير ذلك من التفاعلات التحسسية ،
• دوخة شديدة أو إغماء ،

- نوبة قلبية ، ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة بشكل غير اعتيادي ، ألم في الصدر
- التهاب البنكرياس الذي قد يؤدي إلى آلام شديدة في البطن والظهر مع شعور بالإعياء الشديد .

تم الإبلاغ عن حدوث التأثيرات الجانبية الشائعة التالية. إذا كان أي منها قد سبب لك مشكلة أو استمر لمدة تتجاوز الأسبوع الواحد، فيجب أن تتصل بطبيبك.

• تأثيرات جذ شائعة الحלות (قد يصيب أكثر من مريض من أصل 10) ولوعة (احتباس الماء).
• تأثيرات شائعة الحלות (قد يصيب حتى 1 من 10 مرضى): صداع، دوخة، غثاس (وخاصة عند بدء العلاج)، دوار، شعور بالخبط أو التلعثم في الأطراف تشوش الرؤية (بما فيها الرؤية المضاعفة)،

طنين (سماع ضجيج في الأذنين)، خفقان (الإحساس بضربات القلب)، الإحساس بالخونة في الوجه، دوخة تابعة لانخفاض الضغط الشرياني، سعال، ضيق النفس، غثان، قمر، ألم باطن،

إضطرابات في التذوق؛ عسر هضم، اضطرابات معوية، إسهال، إمساك، تفاعلات حساسية (مثل الطفح الجلدي، أو الحكة)، تشنجات عضلية، إرهاق، ضعف، تورم الكاحلين (وذمة محيطية).

بیراندوهریل ارجینین / املودیپین

بیراندوهریل ارجینین / املودیپین

بیراندو بریل / ارجینین / املودیپین

بیراندو بریل / ارجینین / املودیپین

بیراندو سربیل ارجینین / املودیپین

بیراندو سربیل ارجینین / املودیپین

بیراندوهریل / ارجینین / املودیپین

بیراندوهریل / ارجینین / املودیپین

اقرأ بدقّة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء . لأنها تحتوي على معلومات هامة لك .

- إحتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لتستند إليها من جديد .
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى اسأل الطبيب أو الصيدلاني .
 - لقد وُصف هذا الدواء لك شخصياً . فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر ، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة ، فقد تلحق به الضرر .
 - إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني . هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المألوفة بها في هذه النشرة .
- (أنظر إلى مقطع 4 : ماهر) الجانية المحتملة(«؟)

في هذه النشرة :

1. ما هو كويرام ، حبة في آية حالة يُستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كويرام ، حبة؟
3. كيف يُؤخذ كويرام ، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كويرام ، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية
1. ما هو كويرام ، حبة في آية حالة يُستعمل؟
2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ كويرام ، حبة؟
3. كيف يُؤخذ كويرام ، حبة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ كويرام ، حبة؟
6. محتوى العبوة ومعلومات إضافية

[illegible]

أو كنت تشكو من نضيق الصمام الأبهري (نضيق أبهرى) أو من القصور القلبي (الحالة التي يمحور فيها القلب من مع ضخ الدم الكافية في تدفق الدم إلى الجسم)
أو كنت تشكو من انخفاض شديد في الضغط الشرياني (ضغط دم منخفض)
أو كنت تعاني من فشل قلبي مولي الاصطناعية بروتينية قلبك
أو كنت تشكو من خضابا قصصية الدم إلى الدبلك طريقة أخرى لتصفية الدم قد يكون كيروام غير مناسب لك
تستعملون على الدوام في المستشفى
أو كنت تشكو من اضطرابا كلية مع انخفاض تدفق الدم إلى الكلي (نضيق في الشريان الكلوي)
أو كنت تعاني حاثيا من قصور كل من الكليتان، أو قد يستعمل لعلاج قصور القلب (انظر إلى مقطع عنغريات وحاصيات، والأدوية الأخرى وكيروام).

مذيرات واحتياطات
مستشر مع طبيبك، مع الصيدلاني أو مع المعرض (ة) قبل أخذ كوفيد، حبة إن كانت إحدى
الحالات التالية تابعة لوضعك الراهن:
إن كنت تشكو من إعتلال تضخمي للقلب، عضلة للقلب، أو تضيق في الشريان

فصور قلبی .
ارتفاع شدیدی
ان کنت نشکو
ان کنت نشکو
ان کنت نشکو

روني في دعك

٥٤٩

ليوتاسيوم في الدم شيء أساسي

إذا كنت تستأول أيا من الأدوية التالية
خط الدم المرتفع :

- حاصرات مستقبلات الأفيون
- مثل فالسارتان ، نلبيسارتان ، إريسا

عادة سوف يتحرك طبيبك بالتوقف عن أخذ كوفيرام حبة قبل حدوث الحمل أو بمجرد وقوعه حيث سيصف لك دواء آخر بديلاً عنه .
لا ينبغي أخذ كوفيرام حبة في بداية الحمل ، كما أنه قد يؤدي إلى إصابات وخيمة للجنين عند استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل .

الإرضاع
لقد ثبت أن الأمولوديين يفرز في حليب الأم بكميات ضئيلة .
أعلمي طبيبكِ أن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع .
لا يوصى بإعطاء كوفيدام حبة للأمهات المرضعات ، ويمكن لطبيبكِ أن يختار لك علاجاً آخر إذا كنت
تفضلين الإرضاع خاصة إذا كان طفلك حديث الولادة أو سابقاً لأوانه .

إلى سائقي السيارات والعاملين على الآليات :
قد يؤثر كوفيرام حبة على قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل الآليات . إذا كانت الأقراص تسبب لك الشعور بالدوخة أو الضعف أو التعب ، أو تسبب لك الصداع ، فيجب أن تتجنب القيادة أو تشغيل الآليات وأن تتصل بطبيبك على الفور .

يحتوي كوفيرام حبة ، على سكر الحليب
إذا كان طبيبك قد سبق وأعلمك بأنك مصاب بعدم تحمل بعض أنواع السكر ، فانصل بالطبيب
قبل المباشرة بتناول هذا الدواء .

3. كيف يؤخذ كوفيد 19 ، حبة ؟
يجب التقيد بالتام بالجرعة التي وصفها لك طبيبك . فإن شككت بأي أمر ، عليك بمراجعة الطبيب أو الصيدلاني .
تأخذ الحبة مع كأس من الماء ، ويستحسن أخذها في الوقت ذاته أي كل يوم في الصباح قبل وجبة الإفطار .

إن طبيبك هو الذي يقرر مقدار الجرعة المناسبة لوضعك. الجرعة العادية عبارة عن حبة واحدة في اليوم.

يوسف كوفيرام حبة عادة للمتدوين بواسطة البيراندوبريل والأموديين بحبات منفصلة . استعماله لدى الأطفال والمراهقين . لا ينصح يوسف كوفيرام حبة للأطفال والمراهقين .

فإن حدث هذا، يمكن مكافحته بتعميد المريض مع رفع الساقين للأعلى.

في حال سهوت عن تناول كوفيد، حبة :
من الهام جدا أخذ الدواء يوميا بصورة منتظمة كي يعطي أفضل مفعوله. فإن سهوت عن أخذ جرعة
كوفيد، حبة، عليك بأخذ الجرعة التالية في اليوم التالي وفي وقتها المحدد. ولا يجوز على الإطلاق
مضاعفة الجرعة تعويضا عن السهو.

في حال التوقف عن أخذ كوفيد-19، حبة :
نظراً لأن العلاج بواسطة كوفيد-19 حبة يستمر طيلة الحياة، لذا يجب أن تستشير طبيبك قبل التوقف عن تناول هذا الدواء .
إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية تتعلق باستعمال هذا الدواء ، فالرجاء طلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو الصيدلاني أو العرض (6).

4. ماهي الآثار الجانيّة المحتملة؟

كما هو الحال مع كل دواء، كما هي الحال مع كافة الأدوية، من الممكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، رغم أنها لا تصيب كافة الأشخاص.

هذا الدواء ، وأن تتصل بطبيبك على الفور :
 وشعر ، مفاجئ بالأذن أو ألم في الصدر أو غثّة الصدر أو صعوبة التنفس .

- انتفاخ الجفون، الوجه والشفتين،
- انتفاخ اللسان والحلق. يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التنفس،

• تفاعلات جلدية شديدة تتضمن اندفاعات جلدية كثيفة ، طلع واحمرار الجلد المنتشر في جميع أنحاء الجسم ، حكة شديدة وتشكل نفاطات ، وتقشر الجلد وتورمه ، التهاب الأغشية المخاطية

(متلازمة ستيفنس جونسون ، انحلال البشرة السام) أو غير ذلك من التفاعلات التحسسية ،
• دوخة شديدة أو إغماء ،

- نوبة قلبية ، ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة بشكل غير اعتيادي ، ألم في الصدر
- التهاب البنكرياس الذي قد يؤدي إلى آلام شديدة في البطن والظهر مع شعور بالإعياء الشديد .

تم الإبلاغ عن حدوث التأثيرات الجانبية الشائعة التالية. إذا كان أي منها قد سبب لك مشكلة أو استمر لمدة تتجاوز الأسبوع الواحد، فيجب أن تتصل بطبيبك.

• تأثيرات جذ شائعة الحלות (قد يصيب أكثر من مريض من أصل 10) ولوعة (احتباس الماء).
• تأثيرات شائعة الحלות (قد يصيب حتى 1 من 10 مرضى): صداع، دوخة، غثاس (وخاصة عند بدء العلاج)، دوار، شعور بالخبط أو التلعثم في الأطراف تشوش الرؤية (بما فيها الرؤية المضاعفة)،

طنين (سماع ضجيج في الأذنين)، خفقان (الإحساس بضربات القلب)، الإحساس بالخونة في الوجه، دوخة تابعة لانخفاض الضغط الشرياني، سعال، ضيق النفس، غثان، قمر، ألم باطن،

إضطرابات في التذوق؛ عسر هضم، اضطرابات معوية، إسهال، إمساك، تفاعلات حساسية (مثل الطفح الجلدي، أو الحكة)، تشنجات عضلية، إرهاق، ضعف، تورم الكاحلين (وذمة محيطية).

LANPROL® 30 mg

Lansoprazole

**COMPOSITION :**

Chaque gélule contient :
 Lansoprazole (D.C.I.) 30 mg.
 Excipients : Micro granules neutres, Amidon de maïs,
 Carbonate de magnésium léger, Saccharose, Talc, Polyvinyl
 Pyrrolidone, polysorbate 80, Hydroxypropylméthylcellulose,
 Eudragit L 100 55, Dioxyde de titane, PEG 6000, Dioxyde de
 silice Colloïdale, Hydroxyde de sodium,
 Eau purifiée. q.s.p. 1 gélule.

FORMES ET PRESENTATIONS :

LANPROL®, Gélules dosées à 30 mg, boîte de 7,14 et 28 gélules.

PROPRIETES :

LANPROL® est un Antiulcéreux : Inhibiteur de la pompe à protons, il diminue la sécrétion acide quelle que soit la nature de la stimulation.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

LANPROL® est indiqué dans les cas suivants :

- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcéreuse symptomatique par reflux gastro-œsophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

LANPROL® est administré par voie orale.
 Maladie ulcéreuse gastro-duodénale :
 - Soit 1 gélule matin et soir associée à deux antibiotiques, pendant 7 jours, suivis par 1 gélule par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.
 - Soit 1 gélule par jour pendant 4 à 6 semaines.
 Oesophagite :
 - 1 gélule par jour pendant 4 semaines.
 Syndrome de Zollinger-Ellison :
 • La posologie initiale recommandée est de 60mg de lansoprazole une fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. Pour les posologies supérieures à 120mg par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 prises.
 DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

CONTRE INDICATIONS :

LANPROL® est contre-indiqué dans le cas d'allergie au lansoprazole.
 En l'absence de données, l'usage de ce médicament n'est pas recommandé au cours de la grossesse et de l'allaitement.
 EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE

VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :
 • En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase.
 Précautions d'emploi :
 • Insuffisance hépatique : ne pas dépasser 30 mg par jour.
 • Utiliser ce médicament avec précaution en cas d'insuffisance hépatique et chez l'enfant.
 EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN TRAITANT OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

A prendre en compte :
 - Kétoconazole, Itraconazole,
 - Clopidogrel : la prise concomitante de LANPROL® et d'une spécialité à base de clopidogrel doit être évitée. Les patients présentant des ulcères gastriques et des brûlures d'estomac doivent consulter leur médecin pour leur conseiller la solution thérapeutique adéquate.
 AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATI- QUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tout produit actif, LANPROL® peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, constipation, céphalées.
 IL EST CONSEILLE DE MENTIONNER TOUT EFFET INDESIRABLE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, contacter le Centre de Toxicologie du Maroc (05 37 68 64 64).

CONS

A con

l'abri d

Ne pas

Liste I

Août





وصفة طبية
Ordonnance

14/06/2021

Casablanca, le :

Mr ouaziz Mustapha

①

44.00

BIAFINE

1 application / jour

PHARMACIE OUM AL KHALIFA
Dr. Imane TAOULI
Wifaq 4, Rue 109 N° 46 Ouf
Casablanca - Tél: 022 93 73 88
Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa
Dr. SABRY Mohamed
Cardio Interventionnelle
101100211