

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Educations :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



ME 8722

89156A

Déclaration de Maladie : N° S19-0000288

☒ **Maladie** ☐ **Dentaire** ☐ **Optique** ☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8722 Société : Royal Air Maroc
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : CHAFIK RACHID Date de naissance : 09/09/1963
Adresse :
Tél. : 06128353 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /
Nom et prénom du malade : CHAFIK Rachid Age : 58 ans
Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : Pathologie
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 11 / 10 / 2021

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11.10.21		2	3000	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien
ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

PHARMACIE HICHA
HICHA BOUHA
Distributeur Pharmacie
Av. des Pétroles
Mayajaj I'Hermine
Casablanca - Tel : 022 66 85 25

11/10/21

2139,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du
Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des
Coefficients

Montant
des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature
du Praticien

Date des
Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé
des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient



COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES


DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		G
00000000	00000000	
35533411	11433553	
	B	

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



AKDITAL

Clinique Jerrada Oasis

مصحة جرادة الوازيس

Casablanca, le

11/10/2021

Mr CHAFIK Rachid

Distribué par Roche S.A. 
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V. : 298,00 DH

6 118001 050697

Distribué par Roche S.A. 
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V. : 298,00 DH

6 118001 050697

Distribué par Roche S.A. 
Bd. Sidi Med Ben Abdellah
Ivoire 05, Casablanca Marina
MADOPAR 200/50-100 comprimés
P.P.V. : 298,00 DH

6 118001 050697

MADOPAR 250 MG

Un demi quatre fois par jour

STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg Cpr pell FI/100

Un comprimé trois fois par jour

TRIVASTAL LP 50 mg Cpr enr LP 1Plq/30

1 Comprimé 3 fois par jour

Pendant 3 mois

Professeur Hicham EL OTMANI
NEUROLOGUE - EEG / EMG
Clinique Jerrada Oasis

06 67 17 33 11
INP : 09 1032391

PHARMACIE HAY RAJA
Hicham ABOUTIKA
Docteur en Pharmacie
123 Bte, Av. des Pleiades Bte. An...
Hay Raja Pharm - Ige
Casablanca - Tel : 022 86 07

Dénomination du médicament :

Stalevo® 50/12.5/200 mg

Stalevo® 100/25/200 mg

Stalevo® 150/37.5/200 mg

Comprimé pelliculé. Boîtes de
30 Lévodopa/Carbidopa/
Entacapone

STALEVO 100/25/200 mg ○

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 285447 000453

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que Stalevo et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Stalevo ?
4. Comment <prendre> <utiliser> Stalevo ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver Stalevo ?

utilisé pendant la grossesse.
Ne pas allaiter pendant le traitement par

> <utiliser> Stalevo® ?

Chaque comprimé pelliculé de Stalevo contient une dose
équivalente à qu'un comprimé pelliculé de
vous devez pas prendre 2 comprimés
de Stalevo à la fois. Ne partagez pas les

lisez attentivement les instructions
concernant la prise de Stalevo ou d'autres

médicaments contenant de la lévodopa ou d'autres
médicaments contre la maladie de Parkinson. Ces
instructions concernent également le moment et la façon de
prendre votre médicament.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit.
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous
estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au
contraire trop forte.

N'interrompez pas le traitement par Stalevo sans avoir
auparavant longuement consulté votre médecin.

Ne prenez pas Stalevo en même temps que, ou peu de temps
avant ou après, un repas riche en protéines (par ex. riche en
viande, poisson, fromage et oeufs) car la résorption d'un des
principes actifs du Stalevo peut être entravée. Un intervalle
d'au moins 2 à 3 heures entre la prise du Stalevo et celle de
préparations à base de fer doit être respecté.

Si vous avez pris par mégarde un trop grand nombre de
comprimés pelliculés, vous devez en avertir immédiatement
votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié de prendre Stalevo, prenez-le dès que
vous aurez constaté votre oubli. Toutefois, vous ne devez pas
prendre deux comprimés pelliculés de Stalevo à la fois.

Dénomination du médicament :

Stalevo® 50/12.5/200 mg

Stalevo® 100/25/200 mg

Stalevo® 150/37.5/200 mg

Comprimé pelliculé. Boîtes de
30 Lévodopa/Carbidopa/
Entacapone

STALEVO 100/25/200 mg ○

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 285447 000453

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que Stalevo et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Stalevo ?
4. Comment <prendre> <utiliser> Stalevo ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver Stalevo ?

utilisé pendant la grossesse.
Ne pas allaiter pendant le traitement par

> <utiliser> Stalevo® ?

Chaque comprimé pelliculé de Stalevo contient une dose
équivalente à qu'un comprimé pelliculé de
vous devez pas prendre 2 comprimés
de Stalevo à la fois. Ne partagez pas les

lisez attentivement les instructions
concernant la prise de Stalevo ou d'autres

médicaments contenant de la lévodopa ou d'autres
médicaments contre la maladie de Parkinson. Ces
instructions concernent également le moment et la façon de
prendre votre médicament.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit.
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous
estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au
contraire trop forte.

N'interrompez pas le traitement par Stalevo sans avoir
auparavant longuement consulté votre médecin.

Ne prenez pas Stalevo en même temps que, ou peu de temps
avant ou après, un repas riche en protéines (par ex. riche en
viande, poisson, fromage et oeufs) car la résorption d'un des
principes actifs du Stalevo peut être entravée. Un intervalle
d'au moins 2 à 3 heures entre la prise du Stalevo et celle de
préparations à base de fer doit être respecté.

Si vous avez pris par mégarde un trop grand nombre de
comprimés pelliculés, vous devez en avertir immédiatement
votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié de prendre Stalevo, prenez-le dès que
vous aurez constaté votre oubli. Toutefois, vous ne devez pas
prendre deux comprimés pelliculés de Stalevo à la fois.

Dénomination du médicament :

Stalevo® 50/12.5/200 mg

Stalevo® 100/25/200 mg

Stalevo® 150/37.5/200 mg

Comprimé pelliculé. Boîtes de
30 Lévodopa/Carbidopa/
Entacapone

STALEVO 100/25/200 mg ○

Boîte de 30 comprimés pelliculés
PPV : 339,00 DH



6 285447 000453

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :
2. Qu'est-ce que Stalevo et dans quel cas est-il utilisé ?
3. Quelles sont les informations à connaître avant <de prendre> <d'utiliser> Stalevo ?
4. Comment <prendre> <utiliser> Stalevo ?
5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6. Comment conserver Stalevo ?

utilisé pendant la grossesse.
Ne pas allaiter pendant le traitement par

> <utiliser> Stalevo® ?

Chaque comprimé pelliculé de Stalevo contient une dose
équivalente à qu'un comprimé pelliculé de
vous devez pas prendre 2 comprimés
de Stalevo à la fois. Ne partagez pas les

lisez attentivement les instructions
concernant la prise de Stalevo ou d'autres

médicaments contenant de la lévodopa ou d'autres
médicaments contre la maladie de Parkinson. Ces
instructions concernent également le moment et la façon de
prendre votre médicament.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit.
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous
estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au
contraire trop forte.

N'interrompez pas le traitement par Stalevo sans avoir
auparavant longuement consulté votre médecin.

Ne prenez pas Stalevo en même temps que, ou peu de temps
avant ou après, un repas riche en protéines (par ex. riche en
viande, poisson, fromage et oeufs) car la résorption d'un des
principes actifs du Stalevo peut être entravée. Un intervalle
d'au moins 2 à 3 heures entre la prise du Stalevo et celle de
préparations à base de fer doit être respecté.

Si vous avez pris par mégarde un trop grand nombre de
comprimés pelliculés, vous devez en avertir immédiatement
votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez oublié de prendre Stalevo, prenez-le dès que
vous aurez constaté votre oubli. Toutefois, vous ne devez pas
prendre deux comprimés pelliculés de Stalevo à la fois.

