

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-705309

112191

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5555 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : SABER NADIA

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 0672141554 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
40, Rue des Hôpitaux, 1er Etage
Tél: 05 22 20 14 14
12 AVR. 2022

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Saber Nadia Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Cardiologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : ACCUEIL

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
12 AVR 2022	CMPC	200		INP: 091185035 Rythmologue 1er Etage Hôpital 55035

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AIDA Mme. BENNANI BENAKOUR H 125 Bd Zerkouni - Casablanca Tél: 05 22 26 32 53 Fax: 05 22 29 36 6 ICE: 0017546060005n	12/04/22	1565,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
B	
D 00000000	G 00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLORATION
CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIQUE**

Casablanca le : 12 AVR. 2022

Dr. Mohamed BENNANI

Diplômé en Cardiologie de la
Faculté de Médecine de
Casablanca

Diplômé en échocardiographie
de la faculté de Médecine de
Bordeaux, France

Diplômé en Rythmologie
et Stimulation Cardiaque
de la faculté de Médecine de
Montpellier, France

Diplômé en Cardiologie
Interventionnelle de la faculté
de Médecine de Montpellier,
France

Radio Siken

- Juli 5/80 
 15160 x 2
 267 x 1/2
 11600 x 50
 70 x 2
 3930 x 2
 Almaz 305 


Dr. AIDA BENZAKOUR Hayat
 Cardologue Interventionnelle
 Rhéumologue
 40, Rue des Hôpitaux, 10000 Casablanca
 Tél: 0522 49 14 81
 Mmc. AIDA BENZAKOUR Hayat
 Tél: 05 22 26 32 53-Fax: 05 22 29 36 61
 ICE : 001754606000050

Traitement à ne pas interrompre/et à continuer jusqu'à la prochaine visite. En cas d'urgence, partir directement à la clinique

40, Angle Rue des Hôpitaux et Rue Dubreuil, 1ère étage, Appt N° 1 – Quartier des Hôpitaux (en face du pavillon 28) – Casablanca
Tél : 0522 49 14 14 / 0522 49 22 22 – (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 – E-mail : sembennani@yahoo.fr
Sur Rendez-vous

Amlodipine

LOT: 211646 EXP: 12/23
PPV 267DH00

Suliat®

Valsartan / Amlodipine

LOT-211646 EXP-12/23
PPV-267DH00

85

افريك - فابر
AFRIC-PHAR

- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
3- Comment prendre SULIAT® ?
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5- Comment conserver SULIAT® ?
6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

(Code ATC : C07DB01)

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

— L'amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

— Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlodipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlodipine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aldolone.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (une affection dans laquelle le cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

Informations importantes

leur maladie soit
votre pharmacien.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pommeau ou du jus de pommeau.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-les dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate :

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, **prévenez immédiatement votre médecin :**

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament :

-*Fréquent* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-*Peu fréquent* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-*Rare* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'étourdissement ; bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine :

Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares :

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de graves difficultés respiratoires.

Suliat®

Valsartan / Amlodipine

LOT-211646 EXP-12/23
PPV-267DH00

85

افريك - فابر
AFRIC-PHAR

- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
3- Comment prendre SULIAT® ?
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5- Comment conserver SULIAT® ?
6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

(Code ATC : C07DB01)

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

— L'amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

— Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlodipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlodipine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aldolone.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (une affection dans laquelle le cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

Informations importantes

Si vous avez leur maladie soit votre pharmacien.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pommeau ou du jus de pommeau.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-les dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate :

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, **prévenez immédiatement votre médecin :**

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament :

-*Fréquent* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-*Peu fréquent* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-*Rare* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'étourdissement ; bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés plus fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine :

Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares :

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de graves difficultés respiratoires.

Suliat®

Valsartan / Amlodipine

LOT-211646 EXP-12/23
PPV-267DH00

85

افريك - فابر
AFRIC-PHAR

- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
3- Comment prendre SULIAT® ?
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5- Comment conserver SULIAT® ?
6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

(Code ATC : C07DB01)

Les comprimés de SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée.

— L'amlodipine appartient à la classe des « inhibiteurs calciques ».

L'amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche les vaisseaux sanguins de se rétrécir.

— Le Valsartan appartient à la classe des « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II ». L'angiotensine II est produite par le corps et elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins, avec pour conséquence une augmentation de la tension artérielle. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

Cela signifie que ces deux substances contribuent à empêcher le rétrécissement des vaisseaux sanguins. De ce fait, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT® est utilisé pour traiter la tension artérielle élevée (hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par l'amlodipine soit par le valsartan, chacun administré seul.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT®, comprimés pelliculés dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlodipine, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'aldolone.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (une affection dans laquelle le cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).

Informations importantes

leur maladie soit
votre pharmacien.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT® ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

- La dose usuelle de SULIAT® est de 1 comprimé par jour.
- Patients âgés (âgés de 65 ans et plus) : votre médecin doit prendre des précautions lorsqu'il augmente votre dose.
- Ne pas dépasser la dose prescrite.

Selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Mode et voie d'administration :

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un verre d'eau.
- Vous pouvez prendre SULIAT® au cours ou en dehors des repas. Ne le prenez pas avec du pommeau ou du jus de pommeau.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Un surdosage avec le valsartan et l'amlodipine peut provoquer une hypotension avec des sensations vertigineuses, une vasodilatation périphérique et peut être une tachycardie.

Si vous avez pris plus de SULIAT®, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT®, comprimés :

- Prenez-les dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel. Si le moment de votre prochaine prise est proche, prenez simplement le comprimé suivant au moment habituel.
- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule fois) pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage

Si vous arrêtez de prendre SULIAT®, comprimés :

- L'arrêt de votre traitement par SULIAT® peut entraîner une aggravation de votre maladie.
- N'arrêtez pas votre traitement sans avis contraire de votre médecin.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate :

Quelques patients ont présenté les effets indésirables graves suivants (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000). Si vous présentez l'un de ces effets, **prévenez immédiatement votre médecin :**

Réaction allergique avec des symptômes tels que : éruption, démangeaisons, gonflement du visage ou des lèvres ou de la langue, difficulté à respirer, tension artérielle basse (impression de s'évanouir, sensation de tête vide).

Autres effets indésirables possibles de ce médicament :

-*Fréquent* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) : grippe ; nez bouché, mal de gorge et gêne pour avaler ; maux de tête ; gonflement des bras, des mains, des jambes, des chevilles ou des pieds ; fatigue ; asthénie (faiblesse) ; rougeur et sensation de chaleur du visage et/ou du cou.

-*Peu fréquent* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) : sensations vertigineuses ; nausées et douleur abdominale ; sécheresse de la bouche ; somnolence, picotements ou engourdissement des mains ou des pieds ; vertige ; accélération des battements du cœur, y compris palpitations ; sensations vertigineuses au passage en position debout ; toux ; diarrhée ; constipation ; éruption cutanée, rougeur de la peau ; gonflement des articulations, mal de dos ; douleurs articulaires.

-*Rare* (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) : sensation d'étourdissement ; bourdonnements dans les oreilles (acouphènes) ; évanouissement ; envies d'uriner plus fréquentes que la normale ou impression de plus grande urgence à uriner ; impossibilité d'avoir ou de maintenir une érection ; sensation de lourdeur ; tension artérielle basse avec des symptômes tels que sensations vertigineuses, sensation de tête vide ; transpiration excessive ; éruption cutanée sur tout le corps ; démangeaisons ; spasmes musculaires.

Si vous présentez un de ces effets sous une forme sévère, veuillez-en informer votre médecin.

Effets indésirables rapportés avec l'amlodipine seule ou le valsartan seul et qui sont soit non observés avec l'association fixe valsartan/amlodipine soit observés fréquemment qu'avec valsartan/amlodipine :

Amlodipine

Consultez votre médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants, sévères et très rares :

- Respiration sifflante soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficultés respiratoires.
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres.
- Gonflement de la langue et de la gorge entraînant de graves difficultés respiratoires.

سوليات

80 ملغ / 5 ملغ

160 ملغ / 5 ملغ

160 ملغ / 10 ملغ

أقراص ملبسة، علب من فئة 14، 28 و 56
فالزارتان / أملوديبين

المرجو قراءة هذه النشرة بأكملها قبل بدء استعمال هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لكم
- احتفظوا بهذه النشرة. لأنكم قد تحتاجون إلى قراءتها من جديد
- توجهوا لطبيبكم أو الصيدلي لطلب أي نصيحة أو معلومة أخرى
- إن هذا الدواء قد وصف لكم خصيصاً فلا تعطوه لأي شخص آخر حتى ولو كانت تبدو عليه نفس الأعراض لأن ذلك قد يضر به.
- يجب دائماً أخذ هذا الدواء باليأس المعلومات المقدمة في هذه النشرة بدقة أو من طبيبكم أو الصيدلي
- إذا زادت حدة أحد الآثار الجانبية أو لاحظتم آثار جانبية أخرى لم تذكر في هذه النشرة أبلغوا طبيبكم أو الصيدلي بها

في هذه النشرة

- 1 ما هو سوليات، وما هي حالات استعماله؟
- 2 ماهي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال سوليات؟
- 3 كيف يستعمل سوليات؟
- 4 ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
- 5 كيف يتم حفظ سوليات؟
- 6 معلومات إضافية

1- ما هو سوليات، وما هي حالات استعماله؟

الصف الدوائي العلاجي:

رمز C09DB01 ATC

تحتوي أقراص سوليات على 2 مواد تسمى: فالزارتان و أملوديبين. تساهم هذه المواد في السيطرة على ضغط الدم عندما يكون مرتفعاً

يتمنى فالزارتان إلى الفئة العلاجية مضادات أنجيوتنسين II يتم إنتاج أنجيوتنسين II في الجسم ويسبب تضيق الأوعية الدموية. مع زيادة في ضغط الدم يعمل فالزارتان عن طريق منع تأثير أنجيوتنسين II

يتمنى أملوديبين إلى الفئة العلاجية -مضادات قنوات الكالسيوم- يمنع أملوديبين الكالسيوم من عبور جدار الأوعية الدموية، وبالتالي يمنع هذه الأوعية الدموية من التضيق. تساهم هذه المواد في منع تضيق الأوعية الدموية وبالتالي تسرخي هذه الأوعية و ينخفض ضغط الدم.

دواعي الاستعمال:

يستعمل سوليات لعلاج ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى البالغين الذين لم يتم التحكم في ضغط الدم لديهم بشكل كافٍ باستعمال الفالزارتان أو الأملوديبين كل واحد على حدى.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال سوليات؟

لأنه المعلومات الضرورية قبل استعمال الدواء:

موانع الاستعمال:

لا تستعمل سوليات في الحالات التالية.

- إذا كان لديك حساسية للفالزارتان، للأملوديبين، للدهيدروبيريدين أو لأي من المكونات الأخرى لهذا دواء إذا كنت تعتقد أن سوليات قد يتسبب لديك في حساسية، لا تأخذها و استشر طبيبك

- إذا كان لديك مشاكل حادة في الكبد أو الصفراء مثل تليف الكبد الصفراوي أو الركود صفراوي.

- إذا كنت حامل أو أكثر من 3 أشهر. رهن المستحسن أيضاً تجنب استعمال سوليات في مرحلة مبكرة من الحمل،

الوقاية: ضغط دم شديد

3- كيف يستعمل سوليات؟

تعليمات للاستعمال السليم:

يجب أخذ هذا الدواء بانتظام وتوجيهات الطبيب. في حال الشك

الجرعة، طريقة، تردد أخذ الدواء ومدة العلاج.

الطريقة وكيفية الاستعمال

- يؤخذ هذا الدواء عن طريق الفم في نفس الوقت من كل يوم.

- تتبع الأمراض بأكملها مع كوب من الماء.

- يمكنك أن تأخذ سوليات خلال أو خارج الوجبات. لا تأخذ سوليات

الجرعة، تردد أخذ الدواء ومدة العلاج.

الجرعة المعتادة من سوليات هي قرص واحد في اليوم

- لا تتجاوز الجرعة الموصوفة

- اعتماداً على طريقة استجابتك للعلاج، قد يقترح الطبيب

الأعراض والاحتياطات التي يجب القيام بها في حال أخذ

جرعة زائدة مع فالزارتان و أملوديبين يمكن أن تستبب انخفاض

النظام في دقات القلب

إذا أخذت جرعة زائدة من أقراص سوليات، أكثر مما يجب أخبر طبيبك أو الصيدلي على الفور

الاحتياطات اللازمة في حال نسيان جرعة أو أكثر

إذا نسيبت أخذ سوليات أقراص ملبسة.

إذا نسيبت أخذ جرعة، كذا حالما تتذكر ثم خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد

فم يأخذ القرص في الوقت المعتاد

- لا تأخذ جرعة مضاعفة (قرصين دفعة واحدة) لتعويض الجرعة المنسية

إذا كان لديك أسئلة حول استعمال هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي

ارشادات عند الحاجة متعلقة بخطر الإدمان

إذا توقفت عن أخذ سوليات أقراص ملبسة.

وقف العلاج بسوليات قد يتسبب في تفاقم حالتك.

- لا تتوقف عن تناول هذا الدواء إلا إذا نصح طبيبك بذلك.

4- ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، هذا الدواء يمكن أن يتسبب في آثار جانبية، على الرغم من أن الجميع غير معرض

الآثار الجانبية التالية وردت بشكل متكرر أو ذو أهمية أو بشكل حاد مع شراكة فالزارتان، أملوديبين

يمكن أن تكون بعض الآثار الجانبية خطيرة وتحتاج لإشراف طبي فوري. راجع الطبيب فوراً إذا كنت تواجه أي من

التالية، بعد تناول هذا الدواء

بعض المرضى يعانون من الآثار الجانبية الخطيرة التالية والتي قد تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من 100

أد طهرت لديك أي من هذه الآثار، أخبر طبيبك فوراً

رد فعل تحسسي مع ظهور أعراض مثل: طفح جلدي، حكة، تورم في الوجه أو الشفتين أو اللسان، صعوبة في التنفس،

ضغط الدم شعور بالإغماء، الإحساس بخفة الرأس)

الآثار الجانبية الأخرى المحتملة لهذا الدواء:

الآثار الجانبية المتكررة (التي تؤثر على أقل من شخص واحد من 10 أشخاص، النفلونزا، انسداد الأنف، التهاب الحنجرة،

آباء الألب، صداع، تورم الذراعين، آلام المفاصل، الكاحل أو القدمين، التعب، الوهن (ضعف)، احمرار وإحساس بدفء في الوجه و

أو الرقبة

الآثار الجانبية قليلة التردد (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من 100 شخص، الدوخة، الغثيان وآلام في البطن، جفاف الفم،

النعاس، وخز أو خدر اليدين أو القدمين، تسارع ضربات القلب، بما في ذلك الخفقان، الإحساس بالدوخة عند النهوض، السعال،

الإنسداد، الإمساك، طفح جلدي، احمرار في الجلد تورم المفاصل، آلام الظهر، آلام المفاصل

الآثار الجانبية النادرة (تؤثر على ما يصل إلى شخص واحد من 1000 شخص، الشعور بالقلق، زلزال في الذئبين، الرغبة

على التبول أكثر من المعتاد أو الشعور أكثر بالإحاجة للتبول، استئصال الحصول على أو الحفاظ على الانتصاب، الشعور بالتعب،

والانخفاض ضغط الدم مع أعراض مثل الدوخة، الإحساس بخفة الرأس، التعرق المفرط، طفح جلدي في جميع أنحاء الجسم، الحكة،

تشنجات العضلات

إذا كنت تعاني من أي من هذه الآثار في شكلها الحاد، يرجى إبلاغ الطبيب

الآثار الجانبية المذكورة مع الأملوديبين وحده أو فالزارتان وحدها والغرض الملاحظة مع المزيج الثابت فالزارتان / أملوديبين

الملاحظة بشكل متكرر مع فالزارتان / أملوديبين

أملوديبين

استشر طبيبك فوراً إذا كنت تعاني من أي من الآثار الجانبية التالية، والتي هي الحادة والنادرة جداً بعد تناول هذا الدواء

151,60

الوقت المعتاد إذا كان الوقت المقبل لأخذ الدواء فقط

الآثار الجانبية

الآثار الجانبية

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

شخص

LOT N°:

UT. AV.:

P.P.V.

39,30

09366132/4



1. IDENTIFICATION

a. DENOMINATION

ALDACTAZINE® 20

b. COMPOSITION QUALITATIVE

Spironolactone 25 mg
Altizide 15 mg
Excipients q.s.p. un comprimé

c. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 20.

d. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Diurétique thiazidique et diurétique épargneur potassique en association
(C: système cardiovasculaire).

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.
- Œdèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

3. ATTENTION !

a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b. MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

c. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

LOT N°:

UT. AV.:

P.P.V.

39,30

09366132/4



1. IDENTIFICATION

a. DENOMINATION

ALDACTAZINE® 20

b. COMPOSITION QUALITATIVE

Spironolactone 25 mg
Altizide 15 mg
Excipients q.s.p. un comprimé

c. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 20.

d. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Diurétique thiazidique et diurétique épargneur potassique en association
(C: système cardiovasculaire).

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est une association de deux diurétiques préconisée dans le traitement de :

- Hypertension artérielle.
- Œdèmes d'origine rénale, cardiaque et hépatique.

3. ATTENTION !

a. DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Insuffisance rénale grave ;
- Insuffisance hépatique grave ;
- Hyperkaliémie ;
- Allergie à l'un des constituants de ce médicament ;
- Association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium (sauf en cas d'hypokaliémie).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b. MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques et apparentés peuvent induire une encéphalopathie hépatique. Dans ce cas, l'administration du diurétique doit être immédiatement interrompue.

c. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dans certaines situations pathologiques comme les troubles hépatiques, le diabète, la goutte, les maladies rénales, votre médecin peut être amené à vous prescrire des examens paracliniques (prise de sang).

Compte tenu de l'effet diurétique de ce médicament, il est préférable d'éviter de reprendre la dernière prise tard dans la journée afin d'éviter d'éventuels réveils nocturnes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

d. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A

50 mg
spironolactone
الساكتون 50
سبيرونولاكتون



P.P.V: 57DH70
LOT: B26188
EXP: 06.2022

INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SPIRONOLACTONE® 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

...intégralité
de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que amiloride, canrénoate de potassium, éplérénone, triamterène ou du potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II),
- triméthoprimé et triméthoprimé-sulfaméthoxazole.

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- Une éruption cutanée.
- Une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aiguë).
- Un taux anormal de sel dans l'organisme.

Interactions avec d'autres médicaments



المالكون
الساكنون

50 mg
spironolactone

P.P.V: 57DH70
LOT: B26188
EXP: 06.2022

INFORMATION DE L'UTILISATEUR

SPIRONOLACTONE® 50 mg, 75 mg,

Spironolactone

...intégralité
de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que amiloride, canrénoate de potassium, éplérénone, triamterène ou du potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrénales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II),
- triméthoprimé et triméthoprimé-sulfaméthoxazole.

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- Une éruption cutanée.
- Une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aiguë).
- Un taux anormal de sel dans l'organisme.

Interactions avec d'autres médicaments



CABINET DE CONSULTATION ET D'EXPLOITATION
CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIQUE

12 AVR. 2022

Casablanca le :

Dr. Mohamed BENNANI

Diplômé en Cardiologie de la
Faculté de Médecine de
Casablanca

Diplômé en échocardiographie
de la faculté de Médecine de
Bordeaux, France

Diplômé en Rythmologie
et Stimulation Cardiaque
de la faculté de Médecine de
Montpellier, France

Diplômé en Cardiologie
Interventionnelle de la faculté
de Médecine de Montpellier,
France

Note D'honneur

Nachio Sika

LE DOCTEUR BENNANI MOHAMED

Vous remercie de votre confiance et

Vous adresse la note D'honneur de :

Correspondant à : - 300 -

Consultation

ECG

Réglage de pacemaker

Echocardiographie Doppler

EchoDoppler TSA

Holter TA

Holter ECG

Epreuve d'effort

Autre :

Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
40, Rue des Hôpitaux, 1er Etage
Tél: 0522 49 14 14


Traitement à ne pas interrompre et à continuer jusqu'à la prochaine visite. En cas d'urgence, partir directement à la clinique

40, Angle Rue des Hôpitaux et Rue Dubreuil, 1ère étage, Appt N° 1 - Quartier des Hôpitaux (en face du pavillon 28) - Casablanca
Tél : 0522 49 14 14 - 0522 49 22 22 - (Urgences) GSM : 06 62 80 57 57 - E-mail : smnbennani@yahoo.fr

ECG

NOM: NADIA SABER ID : Genre : Age: 57 DDN : 01-01-1965 Date Test : 12-04-2022 13:31

Case #: Investigation #: Médecin Référent: Dr Mohamed BENNANI



Fréquence : 1000 Hz	Interval.QT : 399 ms
Durée ECG : 16 s	Interval.QTc : 443 ms
FC : 74 bpm	Axe P : 13.9°
Durée P : 94 ms	Axe QRS : 26.8°
Durée QRS : 69 ms	Axe T : 49.6°
Durée T : 300 ms	RV5/SV1: 0.44/0.81mV
Interval.PQ : 139 ms	RV5+SV1: 1.25mV

Suggestion :

Docteur BENNANI Mohamed
Cardiologue Interventionnel
Rythmologue
40, Rue des Hôpitaux, 1^{er} Etage
Tél: 0522 49 14 14
Signature Médecin: