

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-770652

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0532 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : Retraité
 Nom & Prénom : WADEH Mohamed
 Date de naissance : 01.07.1941
 Adresse : Enna 1 Rue S. n° 11 Ain elok. Casa
 Tél. : 0661622979 Total des frais engagés : 1984,90 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 09/11/22
 Nom et prénom du malade : WADEH Mohamed Age :
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : ACFA
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa le : 17 NOV. 2022
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
9/11/07	CC	300	200	INP : 00113/081

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	31/01/22	1359,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE AIN CH D'ANALYSES MEDICALES FACTURATION A Tél. : 0522 215 089	21/11/22		325,00

[illegible]

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient											
				INP : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
					COEFFICIENT DES TRAVAUX									
					MONTANTS DES SOINS									
					DEBUT D'EXECUTION									
					FIN D'EXECUTION									

O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																					
	H <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">25533412</td> <td style="padding: 0 10px;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">00000000</td> <td style="padding: 0 10px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">D</td> <td style="border-top: 1px solid black; padding: 0 10px;">G</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">00000000</td> <td style="padding: 0 10px;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">35533411</td> <td style="padding: 0 10px;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"></td> <td style="padding: 0 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 10px;">B</td> <td></td> </tr> </table>	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553									B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	25533412	21433552																				
	00000000	00000000																				
	D	G																				
	00000000	00000000																				
	35533411	11433553																				
B																						
(Création, remont, adjonction) Fonctionnel. Thérapeutique. nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS																					
	DATE DU DEVIS																					
	DATE DE L'EXECUTION																					

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO VASCULAIRES

Docteur TAGMOUTI Fouad

**SPECIALISTE DES MALADIES
DU COEUR ET DES VAISSEAUX**

*Diplôme d'Etat de la Faculté de Médecine de Lyon
Membre de la société Française et Européenne de Cardiologie*

Sur Rendez-vous

الدكتور التكموتي فؤاد

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين

خريج كلية الطب بليون

عضو الجمعية الفرنسية والأوروبية لأمراض القلب

بالموعد

Casablanca, le 09 NOVEMBER 2022

MR WADEH MOHAMED

REGIME PEU SALE.

MARCHER UNE HEURE PAR JOUR

75.60g Amp. 10 Sep / 1

71.60g LODOZ 5mg 1/2 cp

138.10g 5 Prezar 100 rep a 100

31.30g 3 Zyloric 20 + 1 cp a 100

68.50g 3 Fluridex 20 rep / 1

du artère du bras 1 rep / 1

1359.90



6 118001 101153
LODOZ 5/6,25 mg,
Comprimés pelliculés B/30
PPV : 71,60 DH



6 118001 101153
LODOZ 5/6,25 mg,
Comprimés pelliculés B/30
PPV : 71,60 DH

68,90

68,90

**(TRAITEMENT DE 3MOIS NOUS
REVOIR SOUS TRAITEMENT)**

21, Avenue Lahcen Ouidder Résidence Germaine 3 - Casablanca

Tél.: C. 0522.22.20.91 / 0522.26.75.14 - Fax.: 0522.27.75.90 - Email : tagfouad@hotmail.com

Maux de tête, sensations vertigineuses (évanouissement).

Palpitations (conscience de vos battements).

Douleur abdominale, nausées.

Perturbation du transit abdominal.

Fatigue, faiblesse.

Troubles visuels, vision double.

Crampes musculaires.

Gonflement des chevilles.

D'autres effets indésirables figurant sur la liste.

Si vous ressentez l'un des effets mentionnés comme indésirables non mentionnés dans cette notice, consultez votre pharmacien.

Effets indésirables peu fréquents : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

• Changement de l'humeur, anxiété, dépression, insomnie.

• Tremblements, anomalies du goût, perte de conscience.

• Sensations d'engourdissement ou de fourmillements dans les membres, perte de la sensation de douleur.

• Tintements dans les oreilles.

• Diminution de la pression artérielle.

• Éternuements et écoulement nasal provoqués par une inflammation de la muqueuse du nez (rhinite).

• Toux.

• Bouches sèches, vomissements (nausées).

• Chutes des cheveux, augmentation de la transpiration, démangeaisons cutanées, plaques rouges sur la peau, changement de coloration de la peau.

• Difficultés pour uriner, augmentation des envies d'uriner la nuit, augmentation du nombre de mictions.

• Incapacité à obtenir une érection, gêne ou augmentation des seins chez l'homme.

• Douleur, malaise.

• Douleurs articulaires ou musculaires, douleurs dorsales.

• Augmentation ou diminution du poids.

Effets indésirables rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

• Confusion.

Effets indésirables très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000 :

• Diminution du nombre des globules blancs, diminution des plaquettes sanguines pouvant entraîner une formation anormale d'hématomes ou des saignements fréquents.

• Augmentation du sucre dans le sang (hyperglycémie).

• Troubles des nerfs entraînant une faiblesse musculaire, des fourmillements ou un engourdissement.

• Gonflement des gencives.

• Ballonnement abdominal (gastrique).

• Anomalies de la fonction hépatique, inflammation du foie (hépatite), jaunissement de la peau (ictère), élévation des enzymes hépatiques pouvant avoir un effet sur certaines analyses médicales.

• Augmentation de la tension musculaire.

• Inflammation des vaisseaux sanguins, souvent accompagnée d'une éruption cutanée.

• Sensibilité à la lumière.

• Troubles combinés de la rigidité, des tremblements et/ou trouble du mouvement.

Déclaration des effets indésirables suspects :

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.

5. Comment conserver AMEP® comprimés ?

• Pas de conditions particulières de conservation.

• Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

• Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

• Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires :

• Que contient AMEP® comprimés ?

Pour un comprimé

Principe actif :

Bétylate d'Amlodipine

Équivalent en amlodipine

10,00 5,00

Excipients : Cellulose microcristalline, Hydrogénophosphate de calcium dihydraté, Silice colloïdale anhydre, Carboxyméthyle de amidon (type A), Stéarate de magnésium.

• Liste des Excipients à effet notoire : Sans objet.

• Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc

COOPER

41, rue Mohamed Elouadi 20110 Casablanca

• La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2019

• Conditions de prescription et de délivrance

Tableau A (liste I).

Cl : 6278

AMEP® 5 mg & 10 mg Tablets

Box of 14, 28 & 56.

Amlodipine

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.

- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.

- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others.

It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.

- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects that are not listed in the leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

What is in this leaflet:

1. What AMEP® 5 & 10 mg Tablets are and what they are used for?

2. What you need to know before you take AMEP® 5 & 10 mg Tablets?

3. How to take AMEP® 5 & 10 mg Tablets?

4. What are the possible side effects?

5. How to store AMEP® 5 & 10 mg Tablets?

6. Further information

1. What AMEP® 5 & 10 mg Tablets are and what they are used for?

AMEP® contains the active substance amlodipine which belongs to a group of medicines called calcium channel blockers.

AMEP® is used to treat high blood pressure (hypertension) or a certain type of chest pain called angina, a rare form of which is Prinzmetal's angina.

In patients with high blood pressure this medicine works by relaxing blood vessels, so that blood passes through them more easily. In patients with angina, AMEP® works by improving blood supply to the heart muscle which then receives more oxygen and as a result chest pain is prevented. This medicine does not provide immediate relief of chest pain from angina.

2. What you need to know before you take AMEP® 5 & 10 mg Tablets?

Do not take AMEP® Tablet:

• If you are allergic (hypersensitive) to amlodipine or any other ingredients of this medicine listed in section "Composition", or to any other calcium channel blockers.

This may be itching, reddening of the skin or difficulty in breathing.

• If you have severe low blood pressure (hypotension).

• If you have narrowing of the aortic heart valve (aortic stenosis) or cardiogenic shock (a condition where your heart is unable to supply enough blood to the body).

• If you suffer from heart failure after a heart attack.

Pay attention with AMEP® Tablet:

Talk to your doctor or pharmacist before taking AMEP®.

You should inform your doctor if you have or have had any of the following conditions:

• Recent heart attack

• Heart failure

• Severe increase in blood pressure (Hypertensive crisis)

• Liver disease

• You are elderly and your dose needs to be increased

Children and adolescents:

AMEP® has not been studied in children under the age of 6 years. AMEP® should only be used for hypertension in children and adolescents from 6 years to 17 years of age (see section 3). For further information, talk to your doctor.

Other medicines and AMEP® Tablets:

Tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including medicines obtained without a prescription.

AMEP® may affect or be affected by other medicines, such as:

• ketoconazole, itraconazole (anti-fungal medicines),

• ritonavir, indinavir, nelfinavir (so called protease inhibitors used to treat HIV),

• rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotics),

• Hypericum perforatum (millepertuis),

• verapamil, diltiazem (heart medicines),

• dantrolene (infection for severe body temperature abnormalities),

• tacrolimus, sirolimus, temsirolimus, and everolimus (medicines used to alter the way your immune system works),

• simvastatin (cholesterol lowering medicine),

• cyclosporine (an immunosuppressant).

AMEP® may lower your blood pressure even more if you are already taking other medicines to treat your high blood pressure.

AMEP® with food and drink:

Grapefruit juice and grapefruit should not be consumed by people who are taking AMEP®. This is because grapefruit and grapefruit juice can lead to an increase in the blood levels of the active ingredient amlodipine, which can cause an unpredictable increase in the blood pressure lowering effect of AMEP®.

Pregnancy and breast-feeding:

Pregnancy:

من الإطلاع بالتدريج على هذه النشرة بأقسامها قبل تناول هذا الدواء. لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك، احتفظ بهذه النشرة في مكان إيدق فرايتها من جيبك.

إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات عليك أن تطلب الرد من المعلومات من الطبيب أو الصيدلي.

قدّر في وصف هذا الدواء لك بشكل شخصي لأنهم يماثلته لشخص آخر حتى في حال وجود أعراض من

أصبح لك الأعراض غير المرغوب فيها خطراً أو إذا لاحظت وجود أعراض غير مرغوب فيها غير

موجوب أو مع الصيدلي.

خدي هذه البشارة!
 ما هو أميب؟ 5 ملغ، 10 ملغ أقراص، ومنى يستعمل!
 ما هي العلومات التي ينبغي معرفتها قبل تناول أميب؟ 5 ملغ، 10 ملغ أقراص!
 كيفية تناول أميب؟ 5 ملغ، 10 ملغ أقراص!
 ما هي التأثيرات الغير المرغوب فيها؟
 كيف يحفظ أميب؟ 5 ملغ، 10 ملغ أقراص!
 معلومات إضافية

- هو آدم ⁵ 5 ⁶ 10 ⁷ 10 ⁸ 10 ⁹ 10 ¹⁰ 10 ¹¹ 10 ¹² 10 ¹³ 10 ¹⁴ 10 ¹⁵ 10 ¹⁶ 10 ¹⁷ 10 ¹⁸ 10 ¹⁹ 10 ²⁰ 10 ²¹ 10 ²² 10 ²³ 10 ²⁴ 10 ²⁵ 10 ²⁶ 10 ²⁷ 10 ²⁸ 10 ²⁹ 10 ³⁰ 10 ³¹ 10 ³² 10 ³³ 10 ³⁴ 10 ³⁵ 10 ³⁶ 10 ³⁷ 10 ³⁸ 10 ³⁹ 10 ⁴⁰ 10 ⁴¹ 10 ⁴² 10 ⁴³ 10 ⁴⁴ 10 ⁴⁵ 10 ⁴⁶ 10 ⁴⁷ 10 ⁴⁸ 10 ⁴⁹ 10 ⁵⁰ 10 ⁵¹ 10 ⁵² 10 ⁵³ 10 ⁵⁴ 10 ⁵⁵ 10 ⁵⁶ 10 ⁵⁷ 10 ⁵⁸ 10 ⁵⁹ 10 ⁶⁰ 10 ⁶¹ 10 ⁶² 10 ⁶³ 10 ⁶⁴ 10 ⁶⁵ 10 ⁶⁶ 10 ⁶⁷ 10 ⁶⁸ 10 ⁶⁹ 10 ⁷⁰ 10 ⁷¹ 10 ⁷² 10 ⁷³ 10 ⁷⁴ 10 ⁷⁵ 10 ⁷⁶ 10 ⁷⁷ 10 ⁷⁸ 10 ⁷⁹ 10 ⁸⁰ 10 ⁸¹ 10 ⁸² 10 ⁸³ 10 ⁸⁴ 10 ⁸⁵ 10 ⁸⁶ 10 ⁸⁷ 10 ⁸⁸ 10 ⁸⁹ 10 ⁹⁰ 10 ⁹¹ 10 ⁹² 10 ⁹³ 10 ⁹⁴ 10 ⁹⁵ 10 ⁹⁶ 10 ⁹⁷ 10 ⁹⁸ 10 ⁹⁹ 10 ¹⁰⁰ 10 ¹⁰¹ 10 ¹⁰² 10 ¹⁰³ 10 ¹⁰⁴ 10 ¹⁰⁵ 10 ¹⁰⁶ 10 ¹⁰⁷ 10 ¹⁰⁸ 10 ¹⁰⁹ 10 ¹¹⁰ 10 ¹¹¹ 10 ¹¹² 10 ¹¹³ 10 ¹¹⁴ 10 ¹¹⁵ 10 ¹¹⁶ 10 ¹¹⁷ 10 ¹¹⁸ 10 ¹¹⁹ 10 ¹²⁰ 10 ¹²¹ 10 ¹²² 10 ¹²³ 10 ¹²⁴ 10 ¹²⁵ 10 ¹²⁶ 10 ¹²⁷ 10 ¹²⁸ 10 ¹²⁹ 10 ¹³⁰ 10 ¹³¹ 10 ¹³² 10 ¹³³ 10 ¹³⁴ 10 ¹³⁵ 10 ¹³⁶ 10 ¹³⁷ 10 ¹³⁸ 10 ¹³⁹ 10 ¹⁴⁰ 10 ¹⁴¹ 10 ¹⁴² 10 ¹⁴³ 10 ¹⁴⁴ 10 ¹⁴⁵ 10 ¹⁴⁶ 10 ¹⁴⁷ 10 ¹⁴⁸ 10 ¹⁴⁹ 10 ¹⁵⁰ 10 ¹⁵¹ 10 ¹⁵² 10 ¹⁵³ 10 ¹⁵⁴ 10 ¹⁵⁵ 10 ¹⁵⁶ 10 ¹⁵⁷ 10 ¹⁵⁸ 10 ¹⁵⁹ 10 ¹⁶⁰ 10 ¹⁶¹ 10 ¹⁶² 10 ¹⁶³ 10 ¹⁶⁴ 10 ¹⁶⁵ 10 ¹⁶⁶ 10 ¹⁶⁷ 10 ¹⁶⁸ 10 ¹⁶⁹ 10 ¹⁷⁰ 10 ¹⁷¹ 10 ¹⁷² 10 ¹⁷³ 10 ¹⁷⁴ 10 ¹⁷⁵ 10 ¹⁷⁶ 10 ¹⁷⁷ 10 ¹⁷⁸ 10 ¹⁷⁹ 10 ¹⁸⁰ 10 ¹⁸¹ 10 ¹⁸² 10 ¹⁸³ 10 ¹⁸⁴ 10 ¹⁸⁵ 10 ¹⁸⁶ 10 ¹⁸⁷ 10 ¹⁸⁸ 10 ¹⁸⁹ 10 ¹⁹⁰ 10 ¹⁹¹ 10 ¹⁹² 10 ¹⁹³ 10 ¹⁹⁴ 10 ¹⁹⁵ 10 ¹⁹⁶ 10 ¹⁹⁷ 10 ¹⁹⁸ 10 ¹⁹⁹ 10 ²⁰⁰ 10 ²⁰¹ 10 ²⁰² 10 ²⁰³ 10 ²⁰⁴ 10 ²⁰⁵ 10 ²⁰⁶ 10 ²⁰⁷ 10 ²⁰⁸ 10 ²⁰⁹ 10 ²¹⁰ 10 ²¹¹ 10 ²¹² 10 ²¹³ 10 ²¹⁴ 10 ²¹⁵ 10 ²¹⁶ 10 ²¹⁷ 10 ²¹⁸ 10 ²¹⁹ 10 ²²⁰ 10 ²²¹ 10 ²²² 10 ²²³ 10 ²²⁴ 10 ²²⁵ 10 ²²⁶ 10 ²²⁷ 10 ²²⁸ 10 ²²⁹ 10 ²³⁰ 10 ²³¹ 10 ²³² 10 ²³³ 10 ²³⁴ 10 ²³⁵ 10 ²³⁶ 10 ²³⁷ 10 ²³⁸ 10 ²³⁹ 10 ²⁴⁰ 10 ²⁴¹ 10 ²⁴² 10 ²⁴³ 10 ²⁴⁴ 10 ²⁴⁵ 10 ²⁴⁶ 10 ²⁴⁷ 10 ²⁴⁸ 10 ²⁴⁹ 10 ²⁵⁰ 10 ²⁵¹ 10 ²⁵² 10 ²⁵³ 10 ²⁵⁴ 10 ²⁵⁵ 10 ²⁵⁶ 10 ²⁵⁷ 10 ²⁵⁸ 10 ²⁵⁹ 10 ²⁶⁰ 10 ²⁶¹ 10 ²⁶² 10 ²⁶³ 10 ²⁶⁴ 10 ²⁶⁵ 10 ²⁶⁶ 10 ²⁶⁷ 10 ²⁶⁸ 10 ²⁶⁹ 10 ²⁷⁰ 10 ²⁷¹ 10 ²⁷² 10 ²⁷³ 10 ²⁷⁴ 10 ²⁷⁵ 10 ²⁷⁶ 10 ²⁷⁷ 10 ²⁷⁸ 10 ²⁷⁹ 10 ²⁸⁰ 10 ²⁸¹ 10 ²⁸² 10 ²⁸³ 10 ²⁸⁴ 10 ²⁸⁵ 10 ²⁸⁶ 10 ²⁸⁷ 10 ²⁸⁸ 10 ²⁸⁹ 10 ²⁹⁰ 10 ²⁹¹ 10 ²⁹² 10 ²⁹³ 10 ²⁹⁴ 10 ²⁹⁵ 10 ²⁹⁶ 10 ²⁹⁷ 10 ²⁹⁸ 10 ²⁹⁹ 10 ³⁰⁰ 10 ³⁰¹ 10 ³⁰² 10 ³⁰³ 10 ³⁰⁴ 10 ³⁰⁵ 10 ³⁰⁶ 10 ³⁰⁷ 10 ³⁰⁸ 10 ³⁰⁹ 10 ³¹⁰ 10 ³¹¹ 10 ³¹² 10 ³¹³ 10 ³¹⁴ 10 ³¹⁵ 10 ³¹⁶ 10 ³¹⁷ 10 ³¹⁸ 10 ³¹⁹ 10 ³²⁰ 10 ³²¹ 10 ³²² 10 ³²³ 10 ³²⁴ 10 ³²⁵ 10 ³²⁶ 10 ³²⁷ 10 ³²⁸ 10 ³²⁹ 10 ³³⁰ 10 ³³¹ 10 ³³² 10 ³³³ 10 ³³⁴ 10 ³³⁵ 10 ³³⁶ 10 ³³⁷ 10 ³³⁸ 10 ³³⁹ 10 ³⁴⁰ 10 ³⁴¹ 10 ³⁴² 10 ³⁴³ 10 ³⁴⁴ 10 ³⁴⁵ 10 ³⁴⁶ 10 ³⁴⁷ 10 ³⁴⁸ 10 ³⁴⁹ 10 ³⁵⁰ 10 ³⁵¹ 10 ³⁵² 10 ³⁵³ 10 ³⁵

[illegible]

١٠- الفحوصات والفحوصات:

تم دراسة أسيب^٦ الفرائس بالنسبة للأطفال دون 6 سنوات، يجب أن لا يستعمل أسيب^٦ ففرائس إلا لعلاج ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين.

تتراوح المفاعيل من 6 و 17 سنة (انظر فقرة 3). تعتمد على المعلومات، يرجى الاتصال بطبيبكم.

١١- نوع أسيب^٦ الفرائس:

يتم التمييز بين ثلاث مجموعات أخرى: ما فيه دواء لم يحصل عليه دون وصفة طبية أخيراً؛ بذلك تطويعكم أو صيدلانيكم.

[illegible]

روان (حقله) يوصف في حالة الزيادات الحادة في درجة حرارة الجسم).
والإيبيوميس، والبيروميس، والبيروميس، والإيبيوميس (الادوية المستخدمة لتعديل الطريقة التي يعمل بها نظام المناعة).
مغاساتين (دواء لتخفيف مستويات الكوليسترول).
كلوسبون (دواء مضاد للعدوى).

[illegible]

فتستسلمة استعمال الأمولوبين لدى النساء الحوامل. إذا كنت تعقدين أنك حامل أو إذا كنت تخططين لذلك، يجب إخبار طبيبك قبل تناول
 دواء: إذا كنت الأمولوبين يفر في حليب الثدي بكميات قليلة. إذا كنت مرضع أو إذا كنت على وشك الإرضاع رضاعة طبيعية، يجب إخبار طبيبك

نول المصير
 إذا كنت تعجزين أنت حامل أو تعطيني للحمل، استشيريني طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.
 رات على القيصرية على فائدة السميرات أو استعمال الآلات :
 إذا نزل عن تناول الأقراص المانعة أو نعيم أو صناع فحجب
 المصير : أقراص على فترتك على سيالة استعمال الآلات، وتبني الالتزام بطبيبكم فوراً.

كيفية تناول امبيج[®] افراس؟

تناول الدواء قبل أو بعد استهلاك الأغذية والمشروبات. ومن الأفضل تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم مع كوب من الماء.

ولذا يجب مع عبور البمبولوس.

الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين

لدى الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة): الجرعة الأولى للعلاج اللوس بها 2,5 ملغ يومياً والجرعة القصوى للوس 5 ملغ يومياً (أي 2,5 ملغ مرتين في اليوم).

في بعض الحالات، مثل مرض السكري، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان انخفاض ضغط الدم ناتجًا عن انخفاض ضغط الدم أو عن انخفاض ضغط الدم. إذا كان انخفاض ضغط الدم ناتجًا عن انخفاض ضغط الدم، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان انخفاض ضغط الدم ناتجًا عن انخفاض ضغط الدم أو عن انخفاض ضغط الدم. إذا كان انخفاض ضغط الدم ناتجًا عن انخفاض ضغط الدم، فقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان انخفاض ضغط الدم ناتجًا عن انخفاض ضغط الدم أو عن انخفاض ضغط الدم.

الدواء فيها. لكن أن يعود المرض أن يثققت من تناول الدواء قبل أن يوصي بذلك الطبيب. أو لتقلوا لزيد من المعلومات من طبيبك أو صيدليكم.

زبور مريضه، وهو ألبا لا تحدث جميع الناس.
أية بعد تناول هذا الدواء.
تزيد أو صيدوه في النفس.

[illegible]

* ونعمة (أعني) لناؤا.
وقد لوحظت الآثار غير الربوية الشائعة التالية: إذا أصبح أي من هذه الآثار مضطربا أو إذا استمر أكثر من أسبوعٍ يجب الإتصال بطبيبكم.
الآثار غير الربوية الشائعة: يمكن أن تصبح شخص من أصل 10
• صناع الرأس الشعور بالدار النعاس (أو شيئا في بداية العلاج)
• غفان (الإحساس الغير العادي بضربات قلبكم) أحمرار حركي
•

- ألم في البطن العلوي
- اضطراب عملية مرور الأكل في البطن الإسهال الإمساك عسر الهضم
- وجع الشعب
- اضطرابات بصرية إرتجاجية الرؤية
- تشنجات العضلات

- **تبروت الكامل.**
- **الإبراهيم** من الأبرار غير مرغوبة أخرى في القائمة التالية. **إِذَا** شعرت بأحد الآثار الموصوفة بالخطيرة أو تعرضت لآثار غير مرغوبة لم تزد في هذه النشرة أممروا بذلك طبيبك أو صيدليكم أو
- **التأثير غير المرغوب المشاهدة فليلاً:** يمكن أن تعسب شخص من أصل **100**
- **تأثير مزاج الحلق الكشملة والأق:**

- زيادة اضطراب في التنفُّس فقدان الوعي
- شعور بخدر أو تنميل في الأطراف، فقدان الإحساس بالألم.
- طنين في الأذنين
- انخفاض في ضغط الدم
- غثاس، صسك، ألأف، التامع، ع. العناب، العناب، العناب، العناب (العناب ألأف)

- اجتماع القيم التثقيف (القياد)
- تصاقط الشخص زيادة التعلق الحكيم بفع حصارا على القلند تغير ليل الجند
- صعوبة التناول زيادة في الرغبة في التناول ليل التناول عدة مرات
- عدم الانتظام في غذاء الجسم في المراحل الأولى من حياته

الآثار غير المباشرة المتوقعة : يمكن أن نصنفها على حسب عدد أصل 1000

الأعراض: عدم القدرة على التفرقة بين الحار والبارد، نقصان عدد كريات الدم البيضاء، انخفاض الصفائح الدموية يمكن أن يؤدي إلى تكون كدمات غير عادية أو نزيف ممكن.

تورم اللسان
اضطراب في البطن (التهاب المعدة)
اضطراب في وظيفة الكبد. التهاب الكبد اصفرار الجلد (اليرقان). ارتفاع إنزيمات الكبد و الذي قد يؤثر على بعض التحاليل الطبية.
زيادة الضغط العضلي
التهاب الأوعية المعوية غالباً ما يكون مصحوباً بطفح جلدي.

• حساسية إزاء الضوء
• اضطرابات قمع بين التنسب، الإغناضات وأل اضطراب في الحركة.
• التخلص من التآكل غير المفيد
• من لهم الإيداع بالتأثير الجينية المشكوك فيها بعد حصول الدواء على الترخيص، إذ يساعد هذا الإيلاج على تقليل مراقبة مستمرة من حيث العلاقة بين فائدة الأدوية ومخاطرها.

5. كيف يحققون؟⁵ 5 ملغ و 10 ملغ للقرص!

- لا توجد شروط حفظ خاصة
- يترك بعيداً عن عرض ومتناول الأطفال.
- لا يستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلاحية للمون على العبوة

يحتوي على الأدوية في الحلة أو في الفلغات الزائدة استخدم كدوى الصلابة عن طريقة التخلص من الأدوية في المستشفيات

المادة الشعاعية	على ماذا يحتوي المبرق ؟	لقرص واحد	المبرق 5 ملغ	المبرق 10 ملغ
			6.25	12.50

13.90	6.95	يوسفات الأمونيوم
10.00	5.00	تبادل من الأمونيوم
الصلوات: سبيلوول ميكروكريستالين، فوسفات الهيدروجين، للكالسيوم، ثنائي الهيدرات، السيليكات الغروية اللاصقة، كازوكسيميل النشا (A نوع)، سترات المغنسيوم.		
• لائحة الصلوات معروفة التاجر.		

اسم وعنوان المؤسسة الحاملة لرخصة التسويق في المغرب:

 **COOPER**
PHARMA

41. زلفه محمد البوري 20110 الدار البيضاء
آخر تاريخ لت فيه الموافقة على هذه النشرة: يناير 2019
* شروط الوصف والتسليم
جدولاً (لance 1)
CI : 6278

PREZAR 100

Losartan

Copie

PPV 1380H 30
FEN 09/25
LOT L3213

3 comprimés de PREZAR® 50 mg
et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg
suffisent à assurer la fonction rénale
à travers le rein) et/ou un autre
médicament.

de patients particuliers
une dose plus faible, en particulier
chez les personnes âgées, ou les
patients dont la fonction rénale n'est pas recommandée.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

La substance active est :
LOSARTAN POTASSIQUE 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégelatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose type A, opadry II OY-S-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
 - Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC; médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été établie par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-ou bêta-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiques, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également déconseillé d'être enceinte avant ou pendant la grossesse).
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si votre fonction rénale n'est pas recommandée.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® et contactez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'un patient. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR®.

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Etourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques),
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression à la position assise,
- Fatigue,
- Faiblesse,
- Fausse vue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Eruption (cuticulaire),
- Démangeaisons (prurit),
- Eruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-œdème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant l'angor),
- Engourdissement ou picotements (paresthésies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élévation du taux de l'alanine aminotransférase (ALAT),
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base de données).

Diminution du nombre de plaquettes,

- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (myoglobinurie),
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement d'oreilles,
- Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR 100

Losartan

Copie

PPV 1380H 30
FEN 09/25
LOT L3213

3 comprimés de PREZAR® 50 mg
et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg
suffisent à assurer la fonction rénale
à travers le rein) et/ou un autre
médicament.

de patients particuliers
une dose plus faible, en particulier
chez les personnes âgées, ou les
patients dont la fonction rénale n'est pas recommandée.

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également déconseillé d'être enceinte avant ou pendant le traitement).
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si votre fonction rénale est altérée.

EFFETS INDESIRABLES :

- Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.
- Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® et consultez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.
- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer).
- Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'un patient.
- Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.
- Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR®.

Effets indésirables fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Étourdissements.
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte de poids ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques).
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression à la position assise.
- Faiblesse.
- Fatigue.
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie).
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale.
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie).
- Élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

Effets indésirables peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence.
- Maux de tête.
- Troubles du sommeil.
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations).
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine).
- Essoufflement (dyspnée).
- Douleurs abdominales.
- Constipation opiniâtre.
- Diarrhée.
- Nausées.
- Vomissements.
- Eruption (cuticulaire).
- Démangeaisons (prurit).
- Eruption cutanée.
- Gonflement localisé (œdème).
- Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité.
- Angio-œdème.
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant l'angite).
- Engourdissement ou picotements (paresthésies).
- Évanouissement (syncope).
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire).
- Attaque cérébrale (AVC).
- Inflammation du foie (hépatite).
- Élévation du taux de l'alanine aminotransférase (ALAT).

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- Diminution du nombre de plaquettes.
- Migraine.
- Anomalies de la fonction hépatique.
- Douleurs musculaires et articulaires.
- Syndrome pseudo-grippal.
- Douleur dorsale et infection urinaire.
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité).
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines foncées.
- Impuissance.
- Inflammation du pancréas (pancréatite).
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie).
- Dépression.
- Sensation générale de malaise.
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement d'oreilles.
- Troubles du goût (dysgueusie).

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

La substance active est :
LOSARTAN POTASSIQUE 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégelatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose type A, opadry II OY-S-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
 - Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC; médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été établie par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Car chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé).

Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiques, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

PREZAR 100

Losartan

Copie

PPV 1380H 30
FEN 09/25
LOT L3213

3 comprimés de PREZAR® 50 mg
et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg
suffisant cardiaque, le losartan est
eau à travers le rein) et/ou un di
solvant.

de patients particuliers
une dose plus faible, en particu
à doses élevées, ou l'usage
de PREZAR® n'est pas recommandé.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

La substance active est :
LOSARTAN POTASSIQUE 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégelatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose type A, opadry II OY-S-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
 - Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC; médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été établie par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-ou bêta-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiques, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également déconseillé d'être enceinte avant ou pendant la grossesse).
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'insuline.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® et contactez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'un patient. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Etourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques),
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression à la position assise,
- Fatigue,
- Faiblesse,
- Fautigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Eruption (cuticulaire),
- Démangeaisons (prurit),
- Eruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-œdème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant l'angite),
- Engourdissement ou picotements (paresthésies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élévation du taux de l'alanine aminotransférase (ALAT),
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base de données).

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement d'oreilles,
- Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR 100

Losartan

Copie

PPV 1380H 30
FEN 09/25
LOT L3213

3 comprimés de PREZAR® 50 mg
et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg
suffisant cardiaque, le losartan est
eau à travers le rein) et/ou un di
solvant.

de patients particuliers
une dose plus faible, en particu
à doses élevées, ou l'usage
de PREZAR® n'est pas recommandé.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

La substance active est :
LOSARTAN POTASSIQUE 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégelatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose type A, opadry II OY-S-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
 - Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC; médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été établie par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-ou bêtabloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiques, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'insuline.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® et contactez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'un patient. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Etourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques),
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression à la position assise,
- Fatigue,
- Faiblesse,
- Fautigue,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Eruption (urticaire),
- Démangeaisons (prurit),
- Eruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-œdème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant l'engorgement ou picotements (paresthésies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élévation du taux de l'alanine aminotransférase (ALAT),

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base de données disponibles) :

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées (myoglobinurie),
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement d'oreilles,
- Troubles du goût (dysgueusie).

PREZAR 100

Losartan

Copie

PPV 1380H 30
FEN 09/25
LOT L3213

3 comprimés de PREZAR® 50 mg
et 1 comprimé de PREZAR® 50 mg
suffisant cardiaque, le losartan est
eau à travers le rein) et/ou un di
solvant.

de patients particuliers
une dose plus faible, en particu
à doses élevées, ou l'usage
de PREZAR® n'est pas recommandé.

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION DU MÉDICAMENT :

La substance active est :
LOSARTAN POTASSIQUE 100 mg

Les autres composants sont :

Lactose monohydrate, cellulose microcristalline, amidon de maïs prégelatinisé, stéarate de magnésium, croscarmellose type A, opadry II OY-S-28908 (white) par comprimé pelliculé.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Le losartan (PREZAR®) appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. L'angiotensine est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. Le losartan ralentit la dégradation de la fonction rénale chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé est utilisé :
 - Pour traiter les adultes ayant une pression artérielle élevée (hypertension).
 - Pour préserver la fonction rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale et une protéinurie 0,5g/jour (présence d'une quantité anormale de protéines dans les urines) confirmées par des examens biologiques.
 - Pour traiter les patients insuffisants cardiaques lorsque le médecin juge qu'un traitement par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC; médicaments antihypertenseurs) ne convient pas. Si l'insuffisance cardiaque a été établie par un IEC, le traitement ne doit pas être modifié pour le losartan.
 - Chez les patients présentant une hypertension et un épaississement du ventricule gauche, PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé réduit le risque d'accident vasculaire cérébral (étude LIFE).

POSOLOGIE, MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION, DUREE DU TRAITEMENT ET FREQUENCE D'ADMINISTRATION :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute.
Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé sans l'avis de votre médecin.

Votre médecin décidera de la dose appropriée de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, afin de permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

PATIENTS ADULTES HYPERTENDUS

La dose habituelle d'initiation est de 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). L'effet sur la diminution de la pression artérielle atteint son maximum 3 à 6 semaines après le début du traitement. Chez certains patients la dose peut, plus tard, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé). Si vous avez l'impression que l'effet de PREZAR® est trop fort ou trop faible, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Enfants âgés de moins de 6 ans

PREZAR® n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans, la sécurité d'emploi et l'efficacité n'étant pas établies dans ce groupe d'âge.

Patients adultes hypertendus diabétiques de type 2

La dose habituelle d'initiation est 50 mg de losartan une fois par jour (1 comprimé de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable). La dose peut ensuite, être augmentée à 100 mg de losartan une fois par jour (2 comprimés de PREZAR® 50 mg, comprimé pelliculé sécable ou 1 comprimé de PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé) en fonction de la réponse tensionnelle.

Les comprimés de losartan peuvent être pris avec d'autres médicaments antihypertenseurs (tels que les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les alpha-ou bêta-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale) ainsi qu'avec l'insuline et les autres médicaments antidiabétiques couramment utilisés (par exemple, sulfamides hypoglycémiques, glitazones et inhibiteurs alpha glucosidases).

Patients adultes insuffisants cardiaques

La dose habituelle d'initiation est de 12,5 mg de losartan une fois par jour. Habituellement, la dose doit être augmentée par paliers chaque semaine (c'est-à-dire 12,5 mg par jour la première semaine, 25 mg par jour la deuxième semaine, 50 mg par jour la troisième semaine, 100 mg par jour la quatrième semaine, 150 mg par jour la cinquième semaine) jusqu'à la dose d'entretien établie par votre médecin. Une dose maximale de 150 mg de losartan une fois par jour peut

CONTRE-INDICATIONS :

- Ne prenez jamais PREZAR® 100 mg, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes allergique au losartan ou à l'un des autres composants.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également pelliculé en début de grossesse - voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si l'artérielle contenant de l'insuline.

EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, mais pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre PREZAR® et contactez votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche.

- Une réaction allergique sévère (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer).

Ceci est un effet secondaire grave pouvant survenir chez plus d'un patient. Vous pouvez avoir besoin d'une surveillance médicale en urgence.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés avec PREZAR® fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Etourdissements,
- Baisse de la pression artérielle (particulièrement après une perte sévère ou sous traitement par des doses élevées de diurétiques),
- Effets orthostatiques liés à la dose tels que diminution de la pression à la position assise,
- Fatigue,
- Faiblesse,
- Fausse,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie),
- Trop de potassium dans le sang (hyperkaliémie),
- Modification de la fonction rénale, y compris insuffisance rénale,
- Réduction du nombre de globules rouges dans le sang (anémie),
- Élévation de l'urée dans le sang, de la créatinine et du potassium dans le sang.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Somnolence,
- Maux de tête,
- Troubles du sommeil,
- Sensation d'accélération du rythme cardiaque (palpitations),
- Douleur dans la poitrine (angine de poitrine),
- Essoufflement (dyspnée),
- Douleurs abdominales,
- Constipation opiniâtre,
- Diarrhée,
- Nausées,
- Vomissements,
- Eruption (urticaire),
- Démangeaisons (prurit),
- Eruption cutanée,
- Gonflement localisé (œdème),
- Toux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1 000) :

- Hypersensibilité,
- Angio-œdème,
- Inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite incluant l'engorgement ou picotements (paresthésies),
- Évanouissement (syncope),
- Battements de cœur très rapides et irréguliers (fibrillation auriculaire),
- Atteinte cérébrale (AVC),
- Inflammation du foie (hépatite),
- Élévation du taux de l'alanine aminotransférase (ALAT),
- Fréquence indétectable (ne peut être estimée sur la base de données).

- Diminution du nombre de plaquettes,
- Migraine,
- Anomalies de la fonction hépatique,
- Douleurs musculaires et articulaires,
- Syndrome pseudo-grippal,
- Douleur dorsale et infection urinaire,
- Augmentation de la sensibilité au soleil (photosensibilité),
- Douleur musculaire inexplicable avec des urines foncées,
- Impuissance,
- Inflammation du pancréas (pancréatite),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Dépression,
- Sensation générale de malaise,
- Tintement, bourdonnement, grondement ou claquement d'oreilles,
- Troubles du goût (dysgueusie).

CABINET DE CARDIOLOGIE ET D'EXPLORATIONS CARDIO VASCULAIRES

Docteur F. TAGMOUTI

CARDIOLOGUE

Laureat de la Faculté de Médecine
de LYON

الدكتور فؤاد التكموتي
اختصاصي في أمراض القلب والشرابيين
خريج كلية الطب
بليون

Casablanca, le

Wafik Rahou

Au Laboratoire

SANG

- | | | | |
|--|--|---|--|
| ☒ N.F.S. - Plaquettes | ☐ V.S. | ☐ C.R.P | ☐ Ferritine |
| ☐ A.S.L.O. | ☐ Fibrinogène | ☐ Procalcitonine | |
| ☒ Urée | ☒ Créatinine - Clearance | ☒ A.Urique | |
| ☒ Glycémie | ☐ Hyperglycémie provoquée | ☐ Hémoglobine Glyquée | |
| ☐ Ionogramme | K - Na - Ca - Mg | ☐ Phosphorémie | |
| | Proteines - R.A. - CI | | |
| ☐ Cholestérol Total | ☐ H.D.L | ☐ L.D.L | ☐ Triglycérides |
| ☐ Coagulation | ☐ T.P. | ☐ I.N.R. | ☐ LIPASE |
| ☐ Transaminases | ASAT - ALAT | ☐ Gamma - G.T | ☐ T.C.K. |
| ☐ Electrophorèse des Protéines | ☐ A.F.P | ☐ Bilirubine - D | ☐ T.S |
| ☐ Sérologie Hepatite (B+C) antigène HBS + Anticorps HVC | | ☐ Bilirubine - I | ☐ P.A.L |
| ☐ Troponine | ☐ D.Dimères | ☐ A.C.E | ☐ C.A 19,9 |
| ☐ Fonction Thyroïdienne | ☐ PRO B.N.P | ☐ Anticorps HBC | ☐ Charge Virale |
| ☐ Cortisol 8h | ☐ Renine Plasmatique | ☐ CPK _{MB} | ☐ L.D.H |
| ☐ Latex Waaler Rose | ☐ Anticorps Antinucléaires | ☐ Aldostéronémie | |
| ☐ Sérologie $\Sigma \odot$: VDRL - TPHA | ☐ Cellules L.E | ☐ Anticorps Anti T.P.O | |
| ☐ P.S.A | ☐ Anticorps Anti C.C.P | ☐ V.I.H | |
| ☐ P.S.A L/T | ☐ VIT-D ₂ , D ₃ | | |

URINES

- | | |
|--|---|
| ☐ Cyto bactério - urinaire; Compte de germes; Antibiotogramme | |
| ☐ Micro Albuminurie / 24h | ☐ Compte d'Addis |
| ☐ Q. Albumine / Créatinine | |
| ☐ VMA | ☐ Aldostéronurie |
| ☐ Metanephrine | ☐ Kaliurie |

SELLES

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Parasitologie des selles | ☐ Coproculture |
|---|---------------------------------------|

LABORATOIRE AIN CHOCK
D'ANALYSES MEDICALES

FACTURATION A

Tél. : 0522 215 089

DOCTEUR F. TAGMOUTI
Tél. : 05 22 22 20 91 / 05 22 26 75 14
Casablanca

21, Avenue Lahcen Ouidder Résidence Germaine 3 - Casablanca

Tél.: C. 0522.22.20.91 / 0522.26.75.14 - FAX : 0522.27.75.90 - E-mail : tagfouad@hotmail.com



مختبر التحليلات الطبية Laboratoire d'analyses médicales

Hématologie, Bactériologie, Parasitologie, Mycologie, Virologie
Immunologie, Hormonologie, Oncologie, Spermiologie

Dr BENNIS Noor

–Diplômée de la faculté de médecine et pharmacie de Rabat

ainsi de la faculté CEU de Madrid

–Diplôme de fertilité à la faculté UIASS

–Formation en autoimmunité

Nom Prénom : Mr WADEH Mohamed

Né(e) le : 01-07-1941

Prescripteur : Dr TAGMOUTI F

Edition du : 15-11-2022

Numéro de demande : A221140059

Prélèvement à : 11-11-2022


Cher confrère, voici les analyses demandées ci-joint

résultats recto-verso

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME				
Analyse des globules rouges				
	Résultats	unités	Valeurs de référence	
Hématies :	4.89	T/L	(4.00–5.65)	
Hémoglobine :	13.1	g/dL	(12.5–17.2)	
Hématocrite :	41.3	%	(37.0–49.0)	
VGM :	84.5	fL	(80.0–101.0)	
TCMH :	26.8	pg	(27.0–34.0)	
CCMH :	31.7	g/dL	(30.0–36.0)	
RDW :	17.4	%	(0.0–18.5)	
Analyse des globules blancs				
Leucocytes :	6.52	G/L	(3.60–10.50)	
Polynucléaires	61.0	%	(50.0–70.0)	
Neutrophiles :				
Soit:	3.98	G/L	(1.50–7.70)	
Polynucléaires	5.7	%	(1.0–3.0)	
Eosinophiles :				
Soit:	0.37	G/L	(0.02–0.50)	
Polynucléaires	0.2	%	(0.0–1.0)	
Basophiles :				
Soit:	0.01	G/L	(<0.20)	
Monocytes :	8.7	%	(1.0–8.0)	
Soit:	0.57	G/L	(0.10–0.90)	
Lymphocytes :	24.4	%	(20.0–40.0)	
Soit:	1.59	G/L	(20.0–40.0)	
Analyse des plaquettes				
PLAQUETTES :	237	G/L	(160–370)	

GARDE 24h/24h : Tél : 06 90 98 76 87



173, Angle Bd Al Qods et Bd 2 Mars, Résidence BAHJA LHM I, 1^{er} étage N° 5, Casablanca

Tél/Fax : 05 22 21 50 89 - Tél Urgence : 06 98 80 73 74 / 06 90 98 76 87

E-mail : info@labo-ainchock.ma / labo_ain_chock@outlook.com

CNSS : 440661 - ICE : 001713924000036 - INPE : 097165385 - IF : 15235587

Mr WADEH Mohamed

BIOCHIMIE SANGUINE

Glycémie à jeun

0.92 g/L (0.60-1.10)
5.11 mmol/L (3.33-6.11)

Interprétation:

Glycémie entre 1.10 et 1.25 g/l: Hyperglycémie modérée à jeun

Glycémie > 1.26 g/l : Diabétique

Dans le cas de la femme enceinte le seuil normal de la glycémie est de 0.92g/l

Urée : urea

(Dosage enzymatique)

0.40 g/l (0.13-0.43)
6.64 mmol/l (2.16-7.14)

Créatinine

(Dosage enzymatique/technique standardisée)

14.0 mg/L (6.7-13.6)
123.9 µmol/L (59.3-120.4)

DFG par CKD EPI:

50 ml/mn/1.73

Acide Urique

(Dosage enzymatique)

91.50 mg/L (35.00-72.00)
0.54 mmol/L (0.21-0.42)

amed

BIOCHIMIE SANGUINE

un

0.92	g/L	(0.60-1.10)
5.11	mmol/L	(3.33-6.11)

et 1.25 g/l: Hyperglycémie modérée à jeun
Diabétique
me enceinte le seuil normal de la glycémie est de 0.92g/l

0.40	g/l	(0.13-0.43)
6.64	mmol/l	(2.16-7.14)

/technique standardisée)

EPI:

14.0	mg/L	(6.7-13.6)
123.9	μmol/L	(59.3-120.4)
50	ml/mn/1.73	

91.50	mg/L	(35.00-72.00)
0.54	mmol/L	(0.21-0.42)





Nom prénom : Mr Mohamed WADEH
Date de naissance : 01-07-1941
Prélèvement du : 11-11-2022 09:12
Référence : 2211112006
Prescripteur : Dr F TAGMOUTI

ICE : 00 17 1 39 24 00 0036



INPE : 093062529

IF : 15235587

Facture – Relevé N° : 221100129

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Total
PSA	Prélèvement sang adulte	17.00 MAD
0100	Acide urique	40.20 MAD
0216	Numération formule	107.20 MAD
	clairance de la créatinine	40.20 MAD
	Créatinine	40.20 MAD
	Glycémie à jeun	40.20 MAD
	Urée	40.20 MAD
Total		325.20 MAD

TOTAL DES B : 230

TOTAL A PAYER : 325


LABORATOIRE AIN CHOCK
D'ANALYSES MEDICALES
FACTURATION A
Tél. : 0522 215 089

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

trois cent vingt-cinq dirhams

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

10mm/mV 25mm/s



Fréquence :	1000 Hz	Intervalle PR :	143 ms
Durée Echantillon :	15 s	Intervalle QT :	477 ms
FC :	53 bpm	Intervalle QTc :	448 ms
Durée P :	124 ms	Axe P :	33.7°
Durée QRS :	124 ms	Axe QRS :	-38.1°
Durée T :	323 ms	Axe T :	-0.8°

Suggestion :

Signature Médecin:

Filtre Principal: On Filtre ADS: On