

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontologie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 3 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Aïlal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Aïlal Ben Abdellah - Quartier de l'Hayat
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-493746

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0000327 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : LAGHA KHA DDouy

Date de naissance : 01/03/2000

Adresse : 010 Hassanine 1132

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Blessure

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Bloc 16 N°62 Ville Rahma
Dar Bouazza - Casablanca

Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Bloc 16 N°62 Ville Rahma
Dar Bouazza - Casablanca


RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
28/11/22	C	15		INP: 082 MS 168 Cabinet Médical Docteur Naïmi Mohamed Bahma

Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Rue 16 N°62 Ville Rahma
Casablanca


EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	28/11/22	1526,50.

[illegible][illegible]

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
	25533412	21433552
D	00000000	00000000
	00000000	00000000
	35533411	11433553
	B	G

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur NAIMI Mohamed
Médecin Généraliste

MEDECINE
Générale
الطب العام

الدكتور نعيم محمد
طبيب عام

Casablanca, le

Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Bloc 16 N°62 Ville Rahma
Dar Bouazza - Casablanca

LOT 221049
EXP 04 2025
PPV 97.20

74,80 x 3
54,20 x 3
18,20 x 3
Enliat
KABOUJ
Rouge
N3

IXOR 20 mg
PPV 118DH50
EXP 08/2023
LOT 16048

45,80
Cur Lee

18,50
73,80
IXOR
97,20 x 3
Zouid
N3

RAACHIE NEJMA
Dent Naimi
Casablanca

IXOR 20 mg 14
PPV 73DH80
EXP 04/2024
LOT 230185

1526,50

Cabinet Médical
Docteur Naimi Mohamed
Bloc 16 N°62 Ville Rahma
Dar Bouazza - Casablanca

74,80

Curtec®
Cétirizine
10 mg



PPV: 45DH80
PER: 06/25
LOT: L2006

10 mg
comprimé

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
Antihistaminique H₁.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ce médicament est un antihistaminique. Il s'oppose aux effets de certaines substances telles que l'histamine libérées dans l'organisme au cours de l'allergie).

Il est préconisé :

Chez l'adulte pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,

- de l'urticaire,

- des conjonctivites d'origine allergique.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans pour traiter les symptômes :

- de la rhinite allergique saisonnière (ex. rhume des foins) ou perannuelle,

- de l'urticaire.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Adulte et enfant de plus de 12 ans : 10 mg par 24 heures en 1 prise, soit 1 comprimé 1 fois par jour.

Enfant de 6 à 12 ans : 10 mg par 24 heures en 1 ou 2 prises, soit 1 comprimé 1 fois par jour ou ½ comprimé 2 fois par jour.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à l'un des composants de CURTEC, à l'hydroxyzine, à la tévocétirizine ou à l'éthylène diamine,

- Insuffisance rénale,

- Chez l'enfant de moins de 6 ans.



ZANIDIP® 10 mg, comprimés pelliculés sécables

NOTICE : INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR



6 9 4 0 2 2
5 2 0 4 0
0 2 7 6
P P V
E X P
L O T

Vous devez lire attentivement le médicament car :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autres médicaments, consultez votre médecin.
- Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.
- Si vous ressentez des effets indésirables, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QU'EST-CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

ZANIDIP® 10 mg, comprimés pelliculés sécables

NOTICE : INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR



6 9 4 0 2 2
5 2 0 4 0
0 2 7 6
P P V
E X P
L O T

Vous devez lire attentivement le médicament car :

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autres médicaments, consultez votre médecin.
- Ce médicament peut provoquer des effets indésirables.
- Si vous ressentez des effets indésirables, consultez votre médecin.

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QU'EST-CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

1. QUEL EST CE QUE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

3. COMMENT PRENDRE ZANIDIP 10 mg, comprimés pelliculés sécables ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

SULIAT® HCT

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56
Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veillez lire attentivement l'notice importante pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir d'autres questions.
- Si vous avez d'autres questions, Ce médicament vous a été prescrit pour un traitement d'un trouble.
- Si l'un des effets indésirables décrits dans la notice vous inquiète, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

Code ATC : C09DX01

Le Valériane appartient à un gr...

prise d'Amidopiline, de Valsartan et substances.

Abstract

Ne prenez jamais SULIAT HCT, con

Si vous êtes allergique à l'aspirine, évitez les médicaments utilisés pour traiter les maux de tête, les douleurs musculaires et les rhumes.

Si vous êtes diabétique ou vous

Si vous pensez que vous pouvez
Si vous avez une machine de type

Si vous avez de graves problèmes

Si votre taux sanguin de potassium

Si vous souffrez de crises de goutte

Si vous présentez un rétroscène

- Si vous souffrez d'une insuffisance
- Si vous avez du diabète ou une in-

Mises en garde spéciales et précises

Si votre taux sanguin de potassium

Si votre taux sanguin de calcium

neveu saupiquard sap zane snoa is

Si vous avez des problèmes hépatiques

Si vous avez présenté une crise card

Si votre médecin vous a informé d'un

hypertrophique obstructive »].

Si vous souffrez d'une maladie ag-

Si votre taux sanguin de cholestérol

Il vous sera développé une réaction pour augmenter la quantité

Si vous avez présenté des gonfles

Si ces symptômes surviennent, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

En cas de sensations vertigineuses, rapidement possible.

say super mutants zuehnt jao adom

- Si vous prenez l'un des médicaments
- Un inhibiteur de l'enzyme de co

Alaska

• **but** **major** **sleep** **(un)restored**

Les patients qui prennent l'HCT

signaler toute lésion cutanée suspecte.

• Afin de réduire le risque de cancer :

SULIAT® HCT

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56
Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veillez lire attentivement l'notice importante pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir d'autres questions.
- Si vous avez d'autres questions, Ce médicament vous a été prescrit pour un traitement d'un trouble.
- Si l'un des effets indésirables d'un médicament ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

Code ATC : C09DX01

Le Valériane appartient à un gr...

prise d'Amidopiline, de Valsartan et substances.

Abstract

Ne prenez jamais SULIAT HCT, con

Si vous êtes allergique à l'Amiodol, ne prenez pas d'Amiodol.

Si vous êtes diabétique ou vous

Si vous pensez que vous pouvez
Si vous avez une machine de type

Si vous avez de graves problèmes de santé, consultez votre médecin.

Si votre taux sanguin de potassium

Si vous souffrez de crises de goutte

Si vous présentez un rétroscann

- Si vous souffrez d'une insuffisance
- Si vous avez du diabète ou une in

Mises en garde spéciales et précises

Si votre taux sanguin de potassium

Si votre taux sanguin de calcium

neveu saupiquard sap zane snoa is

Si vous avez des problèmes hépatiques

Si vous avez présenté une crise card

Si votre médecin vous a informé d'un

hypertrophique obstructive »].

Si vous souffrez d'une maladie ag-

- Si votre taux sanguin de cholestérol

Il vous avez développé une réaction pour augmenter la quantité

Si vous avez présenté des gonfles

Si ces symptômes surviennent, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

En cas de sensations vertigineuses, rapidement possible.

say super mutants zuehnt jao adom

- Si vous prenez l'un des médicaments
- Un inhibiteur de l'enzyme de co

Alaska

• **but** **also** **sup** **(un)happy**

Les patients qui prennent l'HCT

signaler toute lésion cutanée suspecte.

• Afin de réduire le risque de cancer.

MEGAFLOX®

250 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés

500 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés

Ciprofloxacine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que MEGAFLOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEGAFLOX® ?
- 3- Comment prendre MEGAFLOX® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver MEGAFLOX® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE MEGAFLOX® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ou type d'activité :

Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

MEGAFLOX® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Indications thérapeutiques :

Chez l'adulte

MEGAFLOX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

MEGAFLOX® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de MEGAFLOX®.

Chez l'enfant et l'adolescent

MEGAFLOX® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent sous la forme d'un comprimé pour traiter les infections bactériennes suivantes :

Il est préférable d'éviter d'utiliser MEGAFLOX® pendant la grossesse.
Ne prenez pas de MEGAFLOX® pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

MEGAFLOX® peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent survenir, en particulier des vertiges.
MEGAFLOX® avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines. En cas de doute, consultez votre médecin.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire

Sans objet.

3- COMMENT PRENDRE MEGAFLOX® ?

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de MEGAFLOX® vous devez prendre en fonction de la gravité de votre infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament doit être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection grave ou de complications.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

Prenez votre médicament à jeun, avec ou sans nourriture, mais évitez les produits laitiers et les jus de fruits riches en calcium.

MEGAFLOX®

250 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés

500 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés

Ciprofloxacine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que MEGAFLOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEGAFLOX® ?
- 3- Comment prendre MEGAFLOX® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver MEGAFLOX® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE MEGAFLOX® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ou type d'activité :

Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

MEGAFLOX® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Indications thérapeutiques :

Chez l'adulte

MEGAFLOX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

MEGAFLOX® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique supplémentaire pourra vous être prescrit en complément de MEGAFLOX®.

Chez l'enfant et l'adolescent

MEGAFLOX® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent sous la forme d'un comprimé pour traiter les infections bactériennes suivantes :

Il est préférable d'éviter d'utiliser MEGAFLOX® pendant la grossesse.
Ne prenez pas de MEGAFLOX® pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

MEGAFLOX® peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent survenir.
Evitez de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire

Sans objet.

3- COMMENT PRENDRE MEGAFLOX® ?

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de MEGAFLOX® vous devez prendre en fonction de la gravité de votre infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament doit être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection grave ou si vous avez des difficultés à avaler les comprimés.

a. Avalez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés.

b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.

c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas.

Le calcium présent dans un repas ou dans un produit laitier (par ex. : lait, yaourt, fromage, jus de lait enrichi en calcium) peut réduire l'absorption de la ciprofloxacine.

ne prenez pas les comprimés de MEGAFLOX® avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou les jus de fruit enrichis (par ex. : jus d'orange enrichi en calcium).

Parlez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des problèmes de digestion.

Prenez la dose oubliée dès que possible, puis continuez le traitement normalement.

Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée et continuez le traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Veillez à suivre votre traitement jusqu'à la fin.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous arrêtez de prendre MEGAFLOX® :

Il est important que vous suiviez le traitement jusqu'à la fin même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection pourrait ne pas être complètement guérie et les symptômes de l'infection pourraient réapparaître ou s'aggraver. Vous pourriez également développer une résistance bactérienne à cet antibiotique.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Cessez de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin si vous présentez un des effets suivants. La fréquence de ces effets peut être rare (susceptible d'affecter jusqu'à 1 personne sur 1000), très rare (susceptible d'affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) ou indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- réaction allergique, accumulation de liquide dans l'organisme due à une réaction allergique grave (œdème allergique), rapide gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer (œdème de Quincke) ;
- inflammation des intestins (colite) liée à l'utilisation d'antibiotiques (pouvant être fatale dans de très rares cas) ;
- réactions allergiques graves susceptibles de se manifester sous forme de :

MEGAFLOX®

250 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés

500 mg : Boîte de 10 comprimés pelliculés

Ciprofloxacine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que MEGAFLOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEGAFLOX® ?
- 3- Comment prendre MEGAFLOX® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver MEGAFLOX® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE MEGAFLOX® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique ou type d'activité :

Fluoroquinolone - code ATC : J01MA02.

MEGAFLOX® contient une substance active, la ciprofloxacine.

La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la famille des fluoroquinolones. Elle agit en tuant les bactéries responsables des infections. Elle est active uniquement sur certaines souches spécifiques de bactéries.

Indications thérapeutiques :

Chez l'adulte

MEGAFLOX® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des voies respiratoires.
- Infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
- Infections urinaires.
- Infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
- Infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
- Infections de la peau et des tissus mous.
- Infections des os et des articulations.
- Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Exposition à la maladie du charbon.

MEGAFLOX® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de MEGAFLOX®.

Chez l'enfant et l'adolescent

MEGAFLOX® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent sous la forme d'un comprimé pour traiter les infections bactériennes suivantes :

Il est préférable d'éviter d'utiliser MEGAFLOX® pendant la grossesse.
Ne prenez pas de MEGAFLOX® pendant l'allaitement car la ciprofloxacine passe dans le lait maternel.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

MEGAFLOX® peut abaisser votre niveau de vigilance. Des effets indésirables neurologiques peuvent survenir chez certains patients prenant MEGAFLOX® avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines. En cas de doute, ne conduisez pas.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire

Sans objet.

3- COMMENT PRENDRE MEGAFLOX® ?

Instruction pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration

Votre médecin vous expliquera précisément quelle quantité de MEGAFLOX® vous devez prendre en fonction de la gravité de votre infection et de sa sévérité.

Prévenez votre médecin si vous avez des problèmes rénaux car la dose de médicament doit être adaptée.

Le traitement dure généralement de 5 à 21 jours mais peut être plus long en cas d'infection grave ou si vous avez des difficultés à avaler les comprimés.

a. Avalez les comprimés avec une grande quantité de boisson. Ne croquez pas les comprimés.

b. Essayez de prendre les comprimés à peu près à la même heure chaque jour.

c. Vous pouvez prendre les comprimés au cours ou en dehors des repas.

Le calcium présent dans un repas ou dans un produit laitier (par ex. : lait, yaourt, fromage, jus de lait enrichi en calcium) peut réduire l'absorption de la ciprofloxacine. Ne prenez pas les comprimés de MEGAFLOX® avec des produits laitiers de type lait ou yaourt ou les jus de fruit enrichis (par ex. : jus d'orange enrichi en calcium).

Parsez à boire abondamment pendant le traitement par ce médicament.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de MEGAFLOX® que vous n'auriez dû :

Si vous avez dépassé la dose prescrite, consultez immédiatement votre médecin. Si possible, emportez les comprimés restants ou la boîte avec vous pour les montrer au médecin.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre MEGAFLOX® :

Prenez la dose oubliée dès que possible, puis continuez le traitement normalement. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée et continuez le traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Veillez à suivre votre traitement jusqu'à la fin.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Si vous arrêtez de prendre MEGAFLOX® :

Il est important que vous suiviez le traitement jusqu'à la fin même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection pourrait ne pas être complètement guérie et les symptômes de l'infection pourraient réapparaître ou s'aggraver. Vous pourriez également développer une résistance bactérienne à cet antibiotique.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Cessez de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin si vous présentez un des effets suivants. La fréquence de ces effets peut être rare (susceptible d'affecter jusqu'à 1 personne sur 1000), très rare (susceptible d'affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) ou indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :

- réaction allergique, accumulation de liquide dans l'organisme due à une réaction allergique grave (œdème allergique), rapide gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer (œdème de Quincke) ;
- inflammation des intestins (colite) liée à l'utilisation d'antibiotiques (pouvant être fatale dans de très rares cas) ;
- réactions allergiques graves susceptibles de se manifester sous forme de :