

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° P19-0032054

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2136 Société :

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : CHEWTONF ABDELHALK

Date de naissance : 1955

Adresse : TANGER

Tél. 0666282950 Total des frais engagés : 1577 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 02 / 03 / 23

Nom et prénom du malade : CHEWTONF Abdelhak Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : DM 10

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : TANGER Le : 02/03/23

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-032054

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 2136

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés : 1577

Date de dépôt :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
02/03/23		7	3000	CHAKI MOHAMED Laboratoire et Matériel Métaboliques 16 Av Prince Héritier Appt. 1 T: 05 35 93 73 84 - Tanger

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie TAJ EDDINE Rue Elchaid Benibach n° 505 Hay Elmouassat - TANGER Tél: 05 39 31 18 27 INPE: 162102628	02.03.23	21 1077.40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Laboratoire de Diagnostic MEDICALE CHELLAH Dr. Boukha El Makkoudi Chakib 14 Rue de Lafayette App. 20 Tanger INPE: 162001175	03.03.23	B140	200 DA

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				COEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B</td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	H																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B	B																
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. ZAKI Mohamed

Spécialiste en Endocrinologie
et Diabétologie

Glandes - Diabète - Cholestérol
Obésité - Stérilité - Goître

Diplôme de la Faculté de Médecine
de Montpellier

(SUR RENDEZ-VOUS)

الدكتور زكي محمد

اختصاصي في أمراض الغدد والسكري

الغدد - السكري - الكولسترول
السمنة - العقم

خريج كلية الطب بمونبليي

(بالموعد)

Tanger, le 02/03/23 طنجة في

Dr. CUENTOS F

Abdelhak

68.80 x6

0.074 4



Pharmacie TALEDDINE
Rue Echahid Bernachen n°56B
Hay Brades I - TANGER
Tél 05 39 31 18 27

21.00 x12

1.9 1.2



126.10 x6

1.9 1.2



Abdelhak

W. S. I. T

1.9 1.2

Dr. ZAKI MOHAMED
Endocrinologie et Maladies
Métaboliques
Av. Prince Héritier Appt. 1
Tél. 05 39 93 73 64 - Tanger

7.1 1077.40

PPV 21DH00
PER 03/25
LOT L1108

PPV 21DH00
PER 06/25
LOT L2112

PPV 21DH00
PER 03/25
LOT L1109

PPV 21DH00
PER 03/25
LOT L1279

LOT U037807 3
EXP 10 2023
PPV 126.10 DH

LOT 212934
EXP 11 2024
PPV 68 80

LOT221599 1
EXP 05 2025
PPV 68 80

LOT 211234
EXP 05 2024
PPV 68 80

LOT211949 1
EXP 07 2024
PPV 68 80

LOT212855 1
EXP 11 2024
PPV 68 80

LOT220526 1
EXP 02 2025
PPV 68 80



Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la nitroglycérine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale,

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.
Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison,

Vous devez faire appel à votre médecin pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'administration des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra également vous prescrire un traitement médicamenteux.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète,

crampes musculaires ou de malaises généraux avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

«ABC DIAFOC» 1000 mg comprime pellicule :

59

(e)

broncho-pulmonaire, infection urinaire),
utilisant des produits radiographiques iodés,

prée. (détailance des reins avec

à l'un des constituants du produit,

AFORMINE 1000 mg comprise pellicule,
NE PAS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

avec un autre antidiabétique oral ou l'insuline, n'est prescrit seul ou en association avec l'insuline.

un anti-diabétique oral destiné au traitement

NE

1000 mg



PPV: 21DH00
PER: 12/24
LOT: K3744

54 00'000 L



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg



Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la rifampine, du salbutamol ou de la terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Évitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Informez le médecin que vous prenez ce médicament.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, le diabète.

et terbuthaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement et l'hyperglycémie.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra glucidique au cours de la journée.

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport

PRECAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Prévenir aussitôt votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

déséquilibre grave de votre diabète.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un

avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

à l'un des constituants du produit,

broncho-pulmonaire, infection urinaire),

utilisant des produits radiographiques iodés,

à l'un des constituants du produit,

différence des reins avec

un autre antidiabétique oral ou l'insuline,

prescrit seul ou en association avec l'insuline.

AFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

NE PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

PPV : 21DH00
PER : 12/24
LOT : K3744



NE 1000 mg

1000,00 mg

Dr. ZAKI Mohamed

Spécialiste en Endocrinologie
et Diabétologie

Glandes - Diabète - Cholestérol
Obésité - Stérilité - Goitre

Diplôme de la Faculté de Médecine
de Montpellier

(SUR RENDEZ-VOUS)

الدكتور زكي محمد

اختصاصي في أمراض الغدد والسكري

الغدد - السكري - الكولسترول
السمنة - العقم

خريج كلية الطب بمونبليي

(بالموعد)

Tanger, le 02/03/2023 طنجة في

Dr. ZAKI Mohamed

Cholesterol
- HbA1c
- Inflammation

LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC
MEDICAL CHIMIE
Dr. Boukhalil El Malkoudi Chahou
14 Rue de Lafayette App. 20 Tanger
INPE : 163001175

Dr. ZAKI MOHAMED
Endocrinologie et Métabolisme
36, Av Prince Héritier
Tél: 05 39 93 73 84 - Tanger

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale "CHELLAH"

Dr Chakib BOUQLILA EL MEKKOUDI
Médecin Spécialiste en Biologie Médicale

Diplômé de l'Université René Descartes de Paris

14, Rue Lafayette, 1er étage, Apt. 20
TANGER

Tél. : 0539 94 01 07
Fax : 0539 32 29 39

CNSS : 2431063
Patente : 50435754
IF : 81476370
ICE : 001596432000032
INPE : 163001175

Tanger le 3 mars 23

Mr CHENTOUF ABDELHAK

FACTURE N°	153506
------------	--------

Analyses :

Bilan lipidique -----	B	140	Total : B 140
-----------------------	---	-----	---------------

Prélèvements :

Sang-----	Pc	2	
-----------	----	---	--

TOTAL DOSSIER	200,00 DH
---------------	-----------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cents Dirhams

LABORATOIRE DE BIOLOGIE
MEDICALE CHELLAH
Dr. Bouqlila El Mekoudi Chakib
14 Rue Lafayette Apt. 20 Tanger
INPE : 163001175

مختبر شالة للتحاليل الطبية

LABORATOIRE CHELLAH D'ANALYSES MÉDICALES

14, Rue la Fayette 1^{ère} étage App.20 - Tanger
+212 539 94 01 07 +212 539 32 29 39
Dr. CHAKIB EL MEKKOUDI
Médecin Biologiste



14, زنقة لافاييت الطابق الاول الشقة رقم 20 - طنجة
+212 539 32 29 39 +212 539 94 01 07
الدكتور شكيب المكودي
طبيب إحيائي

Dossier ouvert le 03/03/23
Edité le 03/03/23

Mr CHENTOUF ABDELHAK
Dossier : 23C100
Docteur MOHAMED ZAKI

Page : 1/1

BIOCHIMIE SANGUINE

EXPLORATION ANOMALIE LIPIDIQUE

					Normales
ASPECT DU SERUM	----- :	Clair			
CHOLESTEROL TOTAL	----- :	1,59	g/l		< 2
	Soit :		4,1	mmol/l	< 5,15
CHOLESTEROL HDL	----- :	0,42	g/l		> 0,35
	Soit :		1,08	mmol/l	> 0,9
RAPPORT CHOLESTEROL TOTAL / C HDL	----- :	3,79			< 4,5
CHOLESTEROL LDL (calculé)	----- :	0,94	g/l		
	Soit :		2,42	mmol/l	

Valeurs souhaitables du LDL en fonction du nombre de facteurs de risque cardiovasculaire selon l'AFSSAPS:

Absence de facteurs de risque : LDL < 2,2 g/l
Présence d'un facteur de risque : LDL < 1,9 g/l
Présence de deux facteurs de risque : LDL < 1,6 g/l
Présence de plus de 2 facteurs de risque : LDL < 1,3 g/l
Présence d'antécédents de maladie cardiovasculaire : LDL < 1,0 g/l

Selon l'AFSSAPS, les facteurs de risque sont : l'âge, antécédents familiaux de maladie coronaire précoce, tabagisme, HTA, diabète de type 2 et HDL < 0,40 g/l

TRIGLYCERIDES	----- :	1,14	g/l		< 1,5
	Soit :		1,3	mmol/l	< 1,71
Cholestérol total :		1,32	g/l	le 13/11/12	
Triglycérides :		0,84	g/l	le 13/11/12	

LABORATOIRE DE BIOLOGIE
MÉDICALE CHELLAH
Dr. bouqila El Mekoudi Chakib
14 Rue de Lafayette App. 20 Tanger
INPE: 1163001175