

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° M21- 0010531

- ☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00626 Société : RAM
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : RETRAITE
 Nom & Prénom : TADILI SIDI REDOUANE
 Date de naissance : 07-08-1944
 Adresse : 17 rue AL SATIANI - NASSR - 10090 - RAS T
 redouane.tadili@gmail.com
 Tél. : 0661380226 Total des frais engagés : 1848,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation : 15/06/2023
 Nom et prénom du malade : Tadili Sidi Redouane Age : 78 ans
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : Cardiopathie ischémique
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Rabat Le : 15/06/2023
 Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/06/2023	CS Ech		300,00 DHS	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien

Date

Montant de la Facture

PHARMACIE DE KÉBIBAT



102030346

Pharmacie de Kébibat

SEDRA T.M. Pharmacien

7, rue Slaoui Kebibat - Rabat

Tél.: 0537 69 05 07

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				Coefficient DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS														
			DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. EL OUARDIGHI Kaoutar

Spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux

Ancienne Cardiologue de l'Hôpital Erasme de Bruxelles - Belgique

Ancienne Interne du CHU Ibn Sina de Rabat

Diplôme de Cardiologie de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat

Diplôme d'Echocardiographie et d'imagerie vasculaire

non invasive de l'Université de Bordeaux - France

Dr. EL OUARDIGHI

د. الوردیغی کوثر

أخصائية في أمراض القلب والشراین

طبيبة سابقة في مستشفى ارازم بروكسيل - بلجيكا

طبيبة داخلية سابقة في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط

دبلوم التخصص في أمراض القلب والشراین من كلية الطب والصيدلة بالرباط

دبلوم في الفحص بالصدى والبوليغراف من جامعة بوردو فرنسا

Rabat le : 15/06/2023

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaa Casablanca
Coplavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V: 270,00 DH
5 113001 082018

M^r Tadili Lidi Redwan

3x 182.10

1/ Subiot 5/160/12, 5mg
upj le matin après petit-déj

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaa Casablanca
Coplavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V: 270,00 DH
5 113001 082018

3x 270.00

2/ Co-plavix 75/100mg
upj à midi

صيدلية القبيبات
Pharmacie de Kebibati
SEDRAI Med pharmacien
7, rue Slaoui Kebibati - Rabat
Tél: 07 77 77 77 77

Int
de
03 mois

3/ Rosuvastatin Long
upj le soir

2x 96.00

4/ Prazosin Long
upj le matin & le soir

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaa Casablanca
Coplavix 75mg/100mg
b30 cp
P.P.V: 270,00 DH
5 113001 082018

T = 1548,30

Dr Kaoutar EL OUARDIGHI
Spécialiste en Maladie
du Cœur et des Vaisseaux
Tél: 101254621

16 Avenue Michliffen, Appt 5 Rabat-Agdal اكدال شارع مشلفين، شقة رقم 5 الرباط - اكدال

Tél.: 05 37 67 06 93 الهاتف: GSM: 07 00 17 32 52 المحمول:

kaoutarelouardighi@gmail.com

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56
Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

sur l'utilisation de ce n

- Ne prenez pas de dose
Si vous avez d'autres

SULIAT® HCT

160 mg/5 mg/12.5 mg

160 mg/5 mg/25 mg

160 mg/10 mg/12.5 mg

160 mg/10 mg/25 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14 & 28 et 56

Valsartan/Amlodipine/Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, car les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné ici, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT HCT ?
- 3- Comment prendre SULIAT HCT ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT HCT ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT HCT ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Code ATC : C09XD01

Les comprimés de SULIAT HCT contiennent trois substances actives : Valsartan, Amlodipine et Hydrochlorothiazide. Ces substances contribuent au contrôle de la tension artérielle lorsque celle-ci est trop élevée. L'amlodipine appartient à un groupe de substances appelées « inhibiteurs calciques ». L'amlodipine empêche le calcium de traverser la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui empêche le Valsartan d'appartenir à un groupe de substances appelées « antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II. Le Valsartan agit en bloquant l'effet de l'angiotensine II.

L'hydrochlorothiazide appartient à une classe de médicaments appelés « diurétiques ». Ils augmentent le débit urinaire, ce qui fait également baisser la pression artérielle. Du fait de ces trois mécanismes, les vaisseaux sanguins se relâchent et la tension artérielle diminue.

Indications thérapeutiques :

SULIAT HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle chez les patients adultes dont la prise d'amlodipine, de Valsartan et d'hydrochlorothiazide et qui peuvent bénéficier de la prise combinée de ces trois substances.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT HCT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais SULIAT HCT, comprimés pelliculés, en cas de :

- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT HCT pendant la grossesse.)
- Si vous êtes allergique à l'amlodipine ou à tout autre inhibiteur calcique, au Valsartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants du médicament.
- Si vous êtes diabétique ou vous avez une insuffisance rénale (DFG < 60 ml/min/1,73 m²) et vous prenez des médicaments contenant de l'aliskiren.
- Si vous pensez que vous pourriez être allergique, ne prenez pas SULIAT HCT et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez une maladie du foie, une destruction des petits canaux biliaires dans le foie (cholestase biliaire) entraînant une accumulation de bile dans le foie (cholestase).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous êtes incapable d'uriner (anurie).
- Si votre taux sanguin de potassium ou de sodium est trop bas malgré un traitement pour augmenter les taux sanguins de potassium ou de sodium.
- Si votre taux sanguin de calcium est trop élevé malgré un traitement pour réduire les taux sanguins de calcium.
- Si vous souffrez de crises de goutte (crises d'acide urique dans les articulations).
- Si vous présentez une baisse sévère de la pression artérielle (hypotension).
- Si vous présentez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.
- Si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer la pression artérielle.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec SULIAT HCT :

- Si votre taux sanguin de potassium ou magnésium est bas (avec ou sans symptômes tels que faiblesse musculaire, spasmes musculaires, rythme cardiaque anormal).
- Si votre taux sanguin de sodium est bas (avec ou sans symptômes tels que fatigue, confusion, contractions musculaires, convulsions).
- Si votre taux sanguin de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que nausées, vomissements, constipation, maux d'estomac, mictions fréquentes, soif, faiblesse et contractions musculaires).
- Si vous avez des problèmes rénaux, si vous avez eu une greffe de rein ou si vous êtes traité(e) pour une insuffisance rénale.
- Si vous avez des problèmes hépatiques.
- Si vous avez eu ou vous avez une insuffisance cardiaque ou une maladie coronarienne, en particulier si vous avez été prescrit la dose maximale d'amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide (10 mg/320 mg/25 mg).
- Si vous avez présenté une crise cardiaque. Suivez attentivement les instructions de votre médecin pour la dose initiale. Votre médecin peut aussi vérifier votre fonction rénale.

- Si votre médecin vous a informé que vous avez un rétrécissement des valves du cœur (appelé « sténose aortique ou mitrale ») ou que l'épaisseur de votre muscle cardiaque est augmentée de manière anormale (ce que l'on appelle une « cardiomyopathie hypertrophique obstructive »).

- Si vous souffrez d'hyperaldostéronisme. Il s'agit d'une maladie dans laquelle les glandes surrénales fabriquent une quantité trop importante d'hormone aldostérone. L'utilisation de SULIAT HCT est déconseillée si vous êtes dans cette situation.
- Si vous souffrez d'une maladie appelée lupus érythémateux disséminé (appelée également « lupus » ou « LED »).
- Si vous êtes diabétique (taux de sucre élevé dans le sang).
- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.
- Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.
- Si vous avez développé une réaction allergique à d'autres médicaments antihypertenseurs ou à des diurétiques (des médicaments utilisés pour augmenter la quantité d'urine produite), en particulier si vous souffrez d'asthme et d'allergies.

- Si vous êtes malade (vomissements ou diarrhées), en particulier du visage et de la gorge, lors de la prise d'autres médicaments (y compris les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).- Si ces symptômes surviennent, arrêtez de prendre SULIAT HCT et contactez votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais reprendre SULIAT HCT.

- En cas de sensations vertigineuses et/ou d'évanouissements pendant le traitement par SULIAT HCT, prévenez votre médecin le plus rapidement possible.

- Si vous ressentez une baisse de la vision ou une douleur dans l'œil. Ce pourrait être les symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les heures voire dans la semaine qui suivent la prise de SULIAT HCT. Ceci peut entraîner des troubles de la vision permanents, en l'absence de traitement.

- Si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :

- Un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) (par exemple Enalapril, Lisinopril, Ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète.
- Aliskiren.

- Votre médecin pourra surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle, et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Risque accru de cancer de la peau non-mélanome (carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde) suite à l'exposition à des doses cumulatives croissantes d'hydrochlorothiazide (HCTZ) :

- Les patients qui prennent l'HCTZ seuls ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et de signaler toute lésion cutanée suspecte ;
- Les lésions cutanées suspectées doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique ;
- Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'utiliser une protection adéquate en cas d'exposition solaire ;

une protection adéquate en cas d'exposition solaire ;

- L'utilisation d'HCTZ doit aussi être réexaminée avec attention.

Si vous êtes dans l'une des situations ci-dessus, parlez-en à votre médecin.

Enfants et adolescents

L'utilisation de SULIAT HCT n'est pas recommandée chez l'enfant.

Sujets âgés (à partir de 65 ans)

SULIAT HCT peut être utilisé par les personnes âgées de 65 ans et plus, à la dose habituelle de SULIAT HCT, à la dose habituelle de SULIAT HCT, à la dose habituelle de SULIAT HCT.

La dose habituelle de SULIAT HCT est d'un comprimé par jour.

Il est recommandé de prendre le comprimé à la même heure.

- Avaler les comprimés tels quels avec un verre d'eau.

- Vous pouvez prendre SULIAT HCT au cours ou en dehors d'un repas.

- Ne prenez pas de dose double (deux comprimés en une seule prise) si vous avez oublié de prendre un comprimé.

- Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci est d'ordre d'information.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Il est recommandé de surveiller la fonction rénale, la pression artérielle, le taux de potassium et le taux de sodium.

Prazol[®] 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, consultez votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV: 96DH00
PER: 03/25
LOT: L3553-1

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol[®] 20 mg :

Oméprazole (DCI) 20 mg

Excipients qsp 1 gélule

FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastro-résistants.

- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL[®] 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL[®] 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL[®] 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol[®] 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.
- 1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.
- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :
1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :
1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :



Prazol[®] 20 mg

oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de :

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, consultez votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV: 96DH00
PER: 03/25
LOT: L3553-1

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Prazol[®] 20 mg :

Oméprazole (DCI) 20 mg

Excipients qsp 1 gélule

FORME PHARMACEUTIQUE

- Gélule contenant des microgranules gastro-résistants.

- Présentation : boîte de 7, 14 et 28 gélules.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

PRAZOL[®] 20 mg, gélule gastro-résistante contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT

PRAZOL[®] 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).
- les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). PRAZOL[®] 20 mg, gélule gastro-résistante peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grosseur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- le reflux gastro-œsophagien (RGO).

Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- les ulcères infectés par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

- Maladie ulcéreuse gastroduodénale :

Selon le cas :

- 1 gélule de Prazol[®] 20 mg matin et soir, associée à deux antibiotiques pendant 7 jours. Cette trithérapie sera suivie par 1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 3 à 5 semaines supplémentaires.
- 1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 4 à 6 semaines.
- Oesophagite par reflux gastro-œsophagien :
1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :
1 gélule de Prazol[®] 20 mg par jour pendant 4 à 8 semaines.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens :

