

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-774741

Commissaire

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1442 Société : RAA

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : BANQOUR / TOUREYA

Date de naissance : 1/3 KSOUR KSI 2 MASSIRAI DARRAGH

Adresse : 24/10/1999

Tél. : 066650358 / 052434031 Total des frais engagés : 3859,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Ophthalmology Laser
Pr BAH ALI TARIK
Spécialiste Ophtalmologiste
Business Affaires Guéliz, Intersection Bd Abdelkrim
Elkhattabi et Bd My Rachid, 2e étage N°11 - Marrakech
Tél : (+212) 0808538471

Date de consultation : 16/10/2023

Nom et prénom du malade : BANQOUR / TOUREYA

Age : 24/10/1999

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection oculaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Marrakech

Le : 16/10/2023

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/10/23	S		3.000 DH	
16/10/23	C.S		3.000 DH	

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/10/23	5380,50

[illegible][illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000 D 21433552 00000000 G 00000000 35533411 B 00000000 11433553 B	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
		DATE DE L'EXECUTION

CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des Soins	Soins de base	Soins de confort	Soins médicaux	Soins de rééducation	Soins de réinsertion
Soins de base	100	100	100	100	100
Soins de confort	100	100	100	100	100
Soins médicaux	100	100	100	100	100
Soins de rééducation	100	100	100	100	100
Soins de réinsertion	100	100	100	100	100

Coefficient

INP: | | | | | | | | |

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F

PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H

255334

000000

2 | 21433552

0	00000000
---	----------

D

[illegible]

000000

0	00000000
---	----------

B

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINSDATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION**ACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisée
Adulte & enfant
Cataracte, Strabisme, Ptosi, Voies
lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,
Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون
الكبار والصغار
المياه البيضاء، الحول، أمراض الجفن، المسالك
الدمعية، النزف، القرنية، الشبكية،
الجراحة الانكسارية والتدخلات اللاصقة

Marrakech le :

Marrakech le :

16 octobre 2023

Mme BANQOUR Touriya

640,50
1/ ALPHAGAN 02 ./.: collyre cl

1 goutte 2 fois/jour; 8h30 et 20 heures 30, dans les deux yeux

1152,60
2/ DUOTRAV 40 / 5 µg / mg collyre

collyre 1 fois par jour à 22h, dans les deux yeux

666,40
3/ XOLA

1 GOUTTE 2X/J, dans les deux yeux

9001,60
4/ HYLOGEL collyre

1 goutte x4/j, dans les deux yeux

3359,50
Traitement pendant : 3 Mois

Sté Pharmacie Centrale S.A.R.L AU
166, Bd Mohammed V - Marrakech
Tél : 05 24 43 01 58

Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999 Email : olgmarrakech@gmail.com



Ophthalmology Laser Le Gueliz
Dr BAHA ALI TARIK
Spécialiste Ophtalmologiste
Business Affaires Gueliz, Intersection Bd Abdelkrim
Elkhattabi et Bd My Rachid, 2e étage N°11 - Marrakech
Tél : (+212) 0808536471



2026-01.

LOT

306557.

PPC:

180 DH.



2025-09.

LOT

305741.

PPC:

180 DH.



2025-09.

LOT

305741.

PPC:

180 DH.



2025-09.

LOT

305741.

PPC:

180 DH.



2026-01.

LOT

306557.

PPC:

180 DH.

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veillez lire attentivement l'information car elle contient des informations qui vous pourriez avoir besoin. Si vous avez d'autres questions à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit car cela pourrait lui être nocif, mais si l'un des effets indésirables non mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et à quoi sert-il ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE DUOTRAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol).

Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.



DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL

Collyre en solution, 2,5 ml

Boîte de 1 flacon

Boîte de 1 flacon

PPV : 19210 DH

AMM N° 991/18 DMP / 21/ NRO

Remboursable AMO

407393 MA



- Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous n'avez pas besoin du flacon.

Utilisez DuoTrav aussi longtemps que votre médecin vous le dit.

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veillez lire attentivement l'information car elle contient des informations qui vous pourriez avoir besoin. Si vous avez d'autres questions à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit car cela pourrait lui être nocif, mais si l'un des effets indésirables non mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et à quoi sert-il ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE DUOTRAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol).

Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.



DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL

Collyre en solution, 2,5 ml

Boîte de 1 flacon

Sothema Bouskoura

PPV : 19210 DH

AMM N° 991/18 DMP / 21/ NRO

Remboursable AMO

407393 MA



- Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous n'avez pas besoin du flacon.

Utilisez DuoTrav aussi longtemps que votre médecin vous le dit.

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veillez lire attentivement l'information car elle contient des informations qui vous pourriez avoir besoin. Si vous avez d'autres questions à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit car cela pourrait lui être nocif, mais si l'un des effets indésirables non mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et à quoi sert-il ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE DUOTRAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol).

Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.



DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL

Collyre en solution, 2,5 ml

Boîte de 1 flacon

Sothema Bouskoura

PPV : 19210 DH

AMM N° 991/18 DMP / 21/ NRO

Remboursable AMO

407393 MA



- Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous n'avez pas besoin du flacon.

Utilisez DuoTrav aussi longtemps que votre médecin vous le dit.

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veillez lire attentivement l'information car elle contient des informations qui vous pourriez avoir besoin. Si vous avez d'autres questions à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit car cela pourrait lui être nocif, mais si l'un des effets indésirables non mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et à quoi sert-il ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE DUOTRAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol).

Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.



DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL

Collyre en solution, 2,5 ml

Boîte de 1 flacon

Sothema Bouskoura

PPV : 19210 DH

AMM N° 991/18 DMP / 21/ NRO

Remboursable AMO

407393 MA



- Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous n'avez pas besoin du flacon.

Utilisez DuoTrav aussi longtemps que votre médecin vous le dit.

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veillez lire attentivement l'information car elle contient des informations qui vous pourriez avoir besoin. Si vous avez d'autres questions à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit car cela pourrait lui être nocif, mais si l'un des effets indésirables non mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et à quoi sert-il ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE DuoTrav ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol).

Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.



DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL

Collyre en solution, 2,5 ml

Boîte de 1 flacon

Sothema Bouskoura

PPV : 19210 DH

AMM N° 991/18 DMP / 21/ NRO

Remboursable AMO

407393 MA



- Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous n'avez pas besoin du flacon.

Utilisez DuoTrav aussi longtemps que votre médecin vous le dit.

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veillez lire attentivement l'information car elle contient des informations qui vous pourriez avoir besoin. Si vous avez d'autres questions à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit car cela pourrait lui être nocif, mais si l'un des effets indésirables non mentionné dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et à quoi sert-il ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
- 3- Comment utiliser DuoTrav ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver DuoTrav ?
- 6- Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE DUOTRAV ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol).

Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.



DUOTRAV® 40 µg/mL + 5 mg/mL

Collyre en solution, 2,5 ml

Boîte de 1 flacon

Sothema Bouskoura

PPV : 19210 DH

AMM N° 991/18 DMP / 21/ NRO

Remboursable AMO

407393 MA



- Utilisez un seul flacon à la fois. Ne pas ouvrir le sachet tant que vous n'avez pas besoin du flacon.

Utilisez DuoTrav aussi longtemps que votre médecin vous le dit.

Si vous avez utilisé plus de DuoTrav que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTrav

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Rougeur de l'œil.

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision anormale, œil sec, démangeaison oculaire, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple sensation de brûlure, de picotement).

Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est la dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoyez-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

de traitement, contactez immédiatement

notre médecin. Si vous avez d'autres questions sur

l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la bouche, gonflement de l'œil, rougeur

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est le dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoir-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la bouche superficielle de l'œil

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est le dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoir-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la couche superficielle de l'œil

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est le dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoir-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la couche superficielle de l'œil

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est le dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoyez-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

Si vous ne pouvez pas continuer votre traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la bouche, gonflement de l'œil, rougeur

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est le dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoyez-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

de traitement, contactez immédiatement

notre médecin. Si vous avez d'autres questions sur

l'utilisation de ce produit, demandez conseil à

votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la bouche, gonflement de l'œil, rougeur

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution dorzolamide

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il peut être nocif, même si leurs symptômes sont semblables aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est le dorzolamide en solution mais dans la notice, il sera appelé collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophtalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :

- êtes allergique (hypersensible) à Xola® ou à l'un des autres composants de cette solution.

N'oubliez pas d'utiliser Xola® collyre

Il est important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin.

Ne vous oubliez pas d'instiller une goutte à l'heure

prévoir-la dès que vous vous souvenez.

Il est presque l'heure de l'instillation

prenez votre médicament normalement

elle suivante. Ne prenez jamais de

compenser la dose que vous

prenez.

Utiliser Xola® collyre

Il faut être utilisés chaque jour

utiliser correctement. Si vous devez

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consultez rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
- réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
- l'urticaire.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :

Très fréquent (affecte plus de 1 personne sur 10)

- brûlure et picotement des yeux.

Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)

• mal de la bouche, gonflement de l'œil, rougeur

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
3. Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.
Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.
Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de brimonidine avec un autre collyre peut être utilisée.
La substance active contenue dans ALPHAGAN® est la brimonidine.
À l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ALPHAGAN® 0.2%, collyre.

Si vous avez besoin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne prenez pas de médicament sans avis médical. Ce médicament peut avoir des effets indésirables.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Collyre ?

T-IL UTILISÉ ?

Patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est la brimonidine qui agit en réduisant la pression intraoculaire.

Flacon de 5 ml

Brimonidine

Collyre en solution

PPV 91DH50



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
3. Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.
Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.
Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de brimonidine avec un autre collyre peut être utilisée.
La substance active contenue dans ALPHAGAN® est la brimonidine.
À l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ALPHAGAN® 0.2%, collyre.

Si vous avez besoin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne prenez pas de médicaments sans avis médical. Ce médicament peut avoir des effets indésirables. Ne le donnez pas à un enfant sans avis médical. Ce médicament peut avoir des effets indésirables. Ne le donnez pas à un enfant sans avis médical.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Collyre ?

COLLYRE ?

Patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est la brimonidine.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?

N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ALPHAGAN® 0.2%, collyre.

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
3. Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.
Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.
Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de brimonidine avec un autre collyre peut être utilisée.
La substance active contenue dans ALPHAGAN® est la brimonidine.
À l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ALPHAGAN® 0.2%, collyre.

Si vous avez besoin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne prenez pas de médicament sans avis médical. Ce médicament peut avoir des effets indésirables.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Collyre ?

T-IL UTILISÉ ?

Patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est la brimonidine qui agit en réduisant la pression intraoculaire.

Flacon de 5 ml

Brimonidine

Collyre en solution

PPV 91DH50



0.2%

Brimonidine

Collyre en solution

Flacon de 5 ml

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
3. Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre. Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, la substance active contenue dans ALPHAGAN® agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre.

Si vous avez besoin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne le donnez pas à d'autres personnes. Ce médicament peut être nocif, même si les signes de leur utilisation ne sont pas évidents.

Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre, ne l'utilisez pas.

Collyre ?

T-IL UTILISÉ ?

Patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, la substance active contenue dans ALPHAGAN® agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre, ne l'utilisez pas.

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
3. Comment utiliser **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.
Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.
Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** et d'un autre collyre peut être utile.
La substance active contenue dans **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** est la brimonidine.
La brimonidine agit en réduisant la production de l'humour aqueux à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre.

Prenez soin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne le donnez pas à d'autres personnes. Ce médicament peut être nocif, même si les signes de leur utilisation ne sont pas évidents.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Collyre ?

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?

Patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre. Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** et d'un autre collyre peut être utile.

La substance active contenue dans **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** est la brimonidine. La brimonidine agit en réduisant la production de l'humour aqueux à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre.

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
3. Comment utiliser **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.
Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.
Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** et d'un autre collyre peut être utile.
La substance active contenue dans **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** est la brimonidine.
La brimonidine agit en réduisant la production de l'humour aqueux à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre.

Prenez soin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne le donnez pas à d'autres personnes. Ce médicament peut être nocif, même si les signes de leur utilisation ne sont pas évidents.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Collyre ?

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?

Patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre. Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** et d'un autre collyre peut être utile.

La substance active contenue dans **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** est la brimonidine. La brimonidine agit en réduisant la production de l'humour aqueux à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre.

Alphagan®

0.2%, collyre
Brimonidine

ALLERGAN®

ALLERGAN

Prenez garde à lire attentivement l'intégralité de la notice et à prendre ce médicament.

- Gardez le médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Si vous avez des doutes, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles indiquées.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.
- Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
3. Comment utiliser **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.
Il peut être utilisé seul ou en association avec un autre collyre.
Quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire, l'association de **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** et d'un autre collyre peut être utile.
La substance active contenue dans **ALPHAGAN® 0.2%, collyre** est la brimonidine.
La brimonidine agit en réduisant la production de l'aqueur humorale et en augmentant son écoulement à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?
N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0.2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans le collyre.

Prenez soin de la lire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ne prenez pas de médicament sans avis médical. Ce médicament peut avoir des effets indésirables, même si les signes de leur apparition sont rares.

Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin. Si vous avez des problèmes de vision, consultez votre médecin.

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Collyre ?

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé
Adulte & enfant
Cataracte, Strabisme, Ptosières, Voies
lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,
Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون
الكبار والصغار
المياه البيضاء الحول أمراض الجفن المسالك
الدمعية الزرق القرنية الشبكية
الجراحة الانكسارية والعصابات اللاصقة

Marrakech le :

Marrakech le :

Marrakech le :

Reçu de caisse N° : 77759

soukaina

Identifiant patient	Nom du patient	Date encaissement
PT170400492	BANQOUR Touriya	16/10/2023

Mode Règlement	Motif / Référence de paiement	Montant Dhs
Espèce	Consultation	300,00
Reçu établi par :	Total payé	300,00

Ophthalmology Laser Le Gueliz
Pr BAHALI TAHAR
Spécialiste Ophtalmologiste
Business Affaires Gueliz- Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid, 2e étage N° 11 - Marrakech
Tél : (+212) 0808536471

IF: 37627168
ICE: 002191925000053

Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999

Email : olgmarrakech@gmail.com