

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0047950

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2933

Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : BENABDIA

Date de naissance : 194818

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés : 1658,30

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 05/02/24

Nom et prénom du malade : BENABDIA

Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Gynécologie

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Montant et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/02/24			150,00	Dr. Souad FAIZ Rhumatologue Ostéopathe Échographe Ostéoarticulaire Rhumatologie Interventionnelle

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	02/24	314,90 D1
	07-02-24	593,40 D1

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
DIAGNOSTIC RADIOLOGIE SIDA RHMANES A.R.L Avenue 10 Mars Place de la préfecture Sidi Othmane Casablanca RC 48602/11F:2 3107 ICE 00175481300087	06-2-24	245	600 D11

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient											
				Coefficient DES TRAVAUX										
				MONTANTS DES SOINS										
				DEBUT D'EXECUTION										
				FIN D'EXECUTION										
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE													
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412 00000000</td> <td>21433552 00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000 35533411</td> <td>00000000 11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412 00000000	21433552 00000000	D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	B			Coefficient DES TRAVAUX
	H													
	25533412 00000000	21433552 00000000												
	D	G												
	00000000 35533411	00000000 11433553												
	B													
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS										
				DATE DU DEVIS										
				DATE DE L'EXECUTION										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

وصفة
ORDONNANCE

METEOSPASMYL® 8 20 caps molles
Alvéine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg
P.P.V. : 40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
6 118001 100293

METEOSPASMYL® 8 20 caps molles
Alvéine citrate 60 mg / Siméticone 300 mg
P.P.V. : 40,40 DH
Distribué par COOPER PHARMA
41, rue Mohamed Diouri - Casablanca
6 118001 100293

le 07-02-24

م- BENABIDA HABIBA

10/12

10/1 Metospasmyl

PHARMACIE SEFRIOU
Mme. SEFRIOU Houria
15, Bloc 13, Rue 10, Darb Salama
Cité Djemaâ - Casablanca

PHARMACIE SEFRIOU
Mme. SEFRIOU Houria
15, Bloc 13, Rue 10, Darb Salama
Cité Djemaâ - Casablanca

15/2

2/1 Arixi b song

82.17

14/1 14/1
092052745 = 1

Dr. Souad
Rhumatologue
Ostéopathe
Échographie Ostéoarticulaire
Interventionnelle

Eziun 20 mg

14/1 14



ARXIB® 60 mg et 90 mg

Comprimé pelliculé en boîte de 7 et 14 Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que ARXIB®, comprimé pelliculé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ARXIB®, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre ARXIB®, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ARXIB®, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ARXIB®, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que ARXIB®, comprimé pelliculé ?

ARXIB®, comprimé pelliculé contient la substance active « etoricoxib ».

ARXIB®, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quels cas ARXIB®, comprimé pelliculé est-il utilisé ?

ARXIB®, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.

ARXIB®, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os.

Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité.

Qu'est-ce que la polyarthrite ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

La polyarthrite est une maladie des articulations.

La goutte est une maladie des articulations.

des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous avez une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 (voir rubrique 4 "Quels sont les effets indésirables éventuels ?").

• Si vous avez un ulcère de l'estomac évolutif ou saignement gastro-intestinal.

• Si vous avez une maladie grave du foie.

• Si vous avez une maladie grave des reins.

• Si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être ou si vous allaitez (voir rubrique "Grossesse, allaitement et fertilité").

• Si vous êtes âgé(e) de moins de 16 ans.

• Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou colite.

• Si vous présentez une hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr(e) que votre pression artérielle soit bien contrôlée).

• Si votre médecin vous a diagnostiqué une maladie cardiaque à type d'insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), d'angine de poitrine (douleurs thoraciques).

• Si vous avez des antécédents de crise cardiaque, pontage coronarien, maladie des artères périphériques (mauvaise circulation dans les jambes et les pieds due à des artères rétrécies ou bouchées).

• Si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, quelle que soit la sorte, y compris un accident ischémique transitoire). L'etoricoxib pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin ou votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ARXIB®, comprimé pelliculé si :

• Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac.

• Vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongés.

• Vous avez des œdèmes dus à une rétention d'eau.

• Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque.

• Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. ARXIB®, comprimé pelliculé peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses. Votre médecin peut être amené à contrôler votre tension artérielle plus régulièrement.

• Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins.

• Vous avez des traitements anti-infectieux. ARXIB®, comprimé pelliculé peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection.

En particulier, si vous prenez votre médicament peut être amené à être traité par ARXIB®, comprimé pelliculé.

• Médicaments qui fluidifient le sang, comme la warfarine.

• Rifampicine (un antibiotique).

• Méthotrexate (un médicament utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde).

• Ciclosporine ou tacrolimus (des médicaments utilisés pour prévenir le rejet d'un organe transplanté).

• Lithium (médicament pour la dépression).

• Médicaments pour aider à contrôler l'insuffisance cardiaque appelée insuffisance cardiaque congestive (par exemple les diurétiques).

• Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (comme losartan et le valsartan).

• Diurétiques.

• Digoxine (médicament pour le cœur).

• Médicaments pour traiter le rythme cardiaque irrégulier, comme le minoxidil (médicament pour la tension artérielle).

• Salbutamol en comprimé (médicament pour traiter l'asthme).

• Pilule contraceptive (association d'effets secondaires).

• Traitement hormonal substitutif.

• Aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac est augmenté.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

• Si vous prenez ARXIB®, comprimé pelliculé, ne prenez pas d'autres médicaments à faibles doses pour la prévention d'un accident vasculaire cérébral.

LOT : 231508
EXP : 10/2026
PPV : 152,00DH

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Ezium®

Esoméprazole

20 mg et 40 mg gélules gastro-résistantes. Boîte de 7, 14 et 28.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Composition du médicament :

Composition qualitative et quantitative en substance active par unité de prise.

Principe actif :	
Esoméprazole magnésium dihydrate.....	20 mg
Esoméprazole magnésium dihydrate.....	40 mg
Autres composants : sucre, amidon de maïs, hypromellose 3CP, diméthicone émulsion 35%, polysorbate 80, mannitol, diacétyl monoglycérides, talc, methacrylic acid-ethylacrylate copolymer dispersion 30%, triéthyle du citrate, stéaroyl macroglycérides, eau purifiée.	
Excipients à effet notoire : Mannitol, Saccharose	

Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité :

EZIU® contient une substance appelée esoméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

Indications thérapeutiques :

EZIU®, gélules gastro-résistantes est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

Adultes

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.
- Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). EZIU® peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (tube qui relie votre gorge à votre estomac) et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum (intestin grêle) en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Posologie, Mode et/ou voie d'administration, Fréquence d'administration et durée du traitement :

Veuillez à toujours prendre votre médicament.

Vérifiez auprès de votre médecin si EZIU® n'est pas reconnu.

Si vous prenez ce médicament votre médecin sera amené à lui.

Si votre médecin vous a dit que vous avez besoin de lui.

Si vous devez l'infuser.

Si vous devez l'injecter.

Si vous devez l'implanter.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

Si vous devez l'insérer.

2) Remuez. Puis buvez le mélange immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.

3) Afin de prendre la totalité du médicament, rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire. Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler, le contenu des gélules peut être mélangé dans de l'eau et prélevé dans une seringue. Il peut alors être administré par sonde gastrique.

Posologie

Votre médecin vous dira le nombre de gélules à prendre et la durée du traitement. Ceci dépendra de votre état de santé et du fonctionnement de votre foie.

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'EZIU® une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est d'une gélule d'EZIU® 20 mg une fois par jour.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'EZIU® 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut vous recommander de prendre une gélule d'EZIU® 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins.

Si vous avez des problèmes hépatiques sévères, votre médecin peut vous donner une dose plus faible.

En cas d'infection par la bactérie appelée Helicobacter pylori, traitement de l'ulcère du duodénum et prévention de la récurrence de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum

Adultes et adolescents à partir de 12 ans

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU® 20 mg deux fois par jour pendant 7 jours. Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU® 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU® 20 mg une fois par jour.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule d'EZIU® 40 mg deux fois par jour.

Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement en fonction de vos besoins.

La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récurrence hémorragique d'un ulcère gastro-duodénal

Adultes âgés de 18 ans et plus :

La dose recommandée est d'une gélule à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Contre-indications :

Ne prenez jamais EZIU® 20mg, 40 mg, gélule gastro-résistante :

- si vous êtes allergique à l'esoméprazole ou l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;
- si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, nifedipazole, omeprazole) ;
- si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé dans le traitement du VIH).

Si vous avez des doutes, si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant toute administration d'EZIU®.

Effets indésirables :

Les effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête, nausées, diarrhées, douleurs abdominales, constipation, flatulences, brûlures d'estomac, reflux gastro-œsophagien, troubles du sommeil, étourdissements, vertiges, sécheresse de la bouche, augmentation dans le sang des enzymes du foie, éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

PPV: 82DH10

PER: 02/25

LOT: M4120-2

Sécheresse de la bouche.

Augmentation dans le sang des enzymes du foie.

Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.

Vertiges.

Sécheresse de la bouche.

Augmentation dans le sang des enzymes du foie.

Éruptions cutanées, urticaire et démangeaisons.



وصفة
ORDONNANCE

le 08.02.24.

M. BENABOU

HABOU

134.40
10/

Arixis 560mg

139.00 x 3
20/

Don A

42.00
59340

1/2

3 mg

Boulevard AL Oods, Nara II - Ain Chok - Casablanca

Tel : 0522 21 30 90 - Rendez-vous : 0522 50 45 13 - Fax : 0522 40 48 06

Lot N° : 2300151
EXP : 11-2025
PPV : 139,00 DH

Lot N° : 2300151
EXP : 11-2025
PPV : 139,00 DH

Lot N° : 2300151
EXP : 11-2025
PPV : 139,00 DH

ARIBX® 60 mg et 90 mg

Comprimé pelliculé

en boîte de 7 et 14

Etoricoxib

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **ARIBX®, comprimé pelliculé** et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **ARIBX®, comprimé pelliculé** ?
3. Comment prendre **ARIBX®, comprimé pelliculé** ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver **ARIBX®, comprimé pelliculé** ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE **ARIBX®, comprimé pelliculé** ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Qu'est-ce que **ARIBX®, comprimé pelliculé** ?

ARIBX®, comprimé pelliculé contient la substance active « **étoricoxib** ».

ARIBX®, comprimé pelliculé est l'un des médicaments de la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2).

Ceux-ci appartiennent à une famille de médicaments nommée anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Dans quels cas **ARIBX®, comprimé pelliculé** est-il utilisé ?
ARIBX®, comprimé pelliculé contribue à réduire la douleur et le gonflement (inflammation) des articulations et des muscles chez les patients âgés de 16 ans et plus atteints d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et de goutte.

ARIBX®, comprimé pelliculé est également utilisé pour le traitement de courte durée de la douleur modérée après chirurgie dentaire chez les patients âgés de 16 ans et plus.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est une maladie des articulations. Elle résulte d'une altération progressive du cartilage qui protège les extrémités des os.

Elle entraîne un gonflement (inflammation), une douleur, une sensibilité, une raideur et un handicap.

Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde ?

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire chronique des articulations. Elle provoque un gonflement et une perte progressive des articulations atteintes. Elle peut entraîner une inflammation d'autres parties du corps.

Qu'est-ce que la goutte ?

La goutte est une maladie qui se manifeste par des crises soudaines d'inflammation, une rougeur et une douleur provoquée par des dépôts de cristaux d'acide urique dans les articulations.

Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante ?

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE **ARIBX®, comprimé pelliculé** ?

Ne prenez jamais **ARIBX®, comprimé pelliculé** dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'**étoricoxib** ou à l'un

des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,

- Si vous avez une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'aspirine et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 (voir rubrique 4 "Quels sont les effets indésirables éventuels ?").
- Si vous avez un ulcère de l'estomac évolutif ou saignement gastro-intestinal,
- Si vous avez une maladie grave du foie,
- Si vous avez une maladie grave des reins,
- Si vous êtes enceinte ou prévoyez de l'être ou si vous allaitez (voir rubrique "Grossesse, allaitement et fertilité").
- Si vous êtes âgé(e) de moins de 16 ans,
- Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que maladie de Crohn, recto-colite hémorragique ou colite,
- Si vous présentez une hypertension artérielle non contrôlée par un traitement (vérifiez avec votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr(e) que votre pression artérielle soit bien contrôlée),
- Si votre médecin vous a diagnostiqué une maladie cardiaque à type d'insuffisance cardiaque (modérée ou sévère), d'angine de poitrine (douleurs thoraciques),
- Si vous avez des antécédents de crise cardiaque, pontage coronarien, maladie des artères périphériques (mauvaise circulation dans les jambes et les pieds due à des artères rétrécies ou bouchées),
- Si vous avez eu un accident vasculaire cérébral, quelle que soit la sorte, y compris un accident ischémique transitoire. L'**étoricoxib** pourrait légèrement augmenter le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral. Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **ARIBX®, comprimé pelliculé** si :

- Vous avez des antécédents de saignement ou d'ulcère de l'estomac,
- Vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongés,
- Vous avez des œdèmes dus à une rétention d'eau,
- Vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,
- Vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. **ARIBX®, comprimé pelliculé** peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses. Votre médecin peut avoir besoin de contrôler votre tension artérielle plus régulièrement,
- Vous avez des antécédents de maladie du foie ou des reins,
- Vous avez des traitements anti-infectieux. **ARIBX®, comprimé pelliculé** peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection,
- Vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.

À l'usage externe

LOT : 230726
EXP : 05/2026
PPV : 134,40DH

En particulier, si vous prenez l'un de vos médicaments peut être amené à modifier le traitement par **ARIBX®, comprimé pelliculé**, car ces médicaments agissent correcteurs de la warfarine,

- Médicaments qui fluidifient le sang (comme la warfarine),
- Rifampicine (un antibiotique),
- Méthotrexate (un médicament utilisé dans la polyarthrite rhumatoïde),
- Ciclosporine ou tacrolimus (immunosuppresseurs),
- Lithium (médicament pour la dépression),
- Médicaments pour aider à contrôler l'insuffisance cardiaque appelée insuffisance cardiaque (comme la digoxine),
- Médicaments pour aider à contrôler la conversion (par exemple les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine et le valsartan),
- Diurétiques,
- Digoxine (médicament pour traiter le rythme cardiaque irrégulier),
- Minoxidil (médicament pour traiter l'hypertension),
- Salbutamol en comprimé (médicament pour traiter l'asthme),
- Pilule contraceptive (l'association d'effets secondaires),
- Traitement hormonal substitutif.

peut augmenter votre risque d'effets indésirables.

Aspirine car le risque d'ulcère de l'estomac et de saignement est augmenté.

vous prenez **ARIBX®, comprimé pelliculé** à faibles doses. Si vous prenez des doses plus fortes, votre médecin vous dira comment ajuster votre traitement.

- Aspirine en prévention d'un accident vasculaire cérébral.

ARIBX®, comprimé pelliculé à faibles doses. Si vous prenez des doses plus fortes, votre médecin vous dira comment ajuster votre traitement.

- Aspirine et autres médicaments stéroïdiens (AINS) :

Ne prenez pas d'aspirine ou d'autres médicaments stéroïdiens pendant le traitement par **ARIBX®, comprimé pelliculé**.

ARIBX®, comprimé pelliculé à faibles doses. Si vous prenez des doses plus fortes, votre médecin vous dira comment ajuster votre traitement.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse

Les comprimés pelliculés de **ARIBX®, comprimé pelliculé** pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou en cas de désir d'enfant, consultez votre médecin avant de prendre les comprimés.

Consultez votre médecin si vous avez besoin de plus de conseils.

Allaitement

Le passage de l'**étoricoxib** dans le lait maternel n'a pas été étudié.

visage de **ARIBX®, comprimé pelliculé**, car ces médicaments agissent correcteurs de la warfarine,

pelliculé et d'accident vasculaire cérébral, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant déjà eu des problèmes cardiaques ou un accident vasculaire cérébral.

Si vous pensez que l'un de ces points vous concerne, ne prenez pas les comprimés sans avoir consulté votre médecin au préalable.

Si vous êtes déshydraté(e), par exemple à cause d'accès prolongés de vomissements ou de diarrhée prolongés,

Si vous avez des œdèmes dus à une rétention d'eau,

Si vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou de toute autre forme de maladie cardiaque,

Si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle. **ARIBX®, comprimé pelliculé** peut augmenter la tension artérielle chez certains patients, en particulier lorsqu'il est utilisé à hautes doses.

Si vous avez des traitements anti-infectieux. **ARIBX®, comprimé pelliculé** peut masquer une fièvre, qui peut être un signe d'infection,

Si vous avez du diabète, du cholestérol élevé ou vous êtes fumeur. Cela peut augmenter votre risque de maladie cardiaque.

À l'usage externe

ARIBX®, comprimé pelliculé à faibles doses. Si vous prenez des doses plus fortes, votre médecin vous dira comment ajuster votre traitement.

3. COMMENT PRENDRE **ARIBX®, comprimé pelliculé** ?

Veuillez à toujours prendre

moins de 16 ans.

Autres médicaments et **ARIBX®, comprimé pelliculé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

KALEST 20 mg
-[DCI : Oméprazole]
Gélules gastro-résistantes en boîtes de 7, 14 et 28

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE KALEST 20 mg, gélule gastro-résistante ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - Code ATC : A02BC01.

Indications thérapeutiques

KALEST 20 mg contient la substance active Oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

KALEST 20 mg est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Adultes

- Traitement des ulcères duodénaux.
- Prévention des récidives d'ulcères duodénaux.
- Traitement des ulcères gastriques.
- Prévention des récidives d'ulcères gastriques
- En association à des antibiotiques appropriés, éradication de *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) dans la maladie ulcéreuse gastroduodénale.

• Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

• Prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) chez les patients à risque.

• Traitement de l'œsophagite par reflux.

• Traitement d'entretien des patients après cicatrisation d'une œsophagite par reflux.

• Traitement du reflux gastro-œsophagien symptomatique.

• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison

Enfants à partir d'un an et ≥ à 10 kg :

• Traitement de l'œsophagite par reflux.

• Traitement symptomatique du pyrosis et des régurgitations acides en cas de reflux gastro-œsophagien.

Enfants de plus de 4 ans et adolescents :

• Association à des antibiotiques, traitement de l'ulcère duodénal consécutif à une infection par *H.pylori*.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE KALEST 20 mg, gélule gastro-résistante ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais KALEST 20 mg, gélule gastro-résistante :

• Si vous êtes allergique à l'Oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament ;

• Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple Pantoprazole, Lanzoprazole, Rabéprazole, Esoméprazole) ;

• Si vous prenez un médicament contenant du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH) ;

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmière avant de prendre KALEST.

KALEST peut masquer des symptômes d'une autre affection. Si vous commencez un traitement, vous devez informer votre médecin de tous les médicaments que vous prenez.

Les effets indésirables suivants se produisent :

• Si vous perdez du poids sans raison ;

• Si vous avez des douleurs à l'estomac ;

• Si vous vomissez de la nourriture ;

• Si vous avez des selles noires ;

• Si vous souffrez de diarrhée sévère ou si vous avez une augmentation de la transpiration ;

• Si vous avez des problèmes hépatiques ;

• Si vous avez déjà eu des réactions allergiques à un médicament similaire à KALEST ;

• Si vous devez faire un examen sanguin ;

Si vous prenez KALEST à long-cours (durée de traitement supérieure à 4 semaines), votre médecin vous surveillera probablement de façon précise tous les symptômes et événements pendant que vous prenez ce médicament.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons sur une période supérieure à un an, peut entraîner la fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres.

Si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez un médicament qui augmente le risque d'ostéoporose.

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier au soleil, prévenez votre médecin dès que possible. Cela peut être votre traitement avec KALEST.

Il y a également tout autre effet indésirable tel que l'intolérance au lactose ou à la fructose, un syndrome de malabsorption du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase.

Ce médicament contient « du méthyl paraben » qui peut provoquer des réactions allergiques.

Enfants et adolescents

Certains enfants atteints d'une maladie chronique ne doivent pas prendre ce médicament à long terme bien que cela ne soit pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et KALEST 20 mg, gélule gastro-résistante

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou devez prendre tout autre médicament. Cela est important car certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST.

Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien de tous les médicaments que vous prenez.

KALEST peut interagir sur le fonctionnement de certains médicaments.

Certains médicaments peuvent avoir un effet sur KALEST. Vous ne devez pas prendre KALEST, si vous prenez du Nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

LOT 221877
EXP 08/2025
PPV 42.00DH



BENABIDA

HABIB

وصفة
ORDONNANCE

le 05-02-24

M BENABIDA

HABIB

Don

Dr. Souad FAIZ
Rhumatologue
Ostreopathie
Radiographie Osteoarticulaire
Rhumatologie Interventionnelle

RADIOLOGIE SIDI OTMANE SARL
Sidi Otmane, Casablanca
Avenue 10 Mars Place de la priade
RC 4868211/F : 2821070
RC 001754813000087

RSO

مركز الفحص بالأشعة سيدي عثمان RADIOLOGIE SIDI OTHMANE



Dr. Jamal HAROÛCH

Diplômé de la Faculté de Médecine de Montpellier
Ancien Praticien Hospitalier au C.H.U. de Fort de France

Dr. M. Jalil KOUHEN

Spécialiste en Radiologie et Imagerie Médicale

Dr. El. HAMMAOUNI Hanane

Spécialiste en Radiologie et Imagerie Médicale
Imagerie de la femme et de l'enfant

الدكتور جمال الهاروش

خريج كلية الطب بمونبولي
طبيب سابق بالسبستشفى الجامعي فوردو فرانس

الدكتور محمد جليل كوهن

إختصاصي في الفحص بالأشعة

الدكتورة الحمادي حنان

أخصائية في الفحص بالأشعة
أمراض النساء و الأطفال

Casablanca, le 06/02/2024

FACTURE

Facture N°24242/2024

Nom et Prénom : BENABIDA HABIBA

Examen(s) réalisé(s) :	
PANGONOGRAMME	
600 DH	

600 DH	
TOTAL :	600 DH

Soit un montant total T.T.C de :600 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

SIX CENTS DH

RADIOLOGIE SIDI OTHMANE S.A.R.L
Avenue 10 Mars Place de la préfecture
Sidi Othmane - Casablanca
RC 486021/IF 2821070
ICE 001754813000087

شارع 10 مارس، ساحة عمالة سيدي عثمان - الدار البيضاء - الهاتف : 05.22.59.49.49

Av. 10 mars, place de la préfecture - Sidi Othmane - Casablanca - Tél. : 05.22.59.49.49

RC : 486021 IF : 2821070 - Patente : 32723872 - CNSS : 6350376 - ICE : 001754813000087

RSO

مركز الفحص بالأشعة سيدي عثمان RADIOLOGIE SIDI OTHMANE



090000845

Dr. Jamal HAROUCH

Diplômé de la faculté de médecine de Montpellier
Ancien. Particien Hospitalier au C.H.U. de Fort de France

Dr. M. Jalil KOUHEN

Spécialiste en Radiologie et Imagerie Médicale

الدكتور جمال اهاروش

خريج كلية الطب بمونبولي. فرنسا
طبيب سابق بالمستشفى الجامعي فوردو فرانس

الدكتور محمد جليل كوهن

إختصاصي في الفحص بالأشعة

Casablanca le: 06/02/2024

Patient : **BENABIDA HABIBA**

Prescripteur : **DR SOUAD FAIZ**

PANGONOGRAMME

L'angle mécanique de la moitié des têtes fémorales à la moitié de l'articulation du genou jusqu'à la moitié de la ligne bimalléolaire est mesuré à 2,6° à droite et 09° à gauche.
La longueur des membres inférieurs est mesurée de la moitié de la tête fémorale jusqu'à la moitié de la ligne bimalléolaire à 74,3 cm à droite et à 74,6 cm gauche.
Bascule du bassin à droite de 7 mm.

DR EL HAMMAOUI HANANE

RADIOLOGIE SIDI OTHMANE
Dr Hanane EL HAMMAOUI
Radiologue
Tél 05 22 59 49 49

RADIOLOGIE SIDI OTHMANE S.A.R.L
Avenue 10 Mars Place de la préfecture
Sidi Othmane, Casablanca
RC 486021/IF : 2821070
ICE 001754813000087

شارع 10 مارس، ساحة عمالة سيدي عثمان - الدار البيضاء - هاتف : 05.22.59.49.49

Av. 10 mars, place de la préfecture - Sidi Othmane - Casablanca - Tél. : 05.22.59.49.49

RC : 486021-IF : 2821070 - Patente : 32723872 - CNSS : 6350376 - ICE : 001754813000087

POLYCLINIQUE C.N.S.S - INARA
Bd El-Qods Cité Inara 20150 CASABLANCA
Tél : 0522-21-30-90 (L.G) Fax : 0522-50-48-06
RDV : 0522-50-45-13
INPE: 090001520 ICE: 001757364000080 IF: 1602058

خلف
9



8

N° IPP : 994803	N° SEJOUR : 240006183	FACTURE N° 2402002054		DATE D'ENTREE : 05/02/2024		DATE DE SORTIE : 05/02/2024					
ASSURE :				DESTINATAIRE : BENABIDA,Habiba							
MALADE : BENABIDA,Habiba		UF: 6001 CONSULTATION MEDICALE ET AUXI									
NOM JEUNE FILLE :		N° IMMAT C.N.S.S. :									
TIERS PAYANT 1 :		N° D'ADHERENT OU DE MUTUALISTE :									
TIERS PAYANT 2 :											
REF. PC 1 :		REF. PC 2 :		N° SE. SOC. ETRANG. :							
NATURE DE PRESTATION		LETTRE CLE	NOMBRE x COEF	PRIX UNITAIRE	TOTAL	TIERS PAYANT 1 % / Dh MONTANT		TIERS PAYANT 2 % / Dh MONTANT		PART DU MALADE % / Dh MONTANT	
CONSULTATION DE MEDECIN.											
CONSULTATION DE SPECIALISTE		Cs	1.00	150.00	150.00					0.00	150.00

Intervenant : 46048 DR FAIZ SOUAD RHUMATOLOGIE	TOTAUX :	150.00						150.00
Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT CINQUANTE DHS	PLAFOND PC :						ACOMPTE:	
	REMISE :	0.00	REGLE :				AVOIR :	
	RESTE DU:	150.00						
DATE FACTURE : 05/02/2024	EDITEE LE : 05/02/2024	PAR: ZARIA	ACCIDENT DE TRAVAIL :					
VISA			N° DE POLICE :		DATE AT :			
			Règlement à effectuer à l'ordre de :		POLYCLINIQUE C.N.S.S - INARA			
			BANQUE :		BMCE - INARA			
			N° compte bancaire :		011.780.0000 54 210 00 60 016 91			

