

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 -



couple
RAM.
756042085

Déclaration de Maladie

M23- N° 0034707

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2085 Société : R-A-M

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : FKIHANE Mohamed

Date de naissance : 1949

Adresse : 23, Rue 232, Hay M.Y. Abdallah - CAA

Tél. : 0661159857 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Professeur EL MARINI Mohamed
Chirurgien Urologue
H. H. Adalmeouen - Casablanca
Tél: 05 22 22 78 18

Date de consultation : 09/02/2024

Nom et prénom du malade : FKIHANE Mohamed Age :

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection Macular

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Praticien attestant le Paiement des Actes
09/02/2024		3	\$300dh	Mme EL MARI Mohamed Chirurgien Urologue Jelmoumen - Casablanca Tél: 05 22 25 88 23

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Mme EL MARI Mohamed Pharmacien N° 69 Ann Chort Casablanca Tél: 21.95.37	09/02/2024	196,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Mme EL MARI Mohamed Chirurgien Urologue Jelmoumen - Casablanca Tél: 05 22 25 88 23	09/02/2024	2500F/L	\$500dh
	12/2/2024	3000+P4	42700dh

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX														
				MONTANTS DES SOINS														
				DEBUT D'EXECUTION														
				FIN D'EXECUTION														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>			H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	H																	
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS														
				DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION															

CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



MERINID
UROLOGY
CENTER

- Endo-urologie • Onco-urologie • Coeliochirurgie
- Pelvi-périnéologie

Casablanca, le

09 FEB. 2024

Pr. EL MRINI Mohammed

Chirurgien Urologue
Membre de la Société Internationale
d'Urologie

melmrini@hotmail.com

Dr. EL MRINI Mohamed

Chirurgien Urologue
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

elmrini_mohamed@hotmail.fr



Handwritten notes and stamps:
- Stamps: "i/s", "HABITAT", "M. EL MRINI Mohamed", "Chirurgien Urologue", "76, Bd. Abdelmeoumen - Casablanca", "Tél: 05 22 25 36 36 - Fax: 05 22 25 88 80".
- Notes: "121140 x", "Vmax", "Ay u na x 2m", "74180", "Sepuun Smo", "Chir 2h 15", "196, 20".
- Signature: "Professeur EL MRINI Mohamed".

05 22 25 36 36 - 05 22 25 88 80 - 06 97 58 46 60

34.Rue des Courlis, Riviera, Oasis - Casablanca

UMAX® 400 µg LP

Microgranules à libération prolongée en gélules - Boîtes de 10,30 et de 60 (Tamolusine)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que UMAX® 400 µg LP Gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre UMAX® 400 µg LP Gélule ?
3. Comment prendre UMAX® 400 µg LP Gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver UMAX® 400 µg LP Gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE UMAX® 400 µg LP Gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Alpha-bloquants / Médicaments utilisés dans l'hypertension bénigne de la prostate - code ATC : G04CA02

UMAX® 400 µg LP Gélule contient de la tamolusine, une substance qui appartient à une famille de médicaments appelée alpha-bloquants.

UMAX® 400 µg LP Gélule est utilisé dans le traitement de certains troubles qui peuvent vous empêcher d'uriner normalement suite à une augmentation de volume (hypertrophie) bénigne de votre prostate.

Ce médicament est utilisé uniquement chez l'homme dans le traitement des douleurs du bas appareil urinaire associé à un élargissement de la glande prostatique (hypertrophie bénigne de la prostate). Ces douleurs peuvent être des difficultés à uriner (débüt, urinaire faible), miction goutte à goutte, besoin urgent d'uriner et envie d'uriner fréquemment aussi bien la nuit que le jour.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE UMAX® 400 µg LP Gélule ?

Ne prenez jamais UMAX® 400 µg LP Gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la tamolusine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6).
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à un médicament de la même famille (les alpha-bloquants).
- Si vous avez déjà eu des gonflements (oedèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses) après avoir pris ce médicament.

- Si vous avez déjà eu auparavant une baisse de votre tension artérielle lors d'un passage de la position couchée à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges et de malaises (hypotension orthostatique).

- Si vous avez une maladie sévère du foie (insuffisance hépatique sévère).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre UMAX® 400 µg LP Gélule.

Vous devez prévenir votre médecin si :

- Vous prenez des médicaments pour traiter une tension artérielle élevée (antihypertenseurs).
- Vous avez déjà eu des malaises alors que vous urinez ou après avoir uriné (syncope mictionnelle).
- Vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale chronique).
- Vous avez plus de 65 ans.
- Vous avez des maladies du cœur (patient coronarien). En aggravation d'un angor, le traitement par ce médicament devra être interrompu.

Pendant le traitement, si vous avez des gonflements (oedèmes) du visage, des lèvres et de certaines parties de votre corps (les muqueuses), cela peut être le signe d'une réaction allergique au médicament. Dans ce cas, vous devez arrêter le traitement et consulter immédiatement votre médecin. Des malaises peuvent survenir rarement avec UMAX® 400 µg LP Gélule. Des médicaments apparentés. Aux premiers signes de vertiges ou de faiblesse, vous devez vous asseoir ou vous allonger jusqu'à ce que

sensations de malaise disparaissent.

Si vous devez vous faire opérer de la cataracte ou du glaucome

Si vous devez vous faire opérer prochainement de la cataracte (opacité du cristallin) ou du glaucome, et si vous avez été ou êtes actuellement ou prévoyez d'être traité par UMAX® 400 µg LP Gélule, informez-en votre ophtalmologiste avant l'opération.

Le chirurgien pourra prendre des précautions appropriées en fonction de votre traitement au moment de l'intervention chirurgicale.

Recommandations concernant votre hygiène de vie

Durant le traitement vous devez respecter certaines mesures d'hygiène de vie et notamment :

- conserver une activité physique (marcher, courir ou faire du sport...),
- faites attention à votre alimentation : ne pas faire de repas trop riches, trop épicés et/ou trop alcoolisés,
- ne buvez pas trop le soir,
- maintenez un transit intestinal régulier.

Enfants

Ne donnez pas ce médicament à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans, car il n'a pas d'effet thérapeutique dans cette population.

Mentions relatives aux excipients à effet notoire :

- Saccharose : L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients, présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrose/isomaltase (maladies héréditaires rares).
- Colorants azoïques (azorubine, carmoisine et jaune orangé FCF) : Ce médicament contient des agents colorants azoïques et peut provoquer des réactions allergiques.

- Hydroxybenzoate de méthyle et de propyle : Ce médicament contient du « Parahydroxybenzoate » peut provoquer des réactions allergiques.

Autres médicaments et UMAX® 400 µg LP Gélule

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ en association avec des médicaments de la même classe thérapeutique (alpha-1 bloquants). Cette association peut entraîner une diminution de la tension artérielle.

Informez votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Il est important d'informer votre médecin si vous êtes traités en même temps avec des médicaments qui peuvent diminuer l'élimination de UMAX® 400 µg LP Gélule (par exemple kétoconazole, érythromycine).

UMAX® 400 µg LP Gélule avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité

UMAX® 400 µg LP Gélule n'est pas indiqué chez la femme. La tolérance de ce médicament au cours de la grossesse et son passage dans le lait maternel ne sont pas connus.

Chez l'homme, une éjaculation anormale a été rapportée (troubles de l'éjaculation).

Cela signifie que le sperme ne sort pas par l'urètre mais se dirige vers la vessie (éjaculation rétrograde) ou bien le volume d'éjaculation est diminué ou absent (échec de l'éjaculation). Ce phénomène est sans gravité.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament peut provoquer une baisse de la tension lors du passage à la position debout, des vertiges ou des malaises, notamment en début de traitement. Soyez prudent. Il est déconseillé de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine si vous ressentez l'un de ces effets.

3. COMMENT PRENDRE UMAX® 400 µg LP Gélule ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Prenez UMAX® 400 µg LP Gélule une seule fois, de préférence le soir, avec un verre d'eau.

Ne prenez pas de repas trop riches, trop épicés et/ou trop alcoolisés, ne buvez pas trop le soir.

Maintenez un transit intestinal régulier.

Ne prenez pas de repas trop riches, trop épicés et/ou trop alcoolisés, ne buvez pas trop le soir.

Maintenez un transit intestinal régulier.

Ne prenez pas de repas trop riches, trop épicés et/ou trop alcoolisés, ne buvez pas trop le soir.

Maintenez un transit intestinal régulier.

prenez-la au cours d'un repas de la journée.

Durée du traitement

Ce traitement nécessite une surveillance nécessaire de la poursuite plusieurs semaines. Habituellement, UMAX® 400 µg LP Gélule est prise une fois par jour, à jeun, pendant la durée du traitement.

Si vous avez pris plus de UMAX® 400 µg LP Gélule :

Contactez rapidement un médecin et informez-le de la situation.

Si vous oubliez de prendre UMAX® 400 µg LP Gélule :

Si vous avez oublié 1 jour de traitement, poursuivez le traitement suivant mais poursuivez le traitement par jour.

Ne prenez pas de dose double pour compenser l'oubli de prendre.

Si vous arrêtez de prendre UMAX® 400 µg LP Gélule :

Si vous arrêtez de prendre votre médicament, vous pouvez ressentir des symptômes fonctionnels de l'hypertension artérielle.

C'est pourquoi il est impératif de continuer votre traitement jusqu'à ce que votre médecin vous l'ait prescrit, même si vous ne sentez rien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne sont pas toujours graves.

Les effets suivants surviennent très fréquemment :

- des étourdissements, surtout lors du passage de la position couchée à la position debout.

- une éjaculation anormale (troubles de l'éjaculation) : le sperme ne sort pas par l'urètre mais se dirige vers la vessie (éjaculation rétrograde) ou bien le volume d'éjaculation est diminué ou absent (échec de l'éjaculation). Ce phénomène est sans gravité.

Les effets suivants surviennent peu fréquemment :

- des maux de tête,

- des palpitations (le cœur bat plus vite que d'habitude),

- une baisse de la tension artérielle, ce qui peut entraîner une baisse de la tension artérielle, ce qui peut entraîner une baisse de la tension artérielle, ce qui peut entraîner une baisse de la tension artérielle,

- un nez bouché et un nez qui coule (rhinite),

- des diarrhées, des nausées et des vomissements,

- une fatigue (asthénie),

- des éruptions et des démangeaisons cutanées.

Les effets suivants surviennent très rarement :

- un malaise (syncope),

- une allergie que vous reconnaîtrez par des éruptions cutanées, des démangeaisons, des éruptions cutanées (angioedème).

Les effets suivants surviennent très rarement :

- une érection prolongée et douloureuse qui doit être traitée immédiatement.

Les effets suivants surviennent très rarement :

- une érection prolongée et douloureuse qui doit être traitée immédiatement.

Les effets suivants surviennent très rarement :

- une érection prolongée et douloureuse qui doit être traitée immédiatement.

Les effets suivants surviennent très rarement :

- une érection prolongée et douloureuse qui doit être traitée immédiatement.

Les effets suivants surviennent très rarement :

- une érection prolongée et douloureuse qui doit être traitée immédiatement.

maladie de Behçet, l'hypertension artérielle ou une athérosclérose connue, la polyarthrite rhumatoïde (une maladie des articulations) ou l'endocardite (une infection du cœur) ;

- Si vous avez des problèmes cardiaques. Ce type de médicament doit être utilisé avec prudence si vous êtes (né(e) ou avez des antécédents) sans ou avec prolongation de l'intervalle QT (anomalie observée à l'ECG, qui est un enregistrement électrique de l'activité cardiaque), si vous présentez un déséquilibre électrolytique dans le sang (en particulier des faibles concentrations de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si votre cœur est affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez déjà eu une crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme ou une personne âgée ou si vous prenez d'autres médicaments qui entraînent des anomalies au niveau de l'ECG (voir la rubrique **Prise d'autres médicaments**).

Pour le traitement de certaines infections de l'appareil génital, votre médecin peut vous prescrire un autre antibiotique en association à **SEPCEN®**. Si aucune amélioration des symptômes n'est observée après 3 jours de traitement, veuillez consulter votre médecin.

Pendant la prise de SEPCEN® :

Prévenez immédiatement votre médecin, si l'un des troubles suivants se produit pendant que vous prenez **SEPCEN®**. Votre médecin déterminera si le traitement par **SEPCEN®** doit être interrompu.

- Réaction allergique sévère et soudaine (réaction/choc anaphylactique, œdème de Quincke). Dès la première dose, il existe un faible risque que vous présentiez une réaction allergique sévère, qui se manifeste par les symptômes suivants : oppression dans la poitrine, vertiges, nausées ou évanouissements, ou vertiges lors du passage en position debout. Si vous ressentez ces symptômes, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et contactez immédiatement votre médecin.

- Effets indésirables graves, durables, invalidants et potentiellement irréversibles. Les médicaments antibactériens de type fluoroquinolone/quinolone, y compris **SEPCEN®**, ont été associés à des effets indésirables très rares mais graves, dont certains peuvent être persistants (durant des mois ou des années), invalidants ou potentiellement irréversibles. Il s'agit notamment de douleurs dans les tendons, les muscles et les articulations des membres supérieurs et inférieurs, de difficultés à marcher, de sensations anormales telles que des fourmillements, des picotements, des chatouillements, un engourdissement ou une sensation de brûlure (paresthésies), de troubles sensoriels incluant des troubles de la vue, du goût, de l'odorat et de l'audition, d'une dépression, de troubles de la mémoire, d'une fatigue intense et de troubles sévères du sommeil.

Si vous présentez l'un de ces effets indésirables après avoir pris **SEPCEN®**, contactez immédiatement votre médecin avant de poursuivre le traitement. Vous déciderez avec votre médecin de la poursuite de votre traitement en envisageant également le recours à un antibiotique d'une autre famille.

- Une douleur et un gonflement au niveau des articulations ainsi qu'une inflammation ou une rupture des tendons peuvent survenir dans de rares cas. Le risque est plus important si vous êtes âgé(e) (à plus de 60 ans), si vous avez eu une greffe d'organe, si vous avez des problèmes rénaux ou si vous prenez un traitement par des corticoïdes. L'inflammation et les ruptures de tendons peuvent se produire dès les premières 48 heures du traitement et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt du traitement par **SEPCEN®**. Dès les premiers signes de douleur ou d'inflammation d'un tendon (par exemple au niveau de la cheville, du poignet, du coude, de l'épaule ou du genou), arrêtez de prendre **SEPCEN®**, contactez votre médecin et mettez le membre atteint au repos. Évitez tout effort inutile car cela pourrait augmenter le risque de rupture d'un tendon.

- Si vous ressentez une douleur soudaine et intense au niveau de l'abdomen, de la poitrine ou du dos, qui peuvent être des symptômes d'un anévrysme et d'une dissection aortiques, rendez-vous immédiatement au service d'urgence d'un hôpital. Votre risque peut être augmenté si vous êtes traité(e) avec des corticostéroïdes administrés par voie générale.

- Si vous ressentez soudainement un essoufflement, en particulier lorsque vous vous allongez sur votre lit, ou si vous remarquez un gonflement de vos chevilles, de vos pieds ou de votre abdomen, ou une nouvelle apparition de palpitations cardiaques (sensation de battements de cœur rapides ou irréguliers), vous devez en informer un médecin immédiatement.

- Si vous souffrez d'épilepsie ou d'autres affections neurologiques comme une ischémie cérébrale ou un accident vasculaire cérébral, des effets indésirables affectant le système nerveux central pourraient se produire. Si tel était votre cas, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et contactez immédiatement votre médecin.

- Dans de rares cas, des symptômes d'atteinte nerveuse (neuropathie) tels que des douleurs, une sensation de brûlure, des picotements, un engourdissement et/ou une faiblesse musculaire peuvent survenir, en particulier au niveau des pieds et des jambes ou des mains et des bras. Dans ce cas, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et informez-en immédiatement votre médecin afin de prévenir une évolution vers un état potentiellement irréversible.

- Des réactions psychiatriques peuvent se produire la première fois que vous prenez **SEPCEN®**. Si vous souffrez de dépression ou de psychose, vos symptômes pourraient s'aggraver lors du traitement par **SEPCEN®**. Si cela se produit, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et contactez immédiatement votre médecin.

- Les antibiotiques de la famille des quinolones peuvent interférer avec la production de votre propre sucre dans le sang au-dessus de la valeur normale (hyperglycémie) ou en dessous de la valeur normale (hypoglycémie) dans les cas graves (voir rubrique 4). Qu'il est important à prendre en compte pour les patients diabétiques. Le sucre dans le sang doit être étroitement surveillé.

- Vous pouvez souffrir de diarrhées lorsque vous prenez plusieurs semaines après que vous ayez arrêté de prendre **SEPCEN®**, ou si vous remarquez que vos selles deviennent aqueuses. Arrêtez de prendre **SEPCEN®** car votre vie peut être affectée. Si vous ressentez ces symptômes, contactez immédiatement votre médecin afin de prévenir une évolution vers un état potentiellement irréversible.

- Si vous avez des troubles de la vision ou si vous voyez des halos autour des objets, consultez immédiatement un ophtalmologiste.

- Votre peau devient plus sensible au soleil ou aux rayons ultraviolets (UV) lorsque vous prenez **SEPCEN®**. Évitez de vous exposer de façon prolongée au soleil ou à des rayons UV artificiels tels que ceux utilisés dans les cabines de bronzage.

- Si vous devez subir un prélèvement de sang ou d'urine, prévenez le médecin ou le personnel du laboratoire d'analyses que vous prenez **SEPCEN®**.

- Si vous avez des problèmes rénaux, prévenez votre médecin car la dose de **SEPCEN®** devra éventuellement être adaptée.

- **SEPCEN®** peut provoquer des lésions hépatiques. Si vous remarquez des symptômes tels que : perte de l'appétit, ictère (jaunisse), urines foncées, décolorations ou sensibilité de l'estomac à la palpation, arrêtez de prendre **SEPCEN®** et contactez immédiatement votre médecin.

- **SEPCEN®** peut entraîner une diminution du nombre de globules blancs, et réduire votre résistance aux infections.

Si vous présentez une infection au cours d'un traitement par **SEPCEN®**, votre médecin peut vous prescrire un autre antibiotique en association à **SEPCEN®**. Si aucune amélioration des symptômes n'est observée après 3 jours de traitement, veuillez consulter votre médecin.

Autres médicaments et SEPCEN® : Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne prenez pas **SEPCEN®** en même temps que la prise d'autres médicaments, car cela pourrait augmenter la probabilité d'effets indésirables.

Prévenez votre médecin si vous prenez :

- Des antivitamines K (exemple : la warfarine) ou des anticoagulants.

- Du probénécide (utilisé pour traiter la goutte).
- Du méthotrexate (utilisé pour traiter certains types de cancer).
- De la théophylline (utilisée pour traiter les problèmes respiratoires).
- De la tizanidine (utilisée pour traiter les problèmes musculaires).

- Dlanzapine (un antipsychotique).
- De la clozapine (un antipsychotique).
- Du ropinirole (utilisé pour traiter la maladie de Parkinson).
- Du phénylène (utilisé pour traiter l'épilepsie).
- Du metoprolol (utilisé dans les nausées et le vomissement).
- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).

- Du ciprofloxacine (utilisée dans les maladies de peau).



MERINID
UROLOGY
CENTER

- Endo-urologie • Onco-urologie • Coeliochirurgie
- Pelvi-périnéologie

Casablanca, le

09/02/2024

Pr. EL MRINI Mohammed

Chirurgien Urologue

Membre de la Société Internationale
d'Urologie

melmrini@hotmail.com

Dr. EL MRINI Mohamed

Chirurgien Urologue

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

elmrini_mohamed@hotmail.fr

NOTE DHONORAIRES

NOM FKI HANE

PRENOMS : MOHAMED

1. CONSULTATION $C_3 = 300,00DHS$

2. ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICO-PROSTATIQUE

$Z_{35+35/2} = 500,00DHS$

TOTAL = 800,00DHS


(HUIT CENT DIRHAMS)

Chirurgien Urologue
Dr. EL MRINI Mohamed
Chirurgien Urologue
Hôpital Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 05 22 25 36 36 - Fax: 05 22 25 88 80



☎ 05 22 25 36 36 - 05 22 25 88 80 - ☎ 06 97 58 46 60

📍 34. Rue des Courlis, Riviera, Oasis - Casablanca



MERINID
UROLOGY
CENTER

- Endo-urologie • Onco-urologie • Coeliochirurgie
- Pelvi-périnéologie

Casablanca, le

09/02/2024

Pr. EL MRINI Mohammed

Chirurgien Urologue

Membre de la Société Internationale
d'Urologie

melmrini@hotmail.com

Dr. EL MRINI Mohamed

Chirurgien Urologue

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

elmrini_mohamed@hotmail.fr

COMPTE RENDU D'ECHOGRAPHIE RENALE ET

VESICO-PROSTATIQUE

NOM : MR FKIHANE MOHAMED

Examen pratique le : 09/02/2024

Indication : Prostatisme chronique.

Le rein droit : de taille normale, de d'échostructure normale, sans
dilatation des voies excrétrices.

Le rein gauche : de taille normale, de d'échostructure normale, sans
dilatation des voies excrétrices, siége d'un kyste cortical vide d'échos
mesurant 6cm de diamètre

La vessie : bien remplie, vide d'échos, a parois irrégulière
témoignant une vessie de lutte.

La prostate : régulière, d'échostructure hétérogène, évaluée a 73g.

Résidu post-mictionnel de moyenne abondance.



Professeur EL MRINI Mohamed
Chirurgien Urologue
76, B.1. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 05 22 25 36 36 - Fax: 05 22 25 88 80

☎ 05 22 25 36 36 - 05 22 25 88 80 - ☎ 06 97 88 46 60

📍 34.Rue des Courlis, Riviera, Oasis - Casablanca

• Endo-urologie • Onco-urologie • Coeliochirurgie
• Pelvi-périnéologie

Casablanca, le 09 FEV. 2024

Pr. EL MRINI Mohammed

Chirurgien Urologue
Membre de la Société Internationale
d'Urologie

melmrini@hotmail.com

Dr. EL MRINI Mohamed

Chirurgien Urologue
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

elmrini_mohamed@hotmail.fr



n MICHAËLE MURMEL

LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA
679, Bd Al Qods 20460 - Casablanca
Tél. : 05 22 52 83 88
Fax : 05 22 52 83 88

PSA

Professeur EL MRINI Mohamed
Chirurgien Urologue
76, P.4. Abdelmoumen - Casablanca
Tél: 0522 25 36 36 - Fax: 0522 25 36 80



مختبر منظرنا للتحاليل الطبية
LABORATOIRE MANDARONA
D'ANALYSES MEDICALES

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste
Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste
Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Casablanca le 12 février 2024

Monsieur FKIHANE MOHAMED

FACTURE N°	200005
------------	--------

Analyses :

PSAus total -----	B	300	Total : B 300
-------------------	---	-----	---------------

Prélèvements :

Sang-----	Pc	1,5
-----------	----	-----

TOTAL DOSSIER

427,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Quatre Cent Vingt Sept Dirhams

LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA

679, Bd Al Qods 20460 - Casablanca

Tél. : 05 22 52 83 88

Fax : 05 22 52 83 88

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347



مختبر منظرنا للتحاليل الطبية
LABORATOIRE MANDARONA
D'ANALYSES MEDICALES

Dr Yahya BENGHALEM

Pharmacien Biologiste
Lauréat de la faculté de Pharmacie de
Montpellier

Dr Abderrahmane BOUMZEBRA

Pharmacien Biologiste
Diplômé des facultés de Médecine et de Pharmacie de
Toulouse et Montpellier

Biochimie - Hématologie - Hormonologie - Bactériologie - Virologie - Immunologie - Parasitologie - Mycologie - Toxicologie

Dossier ouvert le : 12/02/24

Prélèvement effectué à 10:52

Edition du : 12/02/24

Monsieur FKIHANE MOHAMED

Docteur MOHAMED EL MRINI

Réf. : 24B652

Compte Rendu d'Analyses

MARQUEURS

Normales

Antériorités


P.S.A. us Total ----- : 3,720 ng/ml
(Chimiluminescence COBAS ROCHE E411)

11/10/22

2,890

Interprétation

< 40ans	:	< 1,4
40 à 50 ans	:	< 2,0
50 à 60 ans	:	< 3,1
60 à 70 ans	:	< 4,1
> 70 ans	:	< 4,4



LABORATOIRE ANALYSES
MEDICALES MANDARONA
C79, Bd Al Qods 20460 - Casablanca
Tél. : 05 22 52 83 88
Fax : 05 22 21 92 41

679, Bd El Qods 20460 Ain Chock - Casablanca - Tél. : 0522 52 83 88 / 0522 87 22 82

Fax : 0522 21 92 41 - E-mail : labo_mandarona@yahoo.fr

CNSS : 8521090 - IF : 40213596 - Patente : 37980291 - ICE : 001634915000055 - IPN : 093060663

BMCE AL QODS : 0117940000 3121000 0144347