

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0051177

☒ **Maladie**

☐ **Dentaire**

☐ **Optique**

☐ **Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **4887**

Société : **RAM**

203103

☐ **Actif**

☐ **Pensionné(e)**

☐ **Autre :**

Nom & Prénom : **KTIRI AMINA**

Date de naissance :

Adresse : **Habituelle**

Tél : **06 66 93 96 26**

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

D. BENOUGHOUH Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges R. - Lot 11/65
3^{ème} Etage - Oulfa Al Wilag Ferrara
+212 5 22 653 861

Date de consultation : **29/03/2024**

Nom et prénom du malade : **KTIRI Amina**

Age :

Lien de parenté :

☐ **Lui-même**

☐ **Conjoint**

☐ **Enfant**

Nature de la maladie : **Bronchite depuis 1 an**

Affection longue durée ou chronique : ☐ **ALD** ☐ **ALC**

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : **24/04/2024**

Signature de l'adhérent(e) : **Amina**

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/07/2024	Cous	259,00		Dr. BENOUHOUD Nawal Pneumologue Rond point El Oufia 3ème Etage - Oufia Al Wilag Ferraraj 3ème Etage - Oufia Al Wilag Ferraraj 3ème Etage - Oufia Al Wilag Ferraraj
	INPE : 091035188			
30/07/2024	Contrôle futur			
	INPE : 091035188			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
--	------	-----------------------

MACIE SARANAZ SARANAZ Lot Smiralda 15460 Casablanca Tél/Fax : 05 22 65 20 07	29/07/2024 1 = 444,00
---	--------------------------

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. BENOUHOUD Nawal Pneumologue Rond point El Oufia 3ème Etage - Oufia Al Wilag Ferraraj 3ème Etage - Oufia Al Wilag Ferraraj 3ème Etage - Oufia Al Wilag Ferraraj	29/07/2024	Rx thorax	209,00
Centre de Radiologie El Oufia Bd. Oum Rato - Rue 50 N°2 Casablanca - 20220 Tél : 05 22 93 04 93	29/07/2024	Tm	10,00
Centre de Radiologie El Oufia Bd. Oum Rato - Rue 50 N°2 Casablanca - 20220 Tél : 05 22 93 04 93	29/07/2024	Tm	10,00

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées		Nature des Soins	Coefficient	
					CCEFFICIENT DES TRAVAUX
					MONTANTS DES SOINS
					DEBUT D'EXECUTION
					FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411 B 21433552 00000000 G 00000000 11433553				CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				MONTANTS DES SOINS
					DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Nawal BENOUBHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani

et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

الكبار و الأطفال

الضيق الحساسية داء السل

فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التشخيص بالمنظار

طبيبة سابقا بالمستشفى الحسني

و المستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le

30/03/2024

MME KTIRI AMINA

- ZYLAX 400mg - Comprimé
1CP/J AU MILIEU DU REPAS PDT 14J (2 btes DE 7)
- Apixol - solution buvable
1CAS x 3/j pdt 10J



Dr. BENOUHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond Point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3ème Etage
3ème Etage Oulfa Al Wifaq Ferrara 1
Tél/Fax : +212 5 22 65 88 61

PHARMACIE SARANAL
SARLANO
140 Lot Smirada
Casablanca
Tél/Fax : 05 22 65 20 07

AFR PHAR
LOT
231416
EXP
07/2026
PPV : L 82DH50

Zylax® 400 mg
Moxifloxacine
Boîtes de 5, 7, 25 et 50 comprimés pelliculés

✓ Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si vous avez été atteint d'une infection bactérienne, ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur transmettre votre maladie ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Quel est ce que ZYLAX® et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLAX® ?
- 3- Comment prendre ZYLAX® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver ZYLAX® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE ZYLAX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique et type d'activité :
Antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, code ATC : J01-MA-14.

ZYLAX® contient une substance active, la moxifloxacine, qui appartient au groupe des antibiotiques appelés les fluoroquinolones.

ZYLAX® agit en tuant les bactéries responsables des infections.

Indications thérapeutiques :

ZYLAX® est indiqué chez les patients âgés de 18 ans et plus pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

- longévités sont dues à des bactéries vis-à-vis desquelles la moxifloxacine est active.

Lorsque ZYLAX® 400 mg, comprimé pelliculé est utilisé en relais d'un traitement débuté avec la forme intraveineuse de ce médicament, les durées de traitement recommandées sont :

Infection des poumons (pneumonie) contractée en dehors de l'hôpital

7-14 jours

Infections compliquées de la peau et des tissus mous

7-21 jours

Infections compliquées de la peau et des tissus mous

7-21 jours

La majorité des patients atteints d'infections compliquées de la peau et des tissus mous ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX®, comprimé pelliculé dans les 4 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse.

La majorité des patients atteints d'infections compliquées de la peau et des tissus mous ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX®, comprimé pelliculé dans les 4 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse.

Il est important de respecter la durée de traitement même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre le médicament trop tôt, l'infection peut ne pas être complètement guérie, vous pouvez rechuter ou votre état peut s'aggraver. Un arrêt trop précoce peut favoriser une résistance bactérienne à cet antibiotique.

Fréquence d'administration
Ne pas dépasser la dose et la durée de traitement recommandées.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage
Si vous avez pris plus de ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus d'un comprimé par jour comme cela vous a été prescrit, consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien et, si possible, apportez tous les comprimés restants, l'emballage ou cette notice pour montrer au médecin ou au pharmacien ce que vous avez pris.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses
Si vous oubliez de prendre ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous avez oublié de prendre votre comprimé, vous devez le prendre dans la journée dès que vous vous en rendez compte. Si vous n'avez pas pris votre comprimé pendant une journée, prenez la dose normale (un comprimé) le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage
Si vous arrêtez de prendre ZYLAX® 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection peut ne pas être complètement guérie. Consultez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre vos comprimés avant la fin du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus graves qui ont été observés durant un traitement par ZYLAX® sont énumérés ci-dessous :

Si vous remarquez :

- un rythme cardiaque anormalement rapide (effet indésirable rare)

- une sensation subite de malaise ou un jaunissement du blanc des yeux, une coloration foncée des urines, des démangeaisons sur la peau, une tendance à saigner ou des troubles de la pensée ou de la vigilance (il peut s'agir des signes et symptômes d'une inflammation fulminante du foie susceptible d'entraîner une insuffisance hépatique potentiellement fatale (effet indésirable très rare, des décès ont été observés))

- des altérations de la peau ou des muqueuses, par exemple des cloques douloureuses dans la bouche, le nez ou au niveau du pénis/ovaire (syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell) (effets indésirables très rares, potentiellement mortels)

- une inflammation des vaisseaux sanguins (se traduisant par des signes tels que des taches rouges sur votre peau, gonflement, douleur aux jambes, ou des douleurs articulaires) (effet indésirable très rare)

- une réaction allergique généralisée grave et soudaine, y compris de très rares cas de choc anaphylactique potentiellement mortel (effet indésirable très rare)

- un gonflement, y compris un oedème des voies respiratoires (effet indésirable rare, potentiellement mortel)

- des convulsions (effet indésirable rare)

- des troubles du système nerveux, tels que douleurs, sensations de brûlure, picotements, engourdissement et/ou faiblesse aux extrémités (effet indésirable rare)

- une dépression (entraînant dans de très rares cas une envie de se faire du mal, p. ex. idées suicidaires ou tentatives de suicide) (effet indésirable rare)

- une altération mentale (entraînant potentiellement une envie de se faire du mal, p. ex. idées suicidaires ou tentatives de suicide) (effet indésirable très rare)

- une diarrhée sévère contenant du sang et/ou du mucus (colite associée aux antibiotiques, y compris colite pseudomembraneuse) qui, dans de très rares cas, peut évoluer en complications menaçant le pronostic vital (effets indésirables rares)

- une douleur et un gonflement au niveau des tendons (tendinite) (effet indésirable rare) ou une rupture de tendon (effet indésirable très rare)

- une douleur et un gonflement au niveau des tendons (tendinite) (effet indésirable rare) ou une rupture de tendon (effet indésirable très rare)

- une douleur et un gonflement au niveau des tendons (tendinite) (effet indésirable rare) ou une rupture de tendon (effet indésirable très rare)

- une douleur et un gonflement au niveau des tendons (tendinite) (effet indésirable rare) ou une rupture de tendon (effet indésirable très rare)

AFR PHAR
LOT
231416
EXP
07/2026
PPV : L 82DH50

Zylax[®] 400 mg
Moxifloxacine
Boîtes de 5, 7, 25 et 50 comprimés pelliculés

✓ Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Si vous avez d'autres symptômes, consultez votre médecin. Ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur nuire.
- Ce médicament vous a été prescrit pour votre maladie ou pour d'autres raisons.
- Si vous avez d'autres symptômes, consultez votre médecin. Ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur nuire.
- Si vous avez d'autres symptômes, consultez votre médecin. Ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur nuire.
- Si vous avez d'autres symptômes, consultez votre médecin. Ne donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur nuire.

Que contient cette notice :

- 1- Quel est ce que ZYLAX[®] et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLAX[®] ?
- 3- Comment prendre ZYLAX[®] ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver ZYLAX[®] ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE ZYLAX[®] ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique et type d'activité :
Antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, code ATC : J01-MA-14.

ZYLAX[®] contient une substance active, la moxifloxacine, qui appartient au groupe des antibiotiques appelés les fluoroquinolones.

ZYLAX[®] agit en tuant les bactéries responsables des infections.

Indications thérapeutiques :
ZYLAX[®] est indiqué chez les patients âgés de 18 ans et plus pour traiter les infections bactériennes suivantes :
- Infections des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).
- Infections aiguës des sinus (sinusites bactériennes aiguës).

Lorsque ZYLAX[®] 400 mg, comprimé pelliculé est utilisé en relais d'un traitement débuté avec la forme intraveineuse de ce médicament, les durées de traitement recommandées sont :

Infection des poumons (pneumonie) contractée en dehors de l'hôpital : 7-14 jours

Infections compliquées de la peau et des tissus mous : 7-21 jours

La majorité des patients atteints d'infections compliquées de la peau et des tissus mous ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX[®], comprimé pelliculé dans les 4 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse.

La majorité des patients atteints d'infections compliquées de la peau et des tissus mous ont bénéficié d'un relais oral avec ZYLAX[®], comprimé pelliculé dans les 4 jours qui ont suivi le début du traitement par voie intraveineuse.

Il est important de respecter la durée de traitement même si vous commencez à vous sentir mieux après quelques jours. Si vous arrêtez de prendre le médicament trop tôt, l'infection peut ne pas être complètement guérie, vous pouvez rechuter ou votre état peut s'aggraver. Un arrêt trop précoce peut favoriser une résistance bactérienne à cet antibiotique.

Fréquence d'administration :
Ne pas dépasser la dose et la durée de traitement recommandées.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :
Si vous avez pris plus de ZYLAX[®] 400 mg, comprimés pelliculés que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris plus d'un comprimé par jour comme cela vous a été prescrit, consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien et, si possible, apportez tous les comprimés restants, l'emballage ou cette notice pour montrer au médecin ou au pharmacien ce que vous avez pris.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :
Si vous oubliez de prendre ZYLAX[®] 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous avez oublié de prendre votre comprimé, vous devez le prendre dans la journée dès que vous vous en rendez compte. Si vous n'avez pas pris votre comprimé pendant une journée, prenez la dose normale (un comprimé) le lendemain. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :
Si vous arrêtez de prendre ZYLAX[®] 400 mg, comprimés pelliculés :

Si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt, votre infection peut ne pas être complètement guérie. Consultez votre médecin si vous souhaitez arrêter de prendre vos comprimés avant la fin du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus graves qui ont été observés durant un traitement par ZYLAX[®] sont énumérés ci-dessous :

Si vous remarquez :

- un rythme cardiaque anormalement rapide (effet indésirable rare)
- une sensation subite de malaise ou un jaunissement du blanc des yeux, une coloration foncée des urines, des démangeaisons sur la peau, une tendance à saigner ou des troubles de la pensée ou de la vigilance (il peut s'agir des signes et symptômes d'une inflammation fulminante du foie susceptible d'entraîner une insuffisance hépatique potentiellement fatale (effet indésirable très rare, des décès ont été observés))

- des altérations de la peau ou des muqueuses, par exemple des cloques douloureuses dans la bouche, le nez ou au niveau du pénis/ovaire (syndrome de Stevens-Johnson ou syndrome de Lyell) (effets indésirables très rares, potentiellement mortels)

- une inflammation des vaisseaux sanguins (se traduisant par des signes tels que des taches rouges sur votre peau, gonflement, douleur aux jambes, ou des douleurs articulaires) (effet indésirable très rare)

- une réaction allergique généralisée grave et soudaine, y compris de très rares cas de choc anaphylactique potentiellement mortel (effet indésirable très rare)

- un gonflement, y compris un oedème des voies respiratoires (effet indésirable rare, potentiellement mortel)

- des convulsions (effet indésirable rare)

- des troubles du système nerveux, tels que douleurs, sensations de brûlure, picotements, engourdissement et/ou faiblesse aux extrémités (effet indésirable rare)

- une dépression (entraînant dans de très rares cas une envie de se faire du mal, p. ex. idées suicidaires ou tentatives de suicide) (effet indésirable rare)

- une altération mentale (entraînant potentiellement une envie de se faire du mal, p. ex. idées suicidaires ou tentatives de suicide) (effet indésirable très rare)

- une diarrhée sévère contenant du sang et/ou du mucus (colite associée aux antibiotiques, y compris colite pseudomembraneuse) qui, dans de très rares cas, peut évoluer en complications menaçant le pronostic vital (effets indésirables rares)

- une douleur et un gonflement au niveau des tendons (tendinite) (effet indésirable rare) ou une rupture de tendon (effet indésirable très rare)

- des saignements et consultez immédiatement votre médecin car vous avez peut-être besoin d'un traitement urgent (effets indésirables très rares).

PPC: 79,00 DH

Apixol®



Solution buvable

FORMES ET PRESENTATIONS :

Apixol® Adultes - Solution buvable-flacon 200ml.

Apixol® Enfants - Solution buvable-flacon 200ml.

PROPRIETES :

Apixol®, à base d'extraits de propolis, d'échinacée ainsi que d'autres actifs naturels, aide à dégager et apaiser les voies respiratoires et à adoucir la gorge, procurant ainsi un confort global (Poumons, gorge, nez...) tout en renforçant les défenses naturelles de l'organisme.

UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées.
- Gorge irritée.
- Enrouement.

CONSEILS D'UTILISATION :

Apixol® Adultes : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

Apixol® Enfants - Moins de 4 ans : 1 cuillère à café 3 à 4 fois par jour.

Apixol® Enfants - Plus de 4 ans : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

Dr Nawal BENOUCHE

Pneumologue - Allergologue
Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani
et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

الكبار و الأطفال

الضيق الحساسية داء السل

فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التشخيص بالمنظار

طبيبة سابقا بالمستشفى الحسني

و المستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le

29/03/2024

MME KTIRI AMINA

- FITORAX

1Càs X3/J PDT 7J

Dr BENOUCHE Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond-point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65,
3ème Etage - Wifaq Ferrara 1 - Wifaq Ferrara 1
Tél : 05 22 65 88 61 - GSM : +212 661 711 424 - INPE : 091035188

Lot : 202142
À consommer
avant le : 02/2026
PPC : 79,90 DH

Fitorax®

Solution buvable

FORMES ET PRESENTATIONS :

Fitorax® Adultes Solution buvable, flacon 200ml.

Fitorax® Enfants Solution buvable, flacon 200ml.

PROPRIETES :

Fitorax® solution buvable est à base d'extraits de Propolis, d'Échinacée ainsi que d'autres actifs naturels qui contribuent à libérer les voies respiratoires encombrées et à apaiser l'irritation de la gorge tout en fortifiant les défenses naturelles de l'organisme procurant ainsi un confort respiratoire global.

UTILISATIONS :

- Voies respiratoires encombrées.
- Gorge irritée.
- Enrouement.

CONSEILS D'UTILISATION :

Fitorax® Solution buvable Adultes : 1 cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour.

Fitorax® Solution buvable Enfants : - Moins de 4 ans : 1 cuillère à café 3 fois par jour.

- De 4 à 12 ans : 1 cuillère à soupe 3 fois par jour.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

- Déconseillé aux personnes allergiques aux produits de la ruche.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Après ouverture, à conserver au frais et à consommer dans un délai d'un mois.
- Le produit peut présenter des sédiments dus à la nature de ses composants, toutefois sa qualité et son efficacité ne sont pas altérées.
- **Fitorax®** Solution buvable Adultes est déconseillé chez la femme enceinte.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma.

Autorisations du Ministère de la Santé n° :

Fitorax® Solution buvable Adultes : 20211405040/MAv2/DMP/CA/18

Fitorax® Solution buvable Enfants : 20211405616 MAv2/CA/DMP/18

Dr Nawal BENOUBHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani

et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

الكبار و الأطفال

الضيق الحساسية داء السل

فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التشخيص بالمنظار

طبيبة سابقا بالمستشفى الحسني

و المستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le

29/03/2024

MME KTIRI AMINA

66ANS, HTA SOUS IRVECOP, PAS TABAC

EXPECTORATIONS DEPUIS 1AN, GENE RESPIRATOIRE

RX THORAX : SYNDROME BRONCHIQUE BASAL DROIT

TDM THORACIQUE

Dr. BENOUBHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3ème Etage
Casablanca - 20220
Tél : 05 22 65 88 61 - GSM : +212 661 711 424 - INPE : 091035188

Centre de Radiologie El Oufi
Bd. Oum Rabii - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tél : 05 22 93 04 93

Dr Nawal BENOUBHOUD

Pneumologue - Allergologue
Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani

et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

الكبار و الأطفال

الضيق الحساسية داء السل

فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التشخيص بالمنظار

طبيبة سابقا بالمستشفى الحسن

و المستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le

29/03/2024

MME KTIRI AMINA

Radiographie du thorax : Face

SYNDROME BRONCHIQUE BASAL DROIT

Silhouette cardio-vasculaire est normale

Culs-de-sac pleuraux sont libres

Pas d'anomalie évidente du cadre osseux.

Dr. BENOUBHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3ème Etage
N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / E-mail : benouhoudnawal@gmail.com
Tél : 05 22 65 88 61 - GSM : +212 661 711 424 - INPE : 091035188

29/03/2024

Facture

MME KTIRI AMINA

Acte	Honoraire
Consultation	250,00 Dh
Radiologie thoracique Z12	200,00 Dh
Total	450,00 Dh

Arrêté la présente facture à la somme de :
quatre cent cinquante dirham(s)

Dr. BENOUHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond-point de la Méditerranée N° 65
3^{ème} Etage - Ouled el Akhdj
69 + 212 5 22 62 58 01

CENTRE DE RADIOLOGIE EL OULFA

Docteur Fatiha LASRI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II.

Ex médecin attaché des Hôpitaux de Londres & Amsterdam.

Docteur Bouchaib ELMDARI

Médecin Radiologue

Diplôme National de Spécialité.

Diplôme Inter-Universitaire spcialisé-Nancy II

Ex médecin attaché au CHU Ibn Rochd

Casablanca, le 29/03/2024

FACTURE N°03524/2024

NOM & PRENOM: KTIRI AMINA

EXAMEN	MONTANT
TDM Thoracique	1500 DH
TOTAL	1500 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de :MILLE CINQ CENTS DH TTC

Centre de Radiologie El Oulfa
Bd. Oum Rabi - Rue 50 N°2
Casablanca - 20220
Tél: 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99

Dr Bouchaib EL MDARI
Médecin Radiologue
Centre de Radiologie El Oulfa

Bd. Oued Oum Rabii – Rue 50, N°2- Oulfa – 20220 Casablanca
Tél. : 0522 93 04 93 / 05 22 93 05 93 / 05 22 93 32 99 – Fax 0522 93 563Capital: 100 000, 00
Dhs - RC: SCP – TP: 37989156 – IF: 4049398 – ICE: 001581917000057
E-mail: radiologie-oulfa@.com