

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie : N° P19-0005831

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1775 Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : MOURCHID ABDES Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Pr. ABID-ALLAN MAHMOUD
الأستاذ عبيد الله محسن
Chirurgien cardio-vasculaire
جراح القلب والشرابيين
2037205 Bd. de la Résistance 4ème étage
Casablanca - Tél. : 0522 22 45 24

Date de consultation : 26/03/2024

Nom et prénom du malade : MOURCHID SAM Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

Nature de la maladie : Volontairement exposé

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires
26/03/2024	C3	No paye	
03/04/2024	C3	No paye	

Cachet et signature du Médecin attestant la Récupération des Actes
Dr. ABID-ALLAH Mouhelne
 Chirurgien général - vasculaire
 203/205 Bd. de la Résistance 4ème étage
 Casablanca - Tél: 0522 22 45 24

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

23/04/2024

455.70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

26.3.24

42R

572

26/03/24

B 40

45.00

073064271

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



[Création, remont, adjonction]
 Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur Mouhcine ABID-ALLAH

Chirurgien Cardio-vasculaire

Chirurgie Cardiaque de l'enfant et du nouveau-né

Chirurgie Cardiaque Adulte

Chirurgie vasculaire et varices



البروفيسور محسن عبيد الله

متخصص في جراحة القلب والشرابين

جراحة القلب للأطفال والرضع

جراحة القلب للكبار

جراحة الأوعية الدموية

ORDONNANCE

03/04/24

M. Nourhied Samir.

PHARMACIE DE LA DECOUVERTE
Lot. Al Moustakbal, Lot. N° 7
Route 1029, Sidi Maarouf - Casablanca
Tél. : 0522 97 32 23 - Fax : 0522 97 57 46

2000x3
= 18000



1 Sintrom 1g en poche
5070x3 de 15 NA
= 15210
E. Coelendael 1,5g 1/2p x 2j



5570 3- A-sol 1g 1p x 2j x 7j



6360 4- Hepanet 1g x 1/2p x 7j



45570

Pr. ABID-ALLAH Mouhcine
الأستاذ محسن عبيد الله
Chirurgien cardio-vasculaire
جراح القلب والشرابين
203/205 Bd. de la Résistance 4ème étage
Tél : 0522 22 45 24

203/205 شارع المقاومة، الطابق الرابع، الدار البيضاء

203/205 Boulevard de la résistance, 4ème Etage, Casablanca

Tél: +212 5 22 22 45 24 - Gsm: +212 6 61 23 61 24

Whatsapp: +212 6 16 79 90 09 - Email: prof.abidallah.ccv@gmail.com

SINTRON® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Acénoncomarol

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :

- 1. Quel est le médicament ?
- 2. Quel est le dosage ?
- 3. Quelles sont les indications ?
- 4. Quelles sont les contre-indications ?
- 5. Quelles sont les effets indésirables éventuels ?
- 6. Comment conserver le médicament ?
- 7. Informations supplémentaires

1. Quel est le médicament ?
SINTRON® 4 mg, comprimé et dans quels cas d'activité :

2. Quelles sont les indications ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K. Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et de prévenir ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines.

3. Quelles sont les contre-indications ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est contre-indiqué en présence de troubles du rythme cardiaque (tales que fibrillation auriculaire), anormaux ou proches des valves cardiaques (tels que sténose aortique, insuffisance aortique, etc.).

4. Quelles sont les effets indésirables ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K. Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et de prévenir ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines.

5. Quelles sont les contre-indications ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est contre-indiqué en présence de troubles du rythme cardiaque (tales que fibrillation auriculaire), anormaux ou proches des valves cardiaques (tels que sténose aortique, insuffisance aortique, etc.).

6. Comment conserver le médicament ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est un médicament sensible à la lumière et à l'humidité. Il doit être conservé dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

7. Informations supplémentaires
SINTRON® 4 mg, comprimé est un médicament soumis à la prescription médicale. Il est important de suivre les conseils de votre médecin et de ne pas arrêter de le prendre sans avis médical.

PPV :
Exp :
N° Lot :

20100

1. Quel est le médicament ?
SINTRON® 4 mg, comprimé et dans quels cas d'activité :

2. Quelles sont les indications ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K. Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et de prévenir ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines.

3. Quelles sont les contre-indications ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est contre-indiqué en présence de troubles du rythme cardiaque (tales que fibrillation auriculaire), anormaux ou proches des valves cardiaques (tels que sténose aortique, insuffisance aortique, etc.).

4. Quelles sont les effets indésirables ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est un anticoagulant oral de la famille des antivitamines K. Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la coagulation et de prévenir ainsi la formation de caillots dans les artères et les veines.

5. Quelles sont les contre-indications ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est contre-indiqué en présence de troubles du rythme cardiaque (tales que fibrillation auriculaire), anormaux ou proches des valves cardiaques (tels que sténose aortique, insuffisance aortique, etc.).

6. Comment conserver le médicament ?
SINTRON® 4 mg, comprimé est un médicament sensible à la lumière et à l'humidité. Il doit être conservé dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité, à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

7. Informations supplémentaires
SINTRON® 4 mg, comprimé est un médicament soumis à la prescription médicale. Il est important de suivre les conseils de votre médecin et de ne pas arrêter de le prendre sans avis médical.

ur les médicaments soumis à la prescription médicale ;
iliez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
dicament car elle contient des informations importantes pour vous.

pour plus d'informations à votre

Le médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de

grave ou si vous remarquez un

decidin ou a votre pharmacien.

Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SINTROM ?

Comment prendre SINTROM 4 mg, comprimé ?

Comment conserver SINTROM 4 mg, comprimé ?

QU'EST-CE QUE SINTROM 4 mg, COMPRIME ET DANS QUELS CAS

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :
 Lithomoliques (code ATC : B01AA07).

Indications thérapeutiques :

Les AVK empêchent l'action de la vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la coagulation du sang. La prise de ce médicament permet donc de ralentir la

aguation et d'éviter ainsi la formation de callus dans les arêtes et les

chibérie (callot dans une veine),
embolie pulmonaire (callot dans les poumons)

Les valves cardiaques ne se ferment pas complètement, ce qui entraîne une fuite de sang vers l'arrière (régurgitation) ou une fuite de sang vers l'avant (insuffisance).

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE

Indiquez les informations nécessaires avant la prise du médicament :

entrez les indications :
 Cliquez le avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament

En cas d'insuffisance hépatique sévère (maladie du foie) :
En cas d'association avec les médicaments suivants :

- l'aspirine à fortes doses,
- le miconazole utilisé pour le traitement de mycoses à champignons) par voie générale ou buccale.

les AINS pyrazoles : phénybutazone, médicaments utilisés comme anti-inflammatoires.

En cas d'association avec le milieux (pour une usinée en particulier), les attention avec Sinter 4 mg, comprimé :

Il est important de comprendre les principes et les modalités de traitement afin de ne pas prendre de risque inutile. N'hésitez pas à poser des questions à votre médecin.

Le médecin est généralement déconseillé, sauf avis contraire de votre

en cas de risque connu de saignement.

- l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale.

- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazoles),
- le fluorouracile et, par extrapolation, le galur et le capécitabine (médicaments

est nécessaire que votre médecin évalue votre risque personnel de

signalement éventuel. Ainsi, signalé-z-ili si vous êtes sujet à des saignements, éliminément digestifs, et si vous avez ou avez eu :



gsk

Amoxil 500mg et **Amoxil** 1g comprimés dispersibles
Boîte de 12 et 24 comprimés dispersibles.

Amoxicilline

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Sachez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit à vous ou à votre enfant. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de l'infection sont identiques aux vôtres.
- Si vous avez des questions ou des inquiétudes, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AMOXIL comprimé dispersible et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AMOXIL comprimé dispersible ?
3. Comment prendre AMOXIL comprimé dispersible ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AMOXIL comprimé dispersible ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AMOXIL, comprimé dispersible, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Casse pharmacothérapeutique - code ATC : J01CA04.

Qu'est-ce que AMOXIL ?

AMOXIL est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

Dans quels cas AMOXIL est-il utilisé ?

AMOXIL est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AMOXIL peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMOXIL, comprimé dispersible ?

- Ne prenez jamais AMOXIL, comprimé dispersible :
 - si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6) ;
 - si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AMOXIL si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
- En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Avertissements et précautions :

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre AMOXIL comprimé dispersible si vous :
 - souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
 - avez des problèmes rénaux
 - n'avez pas régulièrement
- En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AMOXIL.

Tests sanguins et urinaux :

- Si vous devez effectuer :
 - des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
 - un dosage d'astrotol pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement,
- Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AMOXIL. En effet, AMOXIL peut influencer sur les résultats de ces tests.

Autres médicaments et AMOXIL, comprimé dispersible :

- Informez votre médecin si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
 - Si vous prenez de l'aspirine (utilisée dans le traitement de la grippe) avec AMOXIL, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.
 - Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre médecin peut décider d'adapter votre dose d'AMOXIL.
 - Si vous prenez des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), vous pourriez avoir besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.
 - Si vous prenez d'autres antibiotiques (tels que les tétracyclines) AMOXIL peut être moins efficace.
 - Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement du cancer et du psoriasis sévère) AMOXIL peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

AMOXIL peut provoquer des effets indésirables (comme des réactions allergiques, des vertiges et des convulsions) susceptibles de réduire votre capacité à conduire. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que vous vous sentiez bien. Ce médicament contient 20 mg d'aspartam par comprimé. L'aspartam (E351) est une source de

phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

3. COMMENT PRENDRE AMOXIL comprimé dispersible ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Faire dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avez immédiatement le mélange.
- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Posologie habituelle :

Toutes les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

- Votre médecin vous indiquera la quantité d'AMOXIL que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.
- La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises.
- La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour.

Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus :
La posologie habituelle d'AMOXIL est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 750 mg à 1 g toutes les 12 h, selon la sévérité et le type d'infection.

- Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.
- Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : érythème migrant isolé (phase précoce - éruption cutanée circulaire rouge ou rose) : 4 g par jour, maux de gorge, symptômes plus graves ou symptômes plus graves ou

6 g par jour.

• Ulcère de l'estomac : 750 mg à 1 g trois fois par jour, avec d'autres antibiotiques et si nécessaire, avec des médicaments pour protéger l'estomac.

• Pour prévenir les infections urinaires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

• Pour prévenir les infections des voies respiratoires : 500 mg à 1 g deux fois par jour, avec ou sans d'autres antibiotiques.

PPV : 55.00 DH
LOT : 653016
PER : 06/25

CARDENSIEL est habituellement utilisé dans le cadre d'un traitement au long cours. Chez l'adulte, y compris les personnes âgées.

Le traitement par bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement.

Le médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer, en général selon le schéma suivant :

- 1,25 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
 - 2,5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
 - 5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
 - 10 mg de bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien (en continu)
- La dose quotidienne maximale recommandée est de 10 mg de bisoprolol.

Selon votre tolérance au médicament, votre médecin pourra également décider de prolonger l'intervalle entre les doses ou si vous ne tolérez plus le médicament, il pourra être nécessaire de réduire à nouveau la dose ou d'interrompre d'entretien inférieure à 10 mg de bisoprolol peut être suffisante. Votre médecin vous indiquera la marche à suivre. Si vous devez arrêter totalement le traitement, votre médecin vous conseillera généralement de réduire progressivement la dose.

Si vous avez pris plus de CARDENSIEL que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin qui décidera des mesures à prendre.

Les symptômes de surdosage peuvent être un ralentissement du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires sévères, la baisse du taux de sucre dans le sang.

Si vous oubliez de prendre CARDENSIEL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Prenez la dose habituelle le matin suivant.

Si vous arrêtez de prendre CARDENSIEL :

N'interrompez en aucun cas le traitement par CARDENSIEL si votre médecin ne vous a pas conseillé de le faire. Dans le cas contraire, votre état de santé peut être détérioré. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARDENSIEL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Afin d'éviter les réactions graves, consultez un médecin immédiatement si un effet indésirable devient sévère, survient brusquement ou s'aggrave rapidement.

Les effets indésirables les plus graves sont ceux touchant les fonctions cardiaques :

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- aggravation de l'insuffisance cardiaque (moins de 1 personne sur 10)
- rythme cardiaque lent ou irrégulier (moins de 1 personne sur 100)

Si vous avez des vertiges ou si vous vous sentez faible, ou encore si vous avez des difficultés à respirer, contactez votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables sont répertoriés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

- Fréquent (moins de 1 personne sur 10) :
 - fatigue, épuisement, vertiges, maux de tête,
 - sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds
 - pression artérielle basse
- troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou constipation,
- Peu fréquent (moins de 1 personne sur 100) :
 - troubles du sommeil
- dépression

- vertiges lors du passage à la position debout
- gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques
- faiblesse musculaire, crampes

Rare (moins de 1 personne sur 1000) :

- troubles de l'audition
- rhinite allergique
- diminution de la sécrétion de larmes
- inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- résultats d'analyses anormaux
- réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées
- Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous présentez des réactions allergiques plus sévères, pouvant impliquer un gonflement au niveau du visage, du cou, de la langue ou de la bouche ou de la gorge ou des difficultés respiratoires.
- troubles de l'érection
- cauchemars, hallucinations
- perte de connaissance

Très rare (moins de 1 personne sur 10 000) :

- irritation et rougeur de l'œil (conjonctivite)
- chute des cheveux
- apparition ou aggravation d'une affection cutanée squameuse (psoriasis) ; éruption psoriasiforme

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin.

NE PAS ARRÊTER DE PRENDRE CARDENSIEL sans avis médical.



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 50,70 DHS

9420812394

CARDENSIEL est habituellement utilisé dans le cadre d'un traitement au long cours. Chez l'adulte, y compris les personnes âgées.

Le traitement par bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement.

Le médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer, en général selon le schéma suivant :

- 1,25 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
 - 2,5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
 - 5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
 - 10 mg de bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien (en continu)
- La dose quotidienne maximale recommandée est de 10 mg de bisoprolol.

Selon votre tolérance au médicament, votre médecin pourra également décider de prolonger l'intervalle entre les doses ou si vous ne tolérez plus le médicament, il pourra être nécessaire de réduire à nouveau la dose ou d'interrompre d'entretien inférieure à 10 mg de bisoprolol peut être suffisante. Votre médecin vous indiquera la marche à suivre. Si vous devez arrêter totalement le traitement, votre médecin vous conseillera généralement de réduire progressivement la dose.

Si vous avez pris plus de CARDENSIEL que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin qui décidera des mesures à prendre.

Les symptômes de surdosage peuvent être un ralentissement du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires sévères, la baisse du taux de sucre dans le sang.

Si vous oubliez de prendre CARDENSIEL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Prenez la dose habituelle le matin suivant.

Si vous arrêtez de prendre CARDENSIEL :

N'interrompez en aucun cas le traitement par CARDENSIEL si votre médecin ne vous a pas conseillé de le faire. Dans le cas contraire, votre état de santé peut être détérioré. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARDENSIEL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Afin d'éviter les réactions graves, consultez un médecin immédiatement si un effet indésirable devient sévère, survient brusquement ou s'aggrave rapidement.

Les effets indésirables les plus graves sont ceux touchant les fonctions cardiaques :

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- aggravation de l'insuffisance cardiaque (moins de 1 personne sur 10)
- rythme cardiaque lent ou irrégulier (moins de 1 personne sur 100)

Si vous avez des vertiges ou si vous vous sentez faible, ou encore si vous avez des difficultés à respirer, contactez votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables sont répertoriés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

- Fréquent (moins de 1 personne sur 10) :
 - fatigue, épuisement, vertiges, maux de tête,
 - sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds
 - pression artérielle basse
- troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou constipation,
- Peu fréquent (moins de 1 personne sur 100) :
 - troubles du sommeil
- dépression

- vertiges lors du passage à la position debout
- gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques
- faiblesse musculaire, crampes

Rare (moins de 1 personne sur 1000) :

- troubles de l'audition
- rhinite allergique
- diminution de la sécrétion de larmes
- inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- résultats d'analyses anormaux
- réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées
- Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous présentez des réactions allergiques plus sévères, pouvant impliquer un gonflement au niveau du visage, du cou, de la langue ou de la bouche ou de la gorge ou des difficultés respiratoires.
- troubles de l'érection
- cauchemars, hallucinations
- perte de connaissance

Très rare (moins de 1 personne sur 10 000) :

- irritation et rougeur de l'œil (conjonctivite)
- chute des cheveux

• apparition ou aggravation d'une affection cutanée squameuse (psoriasis) ; éruption psoriasiforme. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin.

NE PAS ARRÊTER LE TRAITEMENT CONSERVER CARDENSIEL ?

portée et de la que des enfants.



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 50,70 DHS

9420812394

CARDENSIEL est habituellement utilisé dans le cadre d'un traitement au long cours. Chez l'adulte, y compris les personnes âgées.

Le traitement par bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement.

Le médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer, en général selon le schéma suivant :

- 1,25 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
 - 2,5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
 - 5 mg de bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
 - 10 mg de bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien (en continu)
- La dose quotidienne maximale recommandée est de 10 mg de bisoprolol.

Selon votre tolérance au médicament, votre médecin pourra également décider de prolonger l'intervalle entre les doses ou si vous ne tolérez plus le médicament, il pourra être nécessaire de réduire à nouveau la dose ou d'interrompre d'entretien inférieure à 10 mg de bisoprolol peut être suffisante. Votre médecin vous indiquera la marche à suivre.

Si vous devez arrêter totalement le traitement, votre médecin vous conseillera généralement de réduire progressivement la dose.

Si vous avez pris plus de CARDENSIEL que vous n'auriez dû :

Prévenez immédiatement votre médecin qui décidera des mesures à prendre.

Les symptômes de surdosage peuvent être un ralentissement du rythme cardiaque, des difficultés respiratoires sévères, la baisse du taux de sucre dans le sang.

Si vous oubliez de prendre CARDENSIEL :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Prenez la dose habituelle le matin suivant.

Si vous arrêtez de prendre CARDENSIEL :

N'interrompez en aucun cas le traitement par CARDENSIEL si votre médecin ne vous a pas conseillé de le faire. Dans le cas contraire, votre état de santé peut être détérioré. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARDENSIEL est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Afin d'éviter les réactions graves, consultez un médecin immédiatement si un effet indésirable devient sévère, survient brusquement ou s'aggrave rapidement.

Les effets indésirables les plus graves sont ceux touchant les fonctions cardiaques :

- ralentissement du rythme cardiaque (plus de 1 personne sur 10)
- aggravation de l'insuffisance cardiaque (moins de 1 personne sur 10)
- rythme cardiaque lent ou irrégulier (moins de 1 personne sur 100)

Si vous avez des vertiges ou si vous vous sentez faible, ou encore si vous avez des difficultés à respirer, contactez votre médecin dès que possible.

Les autres effets indésirables sont répertoriés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

- Fréquent (moins de 1 personne sur 10) :
 - fatigue, épuisement, vertiges, maux de tête,
 - sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds
 - pression artérielle basse
- troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée ou constipation,
- Peu fréquent (moins de 1 personne sur 100) :
 - troubles du sommeil
- dépression

- vertiges lors du passage à la position debout
- gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques
- faiblesse musculaire, crampes

Rare (moins de 1 personne sur 1000) :

- troubles de l'audition
- rhinite allergique
- diminution de la sécrétion de larmes
- inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
- résultats d'analyses anormaux
- réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruptions cutanées
- Vous devez immédiatement consulter votre médecin si vous présentez des réactions allergiques plus sévères, pouvant impliquer un gonflement au niveau du visage, du cou, de la langue ou de la bouche ou de la gorge ou des difficultés respiratoires.

- troubles de l'érection
- cauchemars, hallucinations

● perte de connaissance

Très rare (moins de 1 personne sur 10 000) :

- irritation et rougeur de l'œil (conjonctivite)
- chute des cheveux
- apparition ou aggravation d'une affection cutanée squameuse (psoriasis) ; éruption psoriasiforme
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin.

NE PAS ARRÊTER DE PRENDRE CARDENSIEL ?

portée et de la vie des enfants.



Cardensiel® 2,5 mg
Comprimés pelliculés sécables B/30
PPV: 50,70 DHS

9420812394

هپانات

قرص 40

68.60 DH

SYSTEME DE GESTION QUALITE
CERTIFIE ISO 9001:2015
PAR CERTIQUALITY

Produit Fabriqué par ESI srl



Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV) ITALY esi.it

Importé et distribué par ESNAPHARM 7, Rue Abdelmajid

Benjelloun - Maarif extension - Casablanca

NAT®

A consommer de
préférence avant fin : 06/2025

Lot n°

Y1520

Composition par comprimé de 400 mg :

Rhamnus purshiana écorce 85,4 mg. Jus d'aloë ferox 64 mg. Foeniculum vulgare graines 53,4 mg. Cassia angustifolia feuilles 42,7 mg. Glycyrrhiza glabra racine 16 mg. Gentiana lutea racine 16 mg. Taraxacum officinale racine 10,7 mg. Rhamnus alpinus écorce 10,7 mg. Rumex crispus racine 10,7 mg. Marrubium vulgare sommités fleuries 10,7 mg. Maltodextrine ; agent de charge : Cellulose microcristalline ; antiagglomérants : sels de magnésium d'acides gras, dioxyde de silicium ; agents de revêtement : Hydroxypropylméthylcellulose, acides gras, cellulose microcristalline.

Propriétés :

Confort digestif et intestinal

ENOHN020-002

Professeur Moudhine ABID-ALLAH



Chirurgien Cardio-vasculaire

Chirurgie Cardiaque de l'enfant et du nouveau-né

Chirurgie Cardiaque Adulte

Chirurgie vasculaire et varices

البروفيسور محسن عبيد الله

متخصص في جراحة القلب والشرابين

جراحة القلب للأطفال والرضع

جراحة القلب للكبار

جراحة الأوعية الدموية

ORDONNANCE

03/04/24

Am. Nourchid Samir

T.P

INA

Dr. ABID-ALLAH Moudhine
الأستاذ عبيد الله محسن
Chirurgien cardio-vasculaire
جراح القلب والشرابين
203/205 Bd. de la Résistance 4ème étage
Casablanca - Tél : 0522 22 45 24

203/205 شارع المقاومة، الطابق الرابع، الدار البيضاء

203/205 Boulevard de la résistance, 4^{ème} Etage, Casablanca

Tél: +212 5 22 22 45 24 - Gsm: +212 6 61 23 61 24

Whatsapp: +212 6 16 79 90 09 - Email: prof.abidallah.ccv@gmail.com

Professeur Mouhcine ABID-ALLAH

Chirurgien Cardio-vasculaire

Chirurgie Cardiaque de l'enfant et du nouveau-né

Chirurgie Cardiaque Adulte

Chirurgie vasculaire et varices



البروفيسور محسن عبيد الله

متخصص في جراحة القلب والشرابين

جراحة القلب للأطفال والرضع

جراحة القلب للكبار

جراحة الأوعية الدموية

ORDONNANCE

26/03/24.

Am Mourchid Souwa.

T.P

INA

Pr. ABID-ALLAH Mouhcine
الأستاذ عبيد الله محسن
Chirurgien cardio-vasculaire
جراح القلب والشرابين
203/205 Bd. de la Résistance 4ème étage
Casablanca - Tél: 0522 22 45 24

203/205 شارع المقاومة، الطابق الرابع، الدار البيضاء

203/205 Boulevard de la résistance, 4^{ème} Etage, Casablanca

Tél: +212 5 22 22 45 24 - Gsm: +212 6 61 23 61 24

Whatsapp: +212 6 16 79 90 09 - Email: prof.abidallah.ccv@gmail.com

LABORATOIRE ADDOHA D'ANALYSES MEDICALES

Dr. RACHIDI Meriem

Médecin Biologiste

Imm 26, N°1 Tranche 13, les portes de Marrakech (En face Le Park Targa Fitness)

TP : 92102399 - IF : 48596373 - ICE : 002759629000082

FACTURE N° : 24-0582

Patient : Mme BRIGUI Samira

Date de prélèvement : 16/04/2024

Analyses	Valeur en B
Taux de Prothrombine	40
Total B	40
Prise de sang (APB)	0,00
Total en dirhams	45,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quarante-cinq dirhams***

LABORATOIRE ADDOHA
Accueil et Facturation
Imm. 26 Apt. 1, Tranche 13
Les Portes de Marrakech
Tél 05 24 01 28 34
GSM 07 01 19 21 04

- Ancien Médecin Interne au CHU Mohammed VI - Marrakech et des Hôpitaux de Paris
- Titulaire du diplôme en Hématologie Hémostase - Paris Descartes
- Diplôme Universitaire en Médecine et Biologie de la Reproduction - Sorbonne, Paris

- طبيبة داخلية سابقة بالمستشفى الجامعي محمد السادس
- مراكش و بمستشفيات باريس
- شهادة جامعية في علم الدم (ديكارت باريس)
- شهادة جامعية في المساعدة على الإنجاب بباريس



Marrakech, le 16/04/2024

Compte rendu d'analyses

MME BRIGUI SAMIRA

Code : 2404004671

Pvt du: 16/04/2024 8:34

Page : 1 / 1

HEMOSTASE**Taux de Prothrombine**

(Technique : Chronométrique ,START MAX , Stago)

Temps de Quick (TQ) Témoin	:	12,8 sec.	
Temps de Quick (TQ) Malade	:	44,1 sec.	
Taux de Prothrombine	:	17 %	(70 - 100)
INR	:	4,20	

Valeurs Usuelles

Antériorité

Interprétation :

Normal (Sujet sans traitement par AVK)	:	$1 < \text{INR} < 1,2$
Dans la plupart des indications au traitement sous AVK	:	$2 < \text{INR} < 3$
En cas d'embolies systémiques récidivantes	:	$3 < \text{INR} < 4,5$
Prothèse valvulaire mécanique, après IDM compliqué	:	
Risque hémorragique important	:	$\text{INR} > 5$

LABORATOIRE ADDOHA
Dr. RACHIDI Meriem
Imm. 26 Appt.1, Tranche 13
Les Portes de Marrakech
Tél : 05 24 01 79 34
GSM : 07 01 19 21 04





مختبر المستقبل للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Bahija LAHRAR

Médecin Spécialiste en Analyses Médicales (Biologiste)
Spécialiste en Diagnostic et Thérapeutique des couples infertiles
(IA-FIV-ICSI) Paris - France
Ex Enseignante à la faculté de médecine
CHU Ibn Rochd Casablanca
DU de management de la qualité université Bordeaux

Edité le : 26-mars-24



INPE 093060754

Facture N°: 1253/24

Référence:



3 260324 209863

Date de prélèvement mardi 26 mars 2024

Nom Prénom MOURCHID SAMIRA

Médecin:

Patente (TP) 36155845

ICE 001635929000031

Code Analyse	Analyses	Cotation B	Total
HN	Iz-Sang (Prise de..)	7	9,38
B236	TP (Contrôle AVK)	40	53,60
		47 B	51,70 dh
		Remise	0,00 dh

Net à payer TTC 51,70 dh

Arrête la présente facture à la somme de CINQUANTE ET UN DIRHAMS ET SOIXANTE-DIX CENTIMES

Dr bahija LAHRAR
Médecin Biologiste

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL
Dr. Bahija LAHRAR
Médecin Biologiste
29 Bd Abou Bakr El kadiri
Sidi Maârouf - Casablanca
Tel : 05 22 97 35 23



مختبر المستقبل للتحليلات الطبية

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL D'ANALYSES MEDICALES

Docteur Bahija LAHRAR

Médecin Spécialiste en Analyses Médicales (Biologiste)
Spécialiste en Diagnostic et Thérapeutique des couples infertiles
(IA-FIV-ICSI) Paris - France
Ex Enseignante à la faculté de médecine
CHU Ibn Rochd Casablanca
DU de management de la qualité université Bordeaux

Edité le : 26-mars-2



MOURCHID SAMIRA

Date de prélèvement : mardi 26 mars 2024

Référence



3 260324 209863

Nom Prénom:

MOURCHID SAMIRA

Médecin

SURVEILLANCE DES ANTI-COAGULANTS

Analyse	Résultat	Zone thérapeutique
Taux de Prothrombine	24,7 %	25 à 35 %
INR:	3,21 isi	2,0 à 3,4

Observations:

AVK Sintrom®
Posologie
Dose moyenne mg, par jour.

Aliments riches en vitamines K. (liste indicative des principaux aliments)

Richesse en vit. K (mg Vit.K pour 100 g)	Quantité inhibant l'activité d'1/2 à 3/4 de comprimé de SINTROM®	Aliments	Commentaire
3,0	30 g	Chou, choucroute, chou-fleur, épinards, brocolis, persil.	À éviter
0,8	125 g	Tomates, carotte	Consommation possible sans exagération
0,6	160 g	Foie de veau	
0,5	200 ml	Huile de tournesol	
0,3	330 g	Mûres, fraises, pêches	
0,3	330 g	Haricots verts, haricots blancs, asperges, champignons.	

Certains médicaments : Signaler toujours que vous êtes sous AVK. Votre médecin vérifie avant la prescription de tout nouveau médicament l'absence d'interaction avec les AVK.

Nous vous rappelons cependant **de ne pas prendre d'anti-inflammatoires** (VOLTARENE®, FELDENE®, PROFENID®, SURGAM®, NIFLURIL® ...) **ni d'aspirine** (ASPEGIC®, SOLUPSAN®, CATALGINE®...) **sans en parler à votre médecin.**

Si votre **TP est < à 15% et/ou l'INR > 4,5** même sans signes hémorragiques, **vous devez également consulter votre médecin.**

LABORATOIRE AL MOUSTAKBAL
Dr. Bahija LAHRAR
Médecin Biologiste
29 Bd Abou Bakr El kadiri, Sidi Maârouf - Casablanca
Tél : 05 22 97 35 23 - 05 22 97 36 87

إقامة المدينة العمارة (ج) رقم 29، شارع أبو بكر القادري، سيدي معروف - الدار البيضاء

Résidence Al Madina, Immeuble J N° 29, Bd Abou Bakr El kadiri, Sidi Maârouf - Casablanca

☎ 05 22 97 35 23 - 📠 05 22 97 36 87