

## DEMANDE D'ACCORD PREALABLE

Code Procédure : PR4FR01

Version : 2.0

Date : 24/05/2022

128784

Le 01.09.2022

### A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Matricule : 1702 E-mail : drivechm@hotmail.com Phones : 0650621092

Nom et Prénom de l'adhérent : DRIOUECH Mohamed

Nom et Prénom du bénéficiaire : EL GHAITY NAIMA

### A REMPLIR PAR LE PRATICIEN

Je soussigné : Kinésithérapeute Physiothérapeute Diplômée de l'IHEPS et l'ESK

Estime que l'état de santé de Mlle, Mme, M. EL GHAYTY NAIMA

Nécessite 6 séances de Kinésithérapie

Un acte coté à la nomenclature (préciser le coefficient) 0,1 de chose faciale

pour soulager LLE genou gauche

Une hospitalisation de (approximatif) ...

A (préciser l'établissement hospitalier) Kiné Moov

### STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Renseignements sur la nature de l'affection et de l'acte thérapeutique (à l'attention du médecin conseil de la MUPRAS) :

Cofficte de LLE genou gauche  
6x 0,1 de chose faciale

Cachet, date et signature du praticien 09/09/2022

Dafal ABOUAMAL  
Kinésithérapeute Physiothérapeute  
Diplômée de l'IHEPS et l'ESK

Kiné Moov  
B, Rue Aboukacem Zehraoui  
Quartier des Béoptaux  
Casablanca

### A REMPLIR PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA MUPRAS

Décision :

N.B. cette demande d'accord préalable doit être adressée, mailée ou faxée à la MUPRAS le premier jour ouvrable. Dans le cas contraire, la MUPRAS se réserve le droit de la rejeter.



Casablanca, le : 02/09/2022

Devis

**Nom et prénom :** Mme EL GHAITY Naima

**Nature de la maladie :** Calcification LLE genou gauche

**Médecin prescripteur :** Dr/ M. CHAOUKI

**Nombre de séances :** 6 Séances d'ondes de choc

**Coût de la séance :** 400,00 dh

**Total :** 2400,00 Dhs

**Arrêté le présent devis à la somme de :** Deux Mille Quatre Cent dirhams.

Djalil ABOUAMAL  
Kinéthérapeute Physiothérapeute  
Infirmier de l'INPS et l'ISC  
Tunisie

ICE: 000516429000070



Docteur Mohamed CHAOUKI

Orthopédiste Traumatologue  
Chirurgie des maladies osseuses  
et rhumatisantes  
Traumatologie du sport  
Chirurgie de la main  
Diplômé de l'Université de Bruxelles

الدكتور محمد شوقي

اختصاصي في: جراحة الكسر وتقدير العظام  
جراحة العظام والمفاصل  
الجراحة الرياضية  
جراحة اليد  
خريج جامعة بروكسل


## ORDONNANCE

Casablanca, le : 27/09/2020

El Ghazayna

06 séances de Kiné  
(Ondes de choc pulsées)  
pour adhématose  
du genou droit.

✓



131, Résidence Jaouharat Abdelmoumen - Bd. Abdelmoumen - Casablanca  
Tél. : 05 22 26.68.46 - GSM : 06 61 19.99.59

Casablanca, le 23 Juin 2022

**DR. AMRI NOUREDDINE**

**MME. EL GHAITY NAIMA**

## **COMPTE RENDU**

### **IRM DU GENOU GAUCHE**

**Indication :** Bilan de douleurs chroniques externes.

**Technique :**

- Séquence DP Fat Sat dans les trois plans, séquence axiale et coronale T1.
- Séquence sagittale T2 coupes fines centrées sur l'échancrure intercondylienne, séquence sagittale et coronale 2D merge

**Résultat :**

- Epanchement intra-articulaire modéré sans épaississement synovial visible.
- Petit kyste poplité simple mesurant 20 x 5 mm.
- Pas d'arguments en faveur de corps étrangers intra-articulaire.

**Au niveau du compartiment fémoro-tibial médial :**

- La corne postérieure du ménisque médial est le siège d'un hypersignal T2 en plage dégénératif sans fissure transfixante visible.
- Petit bec ostéophytique marginal fémoral sans anomalie du cartilage d'encroûtement fémoro-tibial.
- Intégrité du ligament collatéral médial et du l'os sous chondral.

**Au niveau du compartiment fémoro-tibial latéral :**

- Présence d'une volumineuse calcification bilobée d'environ 2,5 cm de grand axe, infiltrant le tendon poplité et la partie proximale du ligament collatéral latéral, sans signe de rupture.
- Intégrité de la jonction myo-tendineuse du poplité et de la portion distale du ligament collatéral latéral ainsi que le tendon biceps fémoral.
- Petit bec ostéophytique marginal fémoral avec discrète subluxation méniscale dont la corne postérieure est le siège d'un hypersignal T2 en plage dégénératif, sans fissure transfixante visible.

.../...

**MME. EL GHAITY NAIMA**

- Absence d'anomalie notable au niveau du cartilage d'encroûtement ni de l'os sous chondral.

**Au sein de l'échancrure :Intégrité des ligaments croisés**

**Au niveau de l'appareil extenseur :**

- Abrasion totale du cartilage d'encroûtement fémoro-patellaire externe avec mise en contact des surfaces articulaires, ostéophytose marginale exubérante de part et d'autre et petite géode sous chondrale patellaire interne.
- Tendance à la subluxation latérale de la patella.
- Intégrité du tendon patellaire, tendon quadriceps et des ailerons rotulien.

**Au total :**

- Volumineuse calcification bilobée de 2,5 cm de grand axe infiltrant le tendon poplité et la partie proximale du ligament collatéral latéral, sans signe de rupture en regard.
- Epanchement intra-articulaire modéré sans arguments en faveur de corps étrangers intra-articulaire ni épaissement synovial visible.
- Atteinte dégénératif au dépens des cornes postérieures du ménisque médial et latéral sans fissure transfixiante visible.
- Aspect de gonarthrose fémoro-patellaire externe évoluée.

**DR HABCHAQUI SANAA**