

CLINIQUE FLORENCE

62e 4633
137037

DEVIS

Date 08/11/2022

N° :221108162913ME

CLINIQUE FLORENCE

Nom patient : **BAHRI RANIA**

Prise en charge : **MUPRAS**

Traitements **DILATATION**

DILATATION 1 STENT ACTIF SUR LA CORONAIRE DROITE

PRESTATIONS	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
DILATATION ARTERE CORONAIRE + 1 STENT AC	1	Y496	49 000,00	49 000,00
			Sous-Total	49 000,00

Arrêté le présent devis à la somme de :
QUARANTE-NEUF MILLE DIRHAMS

Total devis

49 000,00

CLINIQUE FLORENCE
Administration
8 Avenue Mohamed Le Korri, V.N - FES
Tél. 05 35 96 51 51



Bahli Ramia

Modèle S. 2 bis

NOTE CONFIDENTIELLE DU MEDECIN TRAITANT

1) - Date de la constatation de l'état du malade :



2) - Renseignements cliniques sommaires :

Ange rétro
Stim des CDE

ATG 50 mg 1/2h

3) Traitement envisagé correspondant à la cotation indiquée sur le bulletin d'information ou à la demande d'entente préalable (si possible, nombre des actes en série) :

Angioprotect avec 1000 L. 1000 L. 1000 L.

En 1000 L. 1000 L.

4) Durée prévisible du traitement :

A 125, le 21/11/2022

Signature :



مصحة فلورنس - فاس

CLINIQUE FLORENCE - FES

RAPPORT DE CORONAROGRAPHIE

INFORMATIONS PATIENT :

Nom : BAHRI
Prénom : RANIA
Date de l'examen : 06 /01/2022
Médecin traitant : Dr Raziq

INDICATION : SCA ST - troponine+

TECHNIQUE :

Ponction de l'artère radiale droite par méthode de Seldinger. Désilet6 F

RESULTAT :

Réseau coronaire gauche :

- Tronc commun TCG de bon calibre sans sténose
- L'IVA est une artère de bon calibre, irrégulière contourne la pointe et donne naissance à plusieurs branches diagonales dont une principale
- Plaque de 30% de l'ostium de l'IVA
- Pont myocardique de l'IVA moyenne avec une compression systolique de 70%
- L'artère circonflexe est une artère de bon calibre et donne naissance à une branche marginale principale
- Occlusion thrombotique aigue de la circonflexe moyenne (TIMI0, reprise en distalité Rentrop 1)

Réseau coronaire droit : dominant

- Sténose serrée 70 à 80 % du genu supérieur de la coronaire droite avec un bon lit d'aval

CONCLUSION :

Lésions bi tronculaire :

- **Occlusion thrombotique aigue de la circonflexe moyenne** (TIMI0 , Rentrop 1) lésion responsable du SCA
- Sténose serrée du genu supérieur de la coronaire droite avec un bon lit d'aval

Dr. Mohamed SLAOUTI
Cardiologue Interventionnel
Av. Slaoui Résidence Nour Bureau 101
Etage - FES - TEL / FAX. 05 35 65 22 22

Signé : Dr Slaoui

T.P : 13137017 - I.F : 15291658 - CNSS : 1730285 - VCE : 000150712000023

30000 فاس - ج - شارع محمد القري ساحة فلورنس م.ج - فاس 30000

6 et 8, Av Mohammed EL Korri Place Florence V.N - FES 30000

GSM : 07 72 04 20 00 - Tél : 05 35 96 51 51 - E-mail : cliniqueflorence@gmail.com



مصحة فلورنس - فاس

RAPPORT D'ANGIOPLASTIE CORONAIRE

INFORMATIONS PATIENT :

Nom : BAHRI
Prénom : RANIA
Date de l'examen : 06/01/ 2022
Médecin traitant : DR Raziq

INDICATION : SCA ST - troponine +

TECHNIQUE ET MATERIEL

Ponction de l'artère radiale droite par méthode de Seldinger. Désilet 6F

Sonde porteuse EBU 3.0

Guide pilot 50 0.014

Ballon SPRINTER LEGEND 2.5 x 12 mm

Stent XIENCE ALPINE 2.75x 23 mm

Ballon NC ACCUFORCE 3.0 x 12 mm

Image de contrôle avant angioplastie :

- Occlusion thrombotique de la circonflexe moyenne (TIMI0 . Rentrop1)

Procédure

On intube l'ostium de l'artère coronaire gauche par une sonde porteuse EBU3.0. A travers cette sonde, nous introduisons un guide pilot 50 0,014 qui franchit la lésion de la circonflexe après appui ballon et se met en distalité. On procède à une pré dilatation de la lésion à l'aide d'un Ballon SPRINTER LEGEND 2.5 x 12 mm puis la mise en place d'un stent XIENCE ALPINE 2.75 x 23mm que l'on inflame à 14 atmosphères pendant 40 secondes.

Afin d'optimiser le déploiement de l'endoprothèse, on procède à une post dilatation par un ballon NC Accuforce 3.0 x 12 mm que l'on inflame à 16 Atm.

Le résultat post angioplastie + stent actif retrouve une artère circonflexe perméable sans sténose résiduelle au site dilaté ni dissection associée, **le flux TIMI III**

CONCLUSION :

Succès de désobstruction + stent actif de la circonflexe moyenne

Dr. Mohamed SLAOUTI
Cardiologue Interventionnel
Av. Slaoui Résidence Nour Bureau 101
1er Etage - FES - TEL/FAX. 05 35 65 22 22

T.P : 13137017 - I.F : 15291658 - CNSS : 1730285 - ICE : 000150712000023

30000 فاس - ج - شارع محمد القري ساحة فلورنس م.ج - فاس 30000

6 et 8, Av Mohammed EL Korri Place Florence V.N - FES 30000

GSM : 07 72 04 20 00 - Tél : 05 35 96 51 51 - E-mail : cliniqueflorence@gmail.com