

CLINIQUE INTERNATIONALE DE MARRAKECH

145786

D E V I S

Final

CIR44

Date 19/01/2023
N° : 230119091359CH

Nom patient : **YAMID SAADIA**

Prise en charge : **MUPRAS**


Traitements **HOSPIT**
devis initial

PRESTATIONS	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
DILATATION CORONAIRES + 3 STENTS ACTIFS	1		74 000,00	74 000,00
Sous-Total				74 000,00

Arrêté le présent devis à la somme de :
SOIXANTE-QUATORZE MILLE DIRHAMS

Total devis

74 000,00





Clinique
Internationale
CIM Santé
Marrakech

RTE DE L'AÉROPORT,
BAB IGHILI 40000
MARRAKECH
TÉL. : 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
FAX : 05 24 44 40 42

طريق المطار، باب إغلي
مراكش 40 000
الهاتف: 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
الfax: 05 24 44 40 42

CNSS 8670483
PATENTE 45050655
IF 40222599
ICE 0016762800058

ANESTHESIE-REANIMATION
CARDIOLOGIE GENERALE
ET INTERVENTIONNELLE
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
ADULTE ET PEDIATRIQUE
RHUMATOLOGIE
CHIRURGIE THORACIQUE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
& TRAUMATOLOGIQUE
ADULTE ET PEDIATRIQUE
NEUROLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
CHIRURGIE
MAXILLO-CERVICO-FACIALE
CHIRURGIE PLASTIQUE
& ESTHÉTIQUE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
NEPHROLOGIE
CHIRURGIE VISCERALE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
HÉMATOLOGIE
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTÉTRIQUE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
ONCOLOGIE
PEDIATRIE & REANIMATION
NEONATALE
PNEUMOLOGIE
RADIOLOGIE

SERVICE RADIOLOGIE
0524 369 600
SERVICE CONSULTATIONS
0666 643 837 / 05 24 36 95 45
SERVICE PRISE EN CHARGE
05 24 36 95 85 ET 0662 854 677
SERVICE FACTURATION
0662 852 953 - 05 24 36 95 55

Marrakech, le : 17/01/2023

Demande de PEC

- Mme Yamid Saadia
- Age = 72 ans
- FRW_{NA} = Age - n_{espars}
$$177A$$

- Douleur thoracique
- Coronarographie :
 - + Stenose sévère longue de l'IVA proximale moyenne
 - + Stenose sévère de la diagonale.

- Angioplastie de l'IVA + stent avec MEP de 3 stents actifs

DR. AMAZAR Barakat
Cardiologue Internationnal
Clinique Internationale Marrakech
Tél: 05 24 36 95 45
Fax: 07 22 851 650

CONTACT@CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM
WWW.CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM

Angioplastie

Date Examen: 17/01/2023

Patient: SAADIA YAMID

Date de naissance: 01/01/1950

Sexe: FEMININ

Opérateur: Dr Bakrim AMARIR

STATUT CLINIQUE

- Examen Clinique: Angor crescendo.

TECHNIQUE

Voie d'abord primaire: Artère radiale droite - 6 French - Succès voie d'abord - Succès fermeture avec Compression manuelle.

Matériel:

- ASAHI SION BLUE (ASAHI).
- RYUREI® 2,5 X 10 (Terumo).
- EXPO FL3.5 100 cm (Boston Scientific).
- introducteur 6F radiale (ABBOTT LABORATORIES).
- CONVEY 6F LEFTBU3.5 (Boston Scientific).
- ORSIRO 2.75 X 40 mm (Biotronik).
- PROMUS ELITE 2.25 X 32 mm (Boston Scientific).
- stent actif 2.5 x 48 (ABBOTT LABORATORIES).

CONTROLE ANGIOGRAPHIQUE

- L'artère interventriculaire antérieure est de taille normale. Les branches de division de cette artère coronaire sont de petits calibres et donnent 2 branches diagonales significatives. L'artère interventriculaire antérieure proximale présente une sténose très serrée (70-90%). L'artère interventriculaire antérieure moyenne présente une sténose très serrée (70-90%) de type B1, englobant l'origine de la seconde diagonale. L'artère interventriculaire antérieure distale est indemne de sténose. Cette lésion s'étend jusqu'à l'artère interventriculaire antérieure distale. La première diagonale présente une sténose très serrée (70-90%).

ANGIOPLASTIE

La sonde porteuse CONVEY 6F LEFTBU3.5 est positionnée au niveau du tronc commun de manière sélective et présente un bon support. Un guide ASAHI SION BLUE franchit la lésion et est positionné en aval de l'artère interventriculaire antérieure distale. Mise en place d'un ballon RYUREI® 2,5 X 10 au niveau de l'artère interventriculaire antérieure moyenne pour prétilater la lésion. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 14 ATM pour une durée totale de 15 sec. Mise en place d'un stent actif ORSIRO 2.75 X 40 mm au niveau de l'artère interventriculaire antérieure moyenne. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 14 atm pour une durée totale de 15 sec. Mise en place d'un stent actif PROMUS ELITE 2.25 X 32 mm au niveau de la première diagonale sans prétilatation. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 14 atm pour une durée totale de 15 sec. Mise en place d'un stent actif stent actif au niveau de l'artère interventriculaire antérieure proximale sans prétilatation. Une inflation est réalisée à une pression maximale de 14 atm pour une durée totale de 15 sec. Après contrôle angiographique final, la première diagonale est indemne de lésion significative.

Après contrôle angiographique final, l'artère interventriculaire antérieure moyenne est indemne de lésion significative.

Après contrôle angiographique final, l'artère interventriculaire antérieure proximale est indemne de lésion significative.

CONCLUSION

Succès d'angioplastie de la première diagonale. Implantation d'un stent actif. Succès d'angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure moyenne. Implantation d'un stent actif. Succès d'angioplastie de l'artère interventriculaire antérieure proximale. Implantation d'un stent actif.



Dr Bakrim AMARIR

Dr. AMARIR Bakrim
Cardio Thoracique Interventional Tech
Centre International de Marrakech
Tel : 05 24 44 40 49 / 37 58 60
NIP 6 : 071281620



Clinique
Internationale
CIM Santé
Marrakech

Marrakech, le :

Mme: yamid Saadi

RTE DE L'AÉROPORT,
BAB IGHILI 40000
MARRAKECH
TÉL. : 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
FAX : 05 24 44 40 42

طريق المطار، باب إغلي
مراكش 40 000

الهاتف : 05 24 36 95 95
05 24 44 40 40
05 24 44 40 42

CNSS 8670483
PATENTE 45050655
IF 40222599
ICE 00167628000058

ANESTHESIE-REANIMATION
CARDIOLOGIE GENERALE
ET INTERVENTIONNELLE
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
ADULTE ET PEDIATRIQUE
RHUMATOLOGIE
CHIRURGIE THORACIQUE
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE
& TRAUMATOLOGIQUE
ADULTE ET PEDIATRIQUE
NEUROLOGIE
NEURO-CHIRURGIE
CHIRURGIE
MAXILLO-CERVICO-FACIALE
CHIRURGIE PLASTIQUE
& ESTHETIQUE
CHIRURGIE UROLOGIQUE
NEPHROLOGIE
CHIRURGIE VISCERALE
CHIRURGIE PEDIATRIQUE
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
DERMATOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE
HEMATOLOGIE
HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
ONCOLOGIE
PEDIATRIE & REANIMATION
NEONATALE
PNEUMOLOGIE
RADIOLOGIE

SERVICE RADIOLOGIE
0524 369 600
SERVICE CONSULTATIONS
0666 643 837 / 05 24 36 95 45
SERVICE PRISE EN CHARGE
05 24 36 95 85 ET 0662 854 677
SERVICE FACTURATION
0662 852 953 - 05 24 36 95 55

Boston Scientific
Promus ELITE™
2.25mm x 32mm
GTIN 08714729972334
REF H7493941332220
LOT 26714340

Abbott Vascular
XIENCE Xpedition 48



2.5 mm x 48 mm

(01) 0 8717648 15864 3



(17) 250915 (10) 2092241 (91) 5156

REF 1070250-48

LOT 2092241

2022-09-16
(YYYY-MM-DD)

2025-09-15
(YYYY-MM-DD)

Orsiro 2.75/40

BIOTRONIK AG

GTIN 07640130436893

REF 391240



LOT 06223767

CONTACT@CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM

WWW.CLINIQUE-INTERNATIONALE-MARRAKECH.COM

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique - Chirurgie Plastique - Chirurgie Viscérale

Maternité - Cardiologie - Pédiatrie - Pneumo-phtisio-allergologie - Hémodialyse

Radiologie - Scanner - Mammographie - Echographie

COMpte RENDU DE CORONAROGRAPHIE

Nom : YAMID

Date de naissance :

Prénom : SAADIA

Date d'examen : 14/01/2023

Organisme : RAM

Opérateurs

Opérateur : Docteur SANOUSSI Hamza

Produit de contraste - Radiation

Dose de rayon X : 430 cGy cm². 50 cc d'OMNIPAQUE 350 mg I/ml utilisés.

Antécédents et facteurs de risque

Facteurs de risque : Diabète, HTA.

Antécédents cardiovasculaires : RAS.

Renseignements cliniques

L'indication de l'examen : STEMI POSTERIEUR + OAP
CORONAROGRAPHIE

Voie d'abord : Artère radiale droite.

HNF : 5000 mg Risordan : Non Nicardipine : 1 mg Isoptine : Non
Désilet 6 French. Cathéters : JL 3.5, JR 4,0.

CORONAIRE GAUCHE :

Tronc commun gauche : De bon calibre, athéromateux, sans sténose significative.

Inter ventriculaire antérieure : Artère de bon calibre, donne naissance à une petite artère diagonale ; sténoses serrées étagées des segments proximal, moyen et distal de l'IVA.

Circonflexe : Artère de bon calibre, elle donne naissance une belle artère marginale, sténose subocclusive de la marginale moyenne.

CORONAIRE DROITE :

Artère de bon calibre, occlusion d'allure chronique du segment moyen, faiblement reprise par le réseau gauche

Dr. SANOUSSI Hamza
Cardiologue Interventionnel
IMC : 071255400
Avenue II, Rés Nour 2^e étage Appart 10 - Guéliz

**POLYCLINIQUE DU SUD
MARRAKECH**

مصحة الجنوب
مراكش

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique - Chirurgie Plastique - Chirurgie Viscérale

Maternité - Cardiologie - Pédiatrie - Pneumo-phtisio-allergologie - Hémodialyse

Radiologie - Scanner - Mammographie - Echographie

CONCLUSIONS

ATTEINTE TRI-TRONCULAIRE SEVERE :

Inter ventriculaire antérieure : Sténoses serrées étagées des segments proximal, moyen et distal de l'IVA.

Circonflexe : Sténose subocclusive de la marginale moyenne.

CD : occlusion d'allure chronique du segment moyen, faiblement reprise par le réseau gauche

SYNTAX SCORE A 31

Dr. SANOUSSI Hamza
Cardiologue Interventionnel
INP : 021255400
Av Hassan II, Bld Nour 2, 2ème Etage Appt 10 - Guéliz



Chirurgie générale - Chirurgie Traumatologie-orthopédique - Chirurgie Esthétique
Chirurgie Viscérale - Maternité - Neonatalogie - Pédiatrie - Réanimation - Cardiologie
Cathétérisme-cardiaque - Pneumo - Allergologie - Radiologie - Scanner - Mammographie - Echographie

COMPTE RENDU D'ANGIOPLASTIE

Nom : YAMID
DDN : 01/01/1950
Organisme : PAYANT

Prénom : SAADIA
Date d'examen : 14/01/2023

Opérateurs

Opérateur : Docteur SANOUSSI Hamza

Produit de contraste - Radiation

Dose de rayon X : 1835 cGy cm². 100 cc de VISIPAQUE 300 mg utilisés.

Antécédents et facteurs de risque

Facteurs de risque : Diabète, HTA

Antécédents cardiovasculaires : RAS.

Renseignements cliniques

L'indication de l'examen : Syndrome coronarien aigu ST + postérieure compliqué d'OAP.

Coro :

CD : Occlusion totale du segment moyen.

MATERIEL UTILISE:

Desilet : Artère radiale droite 6 F

Catheter guide : JL 4.0 AR 1.0 AL 1.0 JR 4.0 6F

Guide : 0.014

Ballon : RYUERI 1.5 x 10.

DROGUES UTILISEES

Héparine : 8000 U

Plavix : 600 mg

Thromboaspiration : Non

Dr. SANOUSSI Hamza
Cardiologue Interventionnel
INPE: 071255400
Av Hassan II, Rés Nour 2, 2ème Etage Appart 10 - Guéliz





Chirurgie générale - Chirurgie Traumatologie-orthopédique - Chirurgie Esthétique
Chirurgie Viscérale - Maternité - Neonatalogie - Pédiatrie - Réanimation - Cardiologie
Cathétérisme-cardiaque - Pneumo - Allergologie - Radiologie - Scanner - Mammographie - Echographie

DÉROULEMENT DE L'ANGIOPLASTIE DE LA CD

- Intubation difficile de l'ostium de la CD par une sonde JL 3.5 (après échec des sondes JR 4 AR1 ET AL1)
- Echec de franchissement du guide dans la lésion
- Echec de passage de guide à travers la lésion du segment moyen.
- Légère pré-dilatation au ballon TERUMO 1.5 - 10.
- Echec d'angioplastie de la CD moyenne.

Dr. SANOUSSI Hamza
Cardiologue Interventionnel
NPIE: 071255400
Av Hassan II Bld N° 12ème étage Appt 10-Guélinez



ROYAUME DU MAROC
CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

الملكية المغربية
البطاقة الوطنية
لتعريف

SAADIA

YAMID
Née le

à CASABLANCA ANFA

Valable jusqu'au

06.05.2029
صالحة الى غاية

المدر العام للمن

B15340 FT

عبد الطيف حموشي

بـ الدار البيضاء، آنفا
مراداة بـ طارق

بـ

السعادة




RETRAITE



YAMID SAADIA

0001673



N° B15340

رقم

Valable jusqu'au 06 05 2029

صالحة الى غاية 06 05 2029
بنت الجيلاني بن يوسف
و حليمة بنت المعطي

Fille de JILALI ben BOUCHAIB
et de HALIMA bent MAATI

العنوان امرشيش الداليا 02 عمارة اوه الرقى 5 مراكش

Adresse AMERCHICH DALIA 02 IMM E NO 05 MARRAKECH

N° état civil

578H/1956

رقم الحالة المدنية Sexe F الجنس

