

145791

Casablanca , le 04/01/2023

COMPTE RENDU DE : BAZAZ LOUBNA

ECHODOPPLER VEINEUX DES MEMBRES INFÉRIEURS

A droite :

- Réseaux veineux profond et superficiel sans thrombose , réseaux veineux profond continent .
- Jonction saphèno-fémorale de la grande veine saphène est continent tout au long de son trajet, elle mesure 3,5mm en juxta-ostial.
- Absence de paquet variqueux ou de veine perforante.
- La crosse de la PVS se jette au niveau de la Giacomini.
- La petite veine saphène est continent, de calibre normal le long de son trajet.

A gauche :

- Réseaux veineux profond et superficiel sans thrombose , réseaux veineux profond continent .
- Jonction saphèno-fémorale de la grande veine saphène est incontinent tout au long de son trajet, elle mesure 10mm en juxta ostial.
- Elle draine un volumineux paquet variqueux au niveau du tiers moyen de la cuisse qui est non thrombosé.
- La crosse de la PVS se jette au niveau de la Giacomini.
- La petite veine saphène est de calibre normal, incontinent, draine un important paquet variqueux jambier non thrombosé.

AU TOTAL

- Absence de stigmate de thrombose veineuse profonde ou superficielle.
- Aspect incontinent de la grande et petite veine saphène gauches drainant respectivement de volumineux paquets variqueux cruraux et jambiers.
- Absence d'incontinence veineuse à droite.

Dr LASRY BÉTOU GABRIEL
CHIRURGIEN VASCULAIRE
Médecin radiologue
Tél 0522 826 841
Fax 0522 826 841
NIP 00118531 P-145791