

Conditions Générales

POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

C = Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
CS = Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
CNPSY = Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
V = Visite de jour au domicile du malade par le médecin
VN = Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
VD = Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
VD = Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
PC = Acte de pratique médicale courant et de petite chirurgie
k = Actes de chirurgie et de spécialistes

SF = Actes pratiqués par la sage Femme et relevant de sa compétence
SFI = Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
AMM = Actes pratiqués par le masseur ou le kinésithérapeute
AMI = Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
AP = Actes pratiqués par un orthophoniste
AMY = Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
R-Z = Electro-Radiologie
B = Analyses

POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord au de présenter ses observations.

Le bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

LES ACTES SOUMIS A ACCORD PRÉALABLE

- L'HOSPITALISATION EN CLINIQUE
- L'HOSPITALISATION EN HÔPITAL
- L'HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU PREVENTORIUM
- SÉJOUR EN MAISON DE REPOS
- LES ACTES EFFECTUÉS EN SÉRIE, il s'agit d'actes répétés en plusieurs séances ou actes globaux comportant un ou plusieurs échelons dans le temps.

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES
- L'ORTHOPÉDIE
- LA REEDUCATION
- LES ACCOUCHEMENTS
- LES CURES THERMALES
- LA CIRCONCISION
- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit prévenir dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade



24.37
MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

DATE DE DÉPÔT

AÉROPORT CASA ANFA
CASABLANCA
TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 /
FAX / 05 22 91 26 52
TELEX : 3998 MUT
E-mail : mupras@RoyalAirMaroc.com

FEUILLE DE SOINS

N° 868159

A REMPLIR PAR L'ADHÉRENT

Nom & Prénom : BEN-DRAOU EL-BEKRAI
Matricule : 2437 Fonction : RETRAITE Poste :
Adresse : Rue 562 N° 1, TARASTE IN 2600
Tél. : 06 66 12 18 80 Signature Adhérent : SB

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : FAÏHI ICHADDOUJ Age :
Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent Conjoint Enfant

Date de la première visite du médecin : 01/01/2010

Nature de la maladie : STOMAIE CAPSULE DE

S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances :
ACCUEIL

A : , le / Durée d'utilisation 3 mois

Signature et cachet du médecin :
Reda Guedir 333, Rhumel Agadir Gasik Tel : 05 22 56 08
Signature : De Zineb JAH

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Horariaires	Carte et Signature du Médecin attestant le paiement des Actes
19 S		Gratuite	Dr. Zineb - Rhumatologue - 333, Reda Guedira - Tel : 05 22 55 03 06
19 S		# 250,00 Dh	Dr. Zineb JBILI Rhumatologue - Sous la Bonne Casse - 56 08 05

EXECUTION DES ORDONNANCES

et du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
MACIE IBN ROUCHD 21idi BELAYACHT 1. Reda Guedira, Cité Djamaa Alanca - Tél: 0522 37 07 06	04.04.19	1207,90

ANALYSES – RADIOGRAPHIES

Signature et Signature du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	03/04/15	Balle +4	360,-

AUXILIAIRES MEDICAUX

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET DE RHUMATOLOGIE

Docteur Zineb JBILI
RHUMATOLOGUE

Spécialiste des Os, Articulations
Et La Colonne Vertébrale
Ostéoporose
Echographie Ostéo-articulaire
Biothérapie



الدكتورة زينب جبيلي
أخصائية في أمراض الروماتيزم

أخصائية في أمراض العظام و المفاصل
و العمود الفقري
هشاشة العظام
الفحص بالصدى المفاسد و العضلات
العلاج بالأدوية البيولوجية

Casablanca, Le :

04/04/2019

FATHI KHADDOUJ

70,00 x 3

- Civastine 10 mg
1 Comprimé, soir, pendant 6 mois

39,80

- Laroxyl 40 mg / ml
05 gouttes le soir au coucher pendant 05 jours puis 07 gouttes le soir au coucher pendant 05 jours puis 10 gouttes le soir au coucher pendant 05 jours puis 15 gouttes le soir, pendant 4 mois

30,00 x 2

- Ixadol
1 Comprimé, soir, pendant 10 jours et au besoin (en cas de douleur) 2B

111,50

- Piasclidine 300 mg
1 Gélule, midi, pendant , 6 mois

79,70

- Riacen 20 mg
1 Gélule, après le repas midi, pendant , 15 jours

40,00 x 6

- Geprid 2 mg
1 Comprimé, matin, pendant 06 mois

1207,90

Dr. ZINEB JBILI
Rhumatologue
333, Reda Gdira Ben M'sik Casablanca
Tél : 05 22 56 08 05

CABINET DE RHUMATOLOGIE

Docteur Zineb JBILI
RHUMATOLOGUE

Spécialiste des Os, Articulations
Et La Colonne Vertébrale
Ostéoporose
Echographie Ostéo-articulaire
Biothérapie



الدكتورة زينب جبيلي
أخصائية في أمراض الروماتيزم

أخصائية في أمراض العظام و المفاصل
و العمود الفقري
شاشة العظام
الفحص بالصدى المفاسد و العضلات
العلاج بالأدوية البيولوجية

Casablanca, Le :

٥٨ / ٠٤ / ٢٠١٩

FATHI KHADDOUJ

- cholestérol total
- Triglycérides
- Hb A1c (Hémoglobine glyquée)
- Acide Urique

LABORATOIRE ZI 21 D'ANALYSES
Avenue du Pharaon Résidence KENZ
N° 5 - Résidence Extension Bourgogne
Tél 05 22 68 87 49/54 Casablanca

Dr. Zineb JBILI
Rhumatologue
333, Reda Gdira Ben M'sik Casablanca
Tél : 05 22 56 08 05

LABORATOIRE ZIZI D'ANALYSES MEDICALES

5,Avenue du Docetur Mohamed Sijelmassi (ex Av du phare) - Résidence KENZ
Racine extension Bourgogne -Casablanca.
Tél : 0522 368749 Fax : 0522 368754
N° de patente : 33104766 ICE : 00168 1325 000031 INPE : 097159503

FACTURE N° : 1904030054

Casablanca le 03–04–2019
Prescripteur : Dr ZINEB JBILI

Mme FATHI Khaddouj

Demande N° 1904030054
Date de l'examen : 03–04–2019

Analyses :

Récapitulatif des analyses

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
9105	Prélèvement sanguin	E25	E
0100	Acide urique	B30	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0134	Triglycérides	B60	B

Total des B : 220

TOTAL DOSSIER : 320 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent vingt dirham s

LABORATOIRE ZIZI D'ANALYSES MEDICALES
Avenue du Phare 17 Résidence KENZ
N° 5 - Racine Extension Bourgogne
Tel 0522 368749 / 587415 Casablanca

LABORATOIRE ZIZI D'ANALYSES MEDICALES

5,Avenue du Docetur Mohamed Sijelmassi (ex Av du phare) - Résidence KENZ
Racine extension Bourgogne -Casablanca.
Tél : 0522 368749 Fax : 0522 368754

Date du prélèvement : 03-04-2019 à 11:46
Code patient : 1904030054

Mme FATHI Khaddouj
Dossier N° : 1904030054
Prescripteur : Dr JBILI ZINEB



BIOCHIMIE SANGUINE (Hitachi 911)

Hémoglobine glyquée (HbA1c) 6.9 % (4.5-7.0)

Interprétation :

(Diabète stable < 7 %)

(Diabète instable > 8 %)

(Niveau non diabétique <6%)

Acide urique 69 mg/L (23-61) *<60*

Cholestérol total 2.90 g/L (1.40-2.20) *11*

Triglycérides 1.05 g/L (0.40-1.88) *✓*

Validé par : Dr. ABDELHAFID ZIZI



RIACEN® gélules et suppositoires

Piroxicam

Composition :

Formes	RIACEN® 10 mg	RIACEN® 20 mg	RIACEN® 20 mg
Piroxicam	10 mg	20 mg	
Excipients	(dont lactose) q.s.p. 1 gélule	(dont lactose) q.s.p. 1 gélule	

Propriétés :

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) de la famille des oxicams.

Indications :

RIACEN est indiqué dans de nombreuses affections qui font appel à un traitement antiphlogistique et/ou analgésique comme l'arthrose mono et polyarticulaire, l'arthrite rhumatisante, la spondylarthrite ankylosante, la goutte aiguë, la périarthrite, les lombosciatiques, les rhumatismes musculaires, les fibromyosites.

Contre-indications :

RIACEN est contre-indiqué en cas d'allergie à l'aspirine et aux AINS, d'ulcère de l'estomac, d'insuffisance hépatique ou rénale ou de traitement anticoagulant.

Effets indésirables :

Gastrites, stomatites (inflammation de la bouche et des gencives), douleurs abdominales, voire même ulcération du tube digestif. Dans certains cas, jaunisse, céphalées (maux de tête), bourdonnements d'oreille et somnolence. Parfois apparaissent des manifestations allergiques cutanées, une photosensibilisation ou un asthme. En cas de doute, signalez-le à votre médecin traitant.

Enfants de moins de 15 ans : exceptionnelles infections graves de la peau en cas de varicelle.

Précautions d'emploi :

RIACEN est susceptible de diminuer l'efficacité du stérilet.

Consulter votre médecin avant de prendre ce traitement en cas de grossesse ou d'allaitement.

Les sujets âgés ne doivent prendre ce traitement que sous contrôle médical.

RIACEN est déconseillé chez les enfants de moins de 15 ans.

Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent être avertis des risques de vertiges et de somnolence inhérents à ce traitement.

L'utilisation prolongée de RIACEN doit être suivie par des examens médicaux réguliers.

Ne pas associer RIACEN aux anti-inflammatoires non stéroïdiens dont l'aspirine, le méthotrexate, le lithium, la zidovudine,

AZT, la ciclosporine et certains antihypertenseurs (diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, bêta-bloquants).

L'association aux héparines, à la ticlopidine, aux anticoagulants oraux et aux thrombolytiques augmente le risque hémorragique.

Arrêter le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale ou de manifestation cutanée ou muqueuse de type prurit, rash, aphtha, conjonctivite.

En cas de doute ou de réaction allergique, contacter immédiatement votre médecin traitant ou le centre antipoison le plus proche.

Mode d'emploi et posologie :

La dose quotidienne totale de Piroxicam administrée ne doit pas dépasser quarante milligrammes. En cas de traitement prolongé, les doses sont à diminuer.

- Gélules : 1 à 2 gélules par jour, au cours des repas, avec un grand verre d'eau.

- Suppositoires : 1 à 2 suppositoires par jour

Formes et présentations :

RIACEN crème à 1% - Tube de 15 g

RIACEN crème à 1% - Tube de 50 g

RIACEN 20 mg - Boîte de 10 suppositoires

RIACEN 10 mg - Boîte de 20 gélules

RIACEN 20 mg - Boîte de 20 gélules

Liste I (tableau A)

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité



PIASCLEDINE® 300 mg, gélule

Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne semble pas être une réaction normale au médicament. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucun effet indésirable.

amant les informations fournies dans

PIASCLEDINE® 300MG

Boîte de 15 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 96,40 DH



6 118001 070732



PIASCLEDINE® 300mg, gélule

Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne semble pas être une réaction normale au médicament. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucun effet indésirable.

amant les informations fournies dans

PIASCLEDINE® 300MG

Boîte de 15 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 96,40 DH



6 118001 070732



PIASCLEDINE® 300mg, gélule

Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne semble pas être une réaction normale au médicament. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucun effet indésirable.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

PIASCLEDINE® 300MG

Boîte de 15 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 96,40 DH



6 118001 070732

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Régurgitations qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu du repas.
- Rares réactions allergiques.
- Exceptionnelles atteintes hépatiques avec modification du bilan hépatique.
- Diarrhées et douleurs de l'estomac.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non stéroïdiens).

Ce médicament agit également sur les gencives.

Ce médicament est indiqué en traitement symptomatique (douleur et gêne fonctionnelle) à

5. COMMENT CONSERVER PIASCLEDINE 300 mg,



PIASCLEDINE® 300 mg, gélule

Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne se présente pas dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez rien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

PIASCLEDINE® 300 MG

Boîte de 15 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 96,40 DH



6 118001 070732

ez



PIASCLEDINE® 300 mg, gélule

Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne se présente pas dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez rien.

PIASCLEDINE® 300 MG

Boîte de 15 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 96,40 DH



6 118001 070732



PIASCLEDINE® 300 mg, gélule

Insaponifiables d'avocat et de soja

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne se présente pas dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez rien.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

PIASCLEDINE® 300 MG

Boîte de 15 gélules

Distribué par Sothema-Bouskoura

PPV : 96,40 DH

6 118001 070732

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PIASCLEDINE 300 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
3. Comment prendre PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PIASCLEDINE 300 mg, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Régurgitations qui peuvent être évitées en prenant la gélule au milieu du repas.
- Rares réactions allergiques.
- Exceptionnelles atteintes hépatiques avec modification du bilan hépatique.
- Diarrhées et douleurs de l'estomac.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

1. QU'EST-CE QUE PIASCLEDINE 300 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active extraite d'huiles d'avocat et de soja.

Ce médicament agit sur les articulations (il appartient au groupe de médicaments appelés autres agents anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non stéroïdiens).

Ce médicament agit également sur les gencives.

Ce médicament est indiqué en traitement symptomatique (douleur et/ou fonctionnalité) à

5. COMMENT CONSERVER PIASCLEDINE 300 mg,

GEPRID®

Un comprimé contient :

GEPRID®	
Glimépiride	1 mg
Excipients	(dont lactose E172)

Lot : 17097

Per : 12.2020

PPV : 40 DH 00

**Propriétés :**

Antidiabétique oral (sulfamidique) pour le diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulino-dépendants (de type II) chez l'adulte, lorsque le régime physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour rétablir

Contre-indications :

Diabète insulino-dépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité aux sulfamides ou aux autres sulfonylurées.

Ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse ou d'allaitement.

Effets indésirables :

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée.

Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une hypoglycémie.

En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations de faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, contactez votre médecin traitant ou les urgences.

La prise du médicament doit s'accompagner d'une surveillance (taux de sucre dans le sang et les urines).

Certains médicaments, comme le miconazole ou la phénybutazone, potentialisent le risque d'hypoglycémie. Tandis que d'autre, comme les corticoïdes, ont l'effet inverse, et diminuent l'effet de ces antidiabétiques. Les bêta-bloquants peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie. Si vous prenez un autre médicament, signalez-le toujours au médecin ou au pharmacien. Evitez la consommation d'alcool (effet antabuse). L'alcool augmente l'effet hypoglycémiant des sulfamides.

Mode d'emploi et posologie :

La base d'un traitement efficace du diabète est un régime alimentaire adapté, une activité physique régulière ainsi que des contrôles sanguins et urinaires réguliers. Le non-respect du régime alimentaire ne peut être compensé par la prise de comprimés ou un traitement par l'insuline.

La posologie dépend des résultats de la glycémie et de la glycosurie.

Se conformer à la prescription médicale.

Formes et présentations :

GEPRID® 1 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 2 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 3 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 4 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

Liste I (tableau A)

Conserver à température < 30 degrés et à l'abri de l'humidité.

Lot : 17097

Per : 12.2020

PPV : 40 DH 00

GEPRID® 3 mg

mg

4 mg



Lot : 17097

Per : 12.2020

PPV : 40 DH 00



Lot : 17097

Per : 12.2020

PPV : 40 DH 00

PPV 39 DH 80®

PER 12-21

LOT H2629

30,00

Un comprimé contient :

LOT 181870

EXP 09 2020

PPV 30,00

Indications thérapeutiques :

LOT 181870

EXP 09 2020

PPV 30,00

GEPRID® 2 mg	GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
2 mg	3 mg	4 mg
(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E110) q.s.p.

Hypoglycémiant appartenant à la classe des sulfonylurées, utilisé dans le diabète sucré non-insulino-dépendant.

Lot : 17097
Per : 12.2020
PPV : 40 DH 00

GEPRID®

Glimépiride

40,00

GEPRID® 1 mg	GEPRID® 2 mg	GEPRID® 3 mg	GEPRID® 4 mg
Glimépiride	1 mg	2 mg	3 mg
Excipients	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E172) q.s.p.	(dont lactose et E110) q.s.p.

Propriétés :

Antidiabétique oral (sulfamide hypoglycémiant appartenant à la classe des sulfonylurées). Diabète sucré non-insulino-dépendant.

Indications thérapeutiques :

Diabète sucré non insulino-dépendants (de type II) chez l'adulte, lorsque le régime physique et la réduction pondérale seuls ne sont pas suffisants pour rétablir l'équilibre glycémique.

Contre-indications :

Diabète insulino-dépendant, troubles rénaux ou hépatiques, hypersensibilité au glimepiride, à l'un des constituants ou aux autres sulfonylurées.

Ne pas utiliser ce médicament en cas de grossesse ou d'allaitement.

10,00

**Effets indésirables :**

Possibilité de troubles digestifs, ou d'une éruption cutanée. En cas de doute, signalez-le à votre médecin. Exceptionnellement, ce médicament peut provoquer une jaunisse.

En cas d'hypoglycémie, on observe les manifestations secondaires suivantes : sueurs froides, pouls rapide, faim, anxiété et difficultés respiratoires. En cas de doute, consommez des sucres rapides. En cas d'hypoglycémie grave contactez votre médecin traitant ou les urgences médicales.

Précautions d'emploi :

Les sujets âgés, les nourrissons et les enfants ne doivent prendre ce traitement que sous contrôle médical. L'utilisation prolongée de ce médicament potentialise le risque d'apparition de ses effets indésirables. Les conducteurs de véhicules doivent être particulièrement prudents (risque de malaise dû à l'hypoglycémie). Vous devez connaître les risques d'hypoglycémie et apprendre à reconnaître les signes. Demandez conseil à votre médecin traitant.

La prise du médicament doit s'accompagner d'une surveillance régulière de la glycémie et de la glycosurie (taux de sucre dans le sang et les urines).

Certains médicaments, comme le miconazole ou la phénylbutazone, potentialisent le risque d'hypoglycémie, tandis que d'autre, comme les corticoïdes, ont l'effet inverse, et diminuent l'effet de ces antidiabétiques.

Les bêta-bloquants peuvent masquer les signes de l'hypoglycémie.

Si vous prenez un autre médicament, signalez-le toujours au médecin ou au pharmacien.

Eviter la consommation d'alcool (effet antabuse). L'alcool augmente l'effet hypoglycémiant des sulfamides.

Mode d'emploi et posologie :

La base d'un traitement efficace du diabète est un régime alimentaire adapté, une activité physique régulière ainsi que des contrôles sanguins et urinaires réguliers. Le non-respect du régime alimentaire ne peut être compensé par la prise de comprimés ou un traitement par l'insuline.

La posologie dépend des résultats de la glycémie et de la glycosurie.

Se conformer à la prescription médicale.

Formes et présentations :

GEPRID® 1 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 2 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 3 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

GEPRID® 4 mg - boîte de 30, 60 et 90 comprimés

Liste I (tableau A)
Conserver à température < 30 degrés et à l'abri de l'humidité.

CIVASTINE®

Simvastatine
10 mg, 20 mg, 40 mg

Lisez attentivement l'intégrer prendre ce médicament. Elle contient des informations sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

PPV 70DH00
PER 06/20
LOT H1525

70,00



CIVASTINE®

Simvastatine
10 mg, 20 mg, 40 mg

Lisez attentivement l'intégrer prendre ce médicament. Elle contient des informations sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou votre pharmacien.

PPV 70DH00
PER 06/20
LOT H1526

70,00



CIVAS

Simvastatine
10 mg, 20 mg, 40 mg

Lisez attentivement l'intégrer prendre ce médicament. Elle contient des informations sur votre traitement et votre maladie. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit pour traiter une maladie cardiaque. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

PPV 70DH00
PER 06/20
LOT H1526

70,00



CIVASTINE®, comprimé pelliculé

Chaque comprimé contient	CIVASTINE® 10 mg	CIVASTINE® 20 mg	CIVASTINE® 40 mg
simvastatine (D.C.I.)	10 mg	20 mg	40 mg

Excipients :

q.s.p 1 comprimé

1. QU'EST-CE QUE CIVASTINE®, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

HYPOLIPIDÉMIANT/INHIBITEUR DE L'HMG-Co A REDUCTASE

Votre médecin vous a prescrit ce médicament pour réduire l'excès de cholestérol que vous avez dans le sang.

Le cholestérol peut contribuer à développer une maladie coronarienne en bouchant les vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène et les substances nécessaires à nourrir votre cœur.

Cette obstruction ou durcissement des artères est appelée athérosclérose. L'athérosclérose peut provoquer une angine de poitrine et un infarctus du myocarde. Ce médicament est préconisé dans certaines hypercholestérolémies, lorsqu'un régime alimentaire adapté et assidu s'est avéré insuffisant. Il est également indiqué pour prévenir la survenue d'un infarctus du myocarde chez les patients souffrant d'hypercholestérolémie et de maladie coronarienne, malgré un régime adapté et assidu.

La poursuite du régime est toujours indispensable.

