

<b>A REMPLIR PAR L'ADHERENT</b>		Mme 0750
Nom & Prénom : <i>Abraham Mez</i>		Signature de l'adhérent
Fonction : <i>Rebbiti</i>	Phones : <i>0661241340</i>	
Mail : <i>miz2005@yahoo.fr</i>		

<b>MEDECIN</b>	Prénom du patient	
Adhérent <input checked="" type="checkbox"/>	Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age .....	Date .....
Nature de la maladie	Date 1ère visite .....	
<i>HLD</i>		

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			<b>Signature et cachet du médecin</b>
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	

<b>PHARMACIE</b>	Date : <i>06/03/2019</i>	<b>Signature et cachet de la pharmacie</b>
Montant de la facture	<i>470,10</i>	
PHARMACIE ROUDA Mme LEBAR Khadija Ep MIKE 26 Bd Brahim Roudani Vers MIV You Maarif - Casablanca 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12		

<b>ANALYSES - RADIOGRAPHIES</b>		Date .....	<b>Signature et cachet du laboratoire</b>
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires		

<b>AUXILIAIRES MEDICAUX</b>				Date .....	<b>Signature et cachet de l'assureur</b>
Nombre				Montant détaillé des Honoraires	
AM	PC	IM	IV		

# DOCTEUR DALILA EL BAGHDADI

Spécialiste en pathologie cardiovasculaire

Ancien interne des hôpitaux de Paris

Diplôme de cardiologie pédiatrique de Paris Descartes

ECG-Echodoppler cardiaque et vasculaire - holter ECC-

Holter tensionnel- Epreuve d'effort



## الدكتورة دليلة البغدادي

اختصاصية في أمراض القلب و الشرايين

طبيبة سابقة في مستشفيات باريس

دبلوم طب قلب الاطفال بباريس

تخطيط القلب

فحص القلب و الشرايين بالصدى

تسجيل دقات القلب لمدة 24 ساعة

قياس الضغط الدموي لمدة 24 ساعة

تخطيط الجهد

### CABINET EL BAGHDADI CARDIOLOGIE

Casablanca, le

06/03/19

Mr Ibrahimi Mohamed

ii Cordemil 80 2,5 mg ١٤٠١,٢٧ X ٥٤,١٣  
٩ Coveram 515 mg ١٤٠١,٢٧ X ٢٠٨,٥٥  

---

T = ٤٧٠,١٥  
III de 2 mois

Docteur Dalila EL BAGHDADI  
Cardiologue  
46, Rue des Hôpitaux Casablanca  
Tél: 06 61 90 24 45 / 05 22 20 33 86

صيدلية الروdanی  
PHARMACIE ROUDANI  
Mme LEBBAR Khadija Ep MIKOU  
26, Bd Brahim Roudani Vers Mly Youssef  
Maârif - Casablanca  
Tél : 05 22 27 23 86 / 05 22 27 12 24

46, rue des hôpitaux casablanca · 1er étage ( en Face chu ibn rochd) أمام مصلحة المستعجلات

0522 20 33 66

0661 90 42 45

dalila\_Baghdadi@hotmail.fr

# **COVERAM® 5 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 10 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 5 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

# **COVERAM® 10 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la refaire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables éventuels?»).

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amiodipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amiodipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amiodipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en décontractant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

**Ne prenez jamais COVERAM, comprimé :**

- si vous êtes allergique au péridopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à l'amiodipine ou aux autres inhibiteurs calciques, ou à l'un des autres composants contenues dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations»).
- si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre COVERAM, comprimé, en début de grossesse, voir rubrique «Grossesse et Allaitement»).

• si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démeangements intenses ou des éruptions cutanées sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelques qu'en soient les circonstances (état appelé angioédème).

• si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament contenant de l'alsikrénin pour diminuer votre pression artérielle,

• si vous avez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable de fournir assez de sang à l'organisme),

• si vous avez une pression artérielle très basse (hypotension),

• si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

• si vous êtes dialysé(e) ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, COVERAM peut ne pas être adapté.

• si vous avez des problèmes rénaux avec diminution de l'apport sanguin au niveau rénal (sténose artérielle rénale),

• si vous êtes actuellement traité par sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque (voir «Avertissements et précautions» et «Autres médicaments et COVERAM»).

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre COVERAM, comprimé, si vous êtes dans les cas suivants :

• cardiomyopathie hypertrophique (maladie du muscle cardiaque) ou sténose de l'artère rénale (rétrécissement de l'artère menant le sang au rein),

• insuffisance cardiaque,

• augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive),

• tout autre problème cardiaque,

• problèmes hépatiques,

• problèmes rénaux ou si vous êtes dialysé,

• si vous avez des taux anormalement élevés d'une hormone appelée aldostéronisme dans le sang (aldostéronisme primaire)

• maladie du collagène vasculaire (maladie du tissu conjonctif) comme un lupus érythémateux disséminé ou une sclérodermie,

• diabète,

• si vous suivez un régime pauvre en sel ou si vous utilisez un substitut de sel contenant du potassium (un bon équivalent du potassium dans le sang est indispensable),

• si vous êtes une personne âgée et que votre dose a besoin d'être augmentée,

• si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traîter une hypertension :

- un «antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II» (ARA-II) (aussi connu sous le nom de sartan – par exemple valsartan, telmisartan, irbesartan), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète,

- alsikrénin.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle et le taux des électrolytes (par ex. du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique «Ne prenez jamais COVERAM, comprimé».

• si vous prenez l'un des médicaments suivants, le risque d'angioédème est augmenté :

- ràcadotril (utilisé pour traiter la diarrhée),

- sirolimus, érléomilus, temsirolimus et autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs de mTOR (utilisé pour éviter le rejet d'organes transplantés),

- sacubitril (disponible en association à dose fixe avec valsartan), utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque chronique.

• si vous êtes un patient noir : ce médicament peut augmenter le risque d'anciopéride-

mine. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

### **Allaitement**

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prématuré.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si avec le traitement, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne, si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devrez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

### **COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté**

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Avez-vous comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous. La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

COVERAM, comprimé sera généralement prescrit chez les patients prenant déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amiodipine.

### **Utilisation chez les enfants et les adolescents**

COVERAM, comprimé n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents.

### **Si vous avez pris plus de COVERAM, comprimé que vous n'aurez dû :**

Si vous avez pris trop de comprimés, contactez immédiatement le service d'urgence de l'hôpital le plus proche ou votre médecin. L'événement plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension associée à des vertiges ou étourdissements. Si cela se produit, elle peut être combattue en allongeant le patient, jambes relevées.

### **Si vous oubliez de prendre COVERAM, comprimé**

Il est important de prendre votre médicament chaque jour car un traitement régulier est plus efficace. Cependant, si vous avez oublié de prendre COVERAM, comprimé reprenez simplement votre traitement le jour suivant comme d'habitude.

Ne prenez pas une double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre COVERAM, comprimé**

Le traitement avec COVERAM, comprimé étant généralement un traitement de longue durée, vous devez demander conseil à votre médecin avant de l'interrompre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin. à [www.sanofi-canada.ca](http://www.sanofi-canada.ca) ou vérifiez auprès de votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?**

Comme tous les médicaments, COVERAM, comprimé peut entraîner des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas nécessairement chez tous les patients.

Si vous remarquez quelque chose de inhabituel ou de suspect, contactez immédiatement votre médecin.

• respiration sifflante, toux, difficultés respiratoires, gonflement des paupières, gonflement de la face, gonflement des voies respiratoires,

• réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, érythème, œdème, anaphylaxie, éruption vésiculeuse, desquamante et gonflement de la peau (éruption des mucosités (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques,

• vertiges ou étourdissements sévères,

• crise cardiaque, battements du cœur inhabituellement rapides ou anormaux, douleurs thoraciques,

• inflammation du pancréas pouvant entraîner une douleur abdominale et dorsale accompagnée d'un très grand malaise.

Les effets indésirables fréquents suivants ont été rapportés. Si l'un de ces effets dérangeant ou s'il dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin :

• Effets indésirables très fréquents (peut survenir chez plus de 1 utilisateur sur 10) : douleur dans l'abdomen, étourdissement d'étonnement d'eau,

• Effets indésirables fréquents (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 10) : maux de tête, étourdissements, somnolence (en particulier au début du traitement), vertiges, sensation d'engourdissement, gonflement dans les membres, troubles de la vision (y compris vision double), acouphènes (sensation de bruit dans les oreilles), papillitites

(conscience de vos battements cardiaques), flush, étourdissement dû à une baisse de pression artérielle, toux, essoufflement, nausées, vomissements, douleurs abdominales, troubles du goût, dyspepsie ou digestion difficile, perturbation du transit abdominal, diarrhées, constipation, réactions allergiques (telles que éruptions cutanées, démangeaisons), crampes musculaires, fatigue, faiblesse, gonflement des cheveux (syndrome périphérique).

D'autres effets indésirables figurant sur la liste suivante ont été rapportés. Si vous ressentez l'un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

• Effets indésirables peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 patient sur 100) : changements d'humeur, anxiété, dépression, insomnie, troubles du sommeil, tremblements, perte de conscience, perte de la sensation de douleur, battements cardiaques irréguliers, rhinitis (nez bouché ou qui coule), gonflement des cheveux, tâches rouges sur la peau, changement de couleur de la peau, douleurs articulaires, arthralgie, douleurs

musculaires, douleurs musculaires, douleurs osseuses, douleurs articulaires, douleurs

**COVERAM® 5 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**COVERAM® 10 mg / 5 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**COVERAM® 5 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**COVERAM® 10 mg / 10 mg** Comprimés

Péridopril arginine / Amlodipine

**Veuillez Lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. (Cf. «Quels sont les effets indésirables éventuels ?»).

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que COVERAM, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre COVERAM, comprimé ?
3. Comment prendre COVERAM, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver COVERAM, comprimé ?
6. Comment l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE COVERAM, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et inhibiteurs calciques

Code ATC : C09BB04

COVERAM, comprimé est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle et/ou dans le traitement de la maladie coronaire stable (une maladie où l'alimentation du cœur en sang est réduite ou bloquée).

Les patients qui prennent déjà séparément des comprimés de péridopril et d'amlopipine peuvent à la place recevoir un comprimé de COVERAM, comprimé qui contient les deux principes actifs.

COVERAM, comprimé est une association de deux principes actifs, péridopril et amlopipine.

Le péridopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC). L'amlopipine est un antagoniste calcique (qui appartient à la classe des dihydropyridines). Ceux-ci agissent en dilatant et en détendant les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le travail du cœur pour expulser le sang dans les vaisseaux.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Ne prenez jamais COVERAM, comprimé :

• si vous êtes allergique au péridopril ou à tout autre inhibiteur de l'enzyme de conversion ou à l'amlopipine ou aux autres inhibiteurs calciques, ou à l'un des autres composants contenues dans ce médicament (Cf. «Contenu de l'emballage et autres informations»).

• si vous êtes enceinte depuis plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre COVERAM, comprimé, en début de grossesse, voir rubrique «Grossesse et Allaitement»).

• si vous avez déjà eu des symptômes tels que des sifflements respiratoires, un gonflement de la face ou de la langue, des démangeaisons intenses ou des érythèmes cutanés sévères lors d'un traitement antérieur par IEC ou si vous ou un membre de votre famille a déjà eu ces symptômes quelle qu'en soient les circonstances (état appelé angiodysœdem).

• si vous avez de diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament augmentant de l'insuline pour diminuer votre pression artérielle,

• si vous avez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiaque (une affection dans laquelle votre cœur est incapable de fournir assez de sang à l'organisme).

• si vous avez une pression artérielle très basse (hypotension),

• si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque après une crise cardiaque.

• si vous êtes dialysé(e) ou si vous bénéficiez d'un autre type de filtration sanguine. En fonction de la machine utilisée, COVERAM peut ne pas être adapté.

• si vous avez des problèmes rénaux avec diminution de l'apport sanguin au niveau rénal (sténose artérielle rénale).

• si vous êtes actuellement traité par sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter l'insuffisance cardiaque (voir «Avertissements et précautions» et «Autres médicaments et COVERAM»).

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre COVERAM, comprimé, si vous êtes dans les cas suivants :

• cardiomyopathie hypertrophique (maladie du muscle cardiaque) ou sténose de l'artère rénale (rétrécissement de l'artère menant le sang au rein),

• insuffisance cardiaque.

primit. COVERAM, comprimé est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

**Allaitement**

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. COVERAM, comprimé est déconseillé aux femmes qui allaitent et votre médecin pourra choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou un prémature.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

COVERAM, comprimé peut affecter votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Si je le traite, vous ne vous sentez pas bien, si vous avez la tête qui tourne,

si vous vous sentez faible ou fatigué, ou si vous présentez des maux de tête, vous ne devez pas conduire de véhicules ni utiliser de machines et contactez votre médecin immédiatement.

**COVERAM, comprimé contient du lactose monohydraté**

Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucrés, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**3. COMMENT PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas doute.

Avez-vous pris votre comprimé avec un verre d'eau, de préférence au même moment de la journée, le matin, avant le repas. Votre médecin décidera de la posologie adaptée pour vous. La dose habituelle est de 1 comprimé par jour.

COVERAM, comprimé sera généralement prescrit chez les patients prenant déjà séparément des doses de amlopipril et de péridopril.

**Utilisation chez les enfants et les adolescents**

COVERAM, comprimé n'est pas recommandé chez les enfants et les adolescents.

Si vous avez pris plus de COVERAM, comprimé que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris trop de comprimés, contactez immédiatement le service d'urgence de l'hôpital le plus proche ou votre médecin. L'événement le plus probable, en cas de surdosage, est l'hypotension associée à des vertiges ou étourdissements. Si cela se produit, elle peut être combattue en allongeant le patient, jambes relevées.

**Si vous oubliez de prendre COVERAM, comprimé**

Il est important de prendre votre médicament chaque jour car un traitement régulier est plus efficace. Cependant, si vous avez oublié de prendre COVERAM, comprimé, reprenez simplement votre traitement le jour suivant comme d'habitude.

Ne prenez pas une double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre COVERAM, comprimé**

Le traitement devra être arrêté progressivement. Si vous avez arrêté de prendre COVERAM, comprimé, demandez plus de temps à votre médecin pour arrêter complètement.

4. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE COVERAM, COMPRIMÉ ?

Comme pour tous les médicaments, il existe des effets indésirables, mais ils sont généralement bénins et peuvent disparaître rapidement.

Si vous prenez COVERAM, comprimé, il est recommandé de prendre immédiatement de l'acide acétylsalicylique (ASA) ou de l'aspirine si vous avez des difficultés respiratoires.

• gonflement des paupières, du visage ou des lèvres,

• gonflement de la langue et de la gorge, entraînant des difficultés respiratoires,

• réactions cutanées sévères, notamment éruption cutanée intense, urticaire, rougeur de la peau sur l'ensemble du corps, démangeaisons sévères, apparition de vésicules, desquamations et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson) ou autres réactions allergiques,

206,00

# NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## CARDENSIEL®, comprimé pelliculé

### Bisoprolol Fumarate

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang dans le corps. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit appartient à la classe des bêtabloquants.

Il existe d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les gouttières).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements, des douleurs ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force du cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu abrégé par les malades.

Attention avec CARDENSIEL :

vous présentez l'une des affections suivantes, indiquer à votre pharmacien (par exemple, vous prescrire un traitement complémentaire ou réaliser des contrôles plus fréquents) :

• diabète, sucre strict,

• certaines maladies du cœur, comme les troubles du rythme cardiaque, ou les douleurs thoraciques sévères au repos,

• problèmes rénaux ou hépatiques,

• problèmes moins sévères de la circulation sanguine périphérique,

• maladies respiratoires chroniques ou asthme moins sévère,

6"118001"100859"

Cardensiel® 2,5 mg

Comprimés pelliculés sécables B/30

7612160238

si une insuffisance cardiaque chronique stable.

PPV: 54,10 DH

DENSIEL ; il faut prendre

54,10