



# PHARMACIE ALAHRAM

صيدلية الاهرام

SEKKAT Rachid

## Docteur en Pharmacie

Diplômé de la Faculté de Médecine  
et de Pharmacie de l'UCL

## FACTURE

Nº 000238

Casablanca, le

03/06/19

DESIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	MONTANT
Alfajantil 200 eff. (S.V.)	1	26,80	26,80
	1	22,00	22,00

**Prix TOTAL**

4880



# ALGANTIL® (IBUPROFENE)

## FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS :

Dragées dosées à 200 mg : boîte de 20 dragées  
Comprimés effervescents à 200 mg : boîtes de 10 et 20 comprimés  
Suspension buvable pédiatrique à 2 % : flacon de 150 ml  
Suppositoires dosés à 250 mg : boîte de 10 suppositoires.

## COMPOSITION :

### Dragées

Ibuprofène ..... 200 mg par dragée  
Excipient ..... q.s.p. 1 dragée

### Comprimés effervescents

Ibuprofène ..... 200 mg par comprimé effervescent  
Excipient ..... q.s.p. 1 comprimé effervescent

### Suspension buvable pédiatrique

Ibuprofène ..... 2 g pour 100 ml  
Excipient ..... q.s.p. 100 ml de suspension buvable

### Suppositoires

Ibuprofène ..... 250 mg par suppositoire  
Excipient ..... q.s.p. 1 suppositoire

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Analgestique et antipyrrétique.

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

### Dragées, comprimés effervescents et suppositoires

Adultes et enfants de plus de 12 ans :

Ce médicament contient de l'ibuprofène qui est un anti inflammatoire non stéroïden. Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg (soit environ 12 ans) dans le traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que :

- Maux de tête
- Etats grippaux
- Douleurs dentaires
- Régles dououreuses
- Douleurs et fièvre accompagnant les syndromes O.R.L.
- Crise de migraine légère à modérée avec ou sans aura
- Douleurs rhumatismales
- Douleurs traumatiques musculaires ou tendineuses
- Douleurs post-opératoires en chirurgie dentaire

### Suspension buvable pédiatrique

Elle est indiquée chez le nourrisson et l'enfant de 3 mois à 12 ans (40 kg) dans :

- Le traitement de la fièvre et/ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures
- Le traitement symptomatique de l'arthrite chronique juvénile

## CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- Antécédent d'allergie à l'un des constituants de ce produit,
- Ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
- Maladie grave du foie,
- Maladie grave des reins,
- Maladie grave du cœur,
- Lupus érythémateux disséminé.

## EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AUTORISATION DE MISE EN GARDE

Adulte - Enfant de plus de 12 ans :

Chez l'adulte, ne pas dépasser la dose maximale de 1200 mg/jour.

Une dose supérieure peut provoquer des inconvenients parfois graves.

Nourrisson - Enfant :

En cas de douleurs et/ou fièvre, ne pas dépasser la dose maximale parfois graves qui sont ceux observés avec les médicaments anti-inflammatoires.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas :

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite, une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine.
  - de traitement anticoagulant concomitant. Ce médicament peut entraîner des antécédents digestifs (hémie hystale, hémorragie digestive, ulcère, maladie du cœur, du foie ou du rein).
  - de varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison d'exception.
- Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïde : ibuprofène, contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens étrou de l'aspirine.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AUTORISATION DE MISE EN GARDE
- INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
- AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, Y COMPRIS L'ASPIRINE ET SES DÉRIVÉS, DE L'HÉPARINE.
- NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT EN GROSSESSE ET ALLAITEMENT.

## Grossesse

À cours du premier trimestre de grossesse (12 semaines d'aménorrhée), si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), l'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), les enfants peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-vasculaire.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois, contactez votre médecin.

Adaptée vous soit proposée.

PPV 22DH00

EXP 02/2020  
LOT 60004 5

# ALGANTIL®

## Suspension buvable pédiatrique

150 ml