

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins

Veuillez fournir une facture

Veuillez fournir les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'OD.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

W18-345392

DATE DE DEPOT

...../201..

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mle 11716	
Nom & Prénom RCHID KHALID		Fonction RACHID	
Phones		Mail	
MEDECIN	Prénom du patient		
Adhérent	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant	Age
Nature de la maladie		Date 1ère visite	
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances			
Nature des actes	Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
PHARMACIE	Date 03/06/19		
Montant de la facture 4980			
ANALYSES - RADIOGRAPHIES		Date	
Désignation des Coefficients	Montant détaillé des Honoraires		
ILLIAIRES MEDICAUX Date			
Nombre		Montant détaillé des Honoraires	
M	PC	IM	IV

PHARMACIE ALAHRAM

صيدلية الاهرام

SEKKAT Rachid

Docteur en Pharmacie

Diplômé de la Faculté de Médecine

et de Pharmacie de l'U.C.L.

No Rachid Khalid

FACTURE

No 000239

Casablanca, le

03/06/19

DESIGNATION	Quantité	Prix Unitaire	MONTANT
Vernogel 15	1	19,00	19,00
Trimed 10	1	30,80	30,80



Prix TOTAL

4980

TRIMEDAT®

Le principe actif du TRIMEDAT® est la trimébutine, une molécule de synthèse à action régulatrice de la motilité du tube digestif.

Les études effectuées avec la molécule marquée ont montré que la substance imprègne de façon rapide et durable la paroi du canal alimentaire, en se localisant par électrolyse dans les zones ou les plexus autonomes de Meissner et d'Auerbach sont présents.

Les recherches sur les mécanismes d'action ont montré que l'effet fondamental de la trimébutine consiste dans la normalisation des modes de la vitesse du transit gastro-intestinal lorsque celui-ci est modifié, soit qu'il soit accéléré par le sorbitol ou ralenti par la morphine, tandis qu'il est dépourvu d'effets modifiant le transit normal.

Le TRIMEDAT® est par conséquent indiqué dans toutes les situations à états pathologiques dans lesquels il faut ramener à la normale une motilité altérée, quelques soient les causes de cette altération. L'action spécifique du médicament - dépourvu en principe d'effets indésirables - permet son emploi également chez les prostatiques, les sujets glaucomateux et les diabétiques. Les études de tératogenèse et l'expérience clinique ont mis en évidence l'absence d'effets nocifs sur le foetus et la femme enceinte.

INDICATIONS MEDICALES :

- côlon irritable et colopathies en général;
- gastro-duodénites, ulcère peptique, gastropathies dues aux médicaments;
- syndromes dysphagiques et dyspeptiques;
- nausées et vomissements;
- troubles du transit intestinal (constipation, diarrhée);
- régurgitations et vomissements, douleurs abdominales du nourrisson et de l'enfant d'origine dyspeptique, toxique, infectieuse, acétonémique.

INDICATIONS CHIRURGICALES :

- atonie intestinale post-opératoire;
- hoquet, nausées et vomissements post-opératoires.

INDICATIONS DIAGNOSTIQUES :

- gastroduodénographie dans les troubles du passage pylorique;
- intolérance sigmoïde du lavement barbité;
- examens radioscopiques du tube dig

CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité individuelle reconnue

POSOLOGIE :

- Gélules : 1 à 3 gélules par jour.
- Suspension orale :
 - * Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe
 - * Enfants jusqu'à 6 mois : 1/2 cuillère
 - * Enfants de 6 mois à 1 an : 1 cuillère
 - * Enfants 1 an - 5 ans : 1 cuillerée à
 - * Enfants de plus de 5 ans : 2 cuillères

PRESENTATIONS :

Boîte de 20 gélules à 150 mg;

Flacon contenant 150 g de granulé à

PREPARATION DE LA SUSPENSION

Pour préparer extemporanément la sus de l'eau par étape.

La suspension buvable ne doit pas être con-

30,80

A20691 Fleximat

able.

joutant



Laboratoires Pharmaceutiques PHARMA 5
21, Rue des Asphodèles - Casablanca

VERMOGAL

VERMOGAL GEL DERMIQUE ANTI-PARASITAIRE

Le VERMOGAL est un gel pénétrant non gras à appliquer pour éradiquer la gale sarcoptique humaine, et certaines pédiculoses (dont la phthiriasis inguinale) par application topique directe, chez l'enfant et chez l'adulte. Les trois principes actifs associés sont un pyréthrinoïde de synthèse la bioallethrine, son synergisant le Butoxyde de Pipéronyle ou Méprobetyl (P.B.O), et un ammonium quaternaire antiseptique (topique) le bromure de benzododécinium.

INDICATIONS

1. Gale sarcoptique (à SARCOPTES SCABIEI, VAR, HOMINIS) nouvelle ou récidivante, de toute étendue, surinfectée ou non, de l'adulte et de l'enfant.
2. Phthiriasis pubienne (pediculosis corporis)
3. Poux et lentes du cuir chevelu (pediculosis capititis)

Compositin		
	Centésimale	par tube de 60 g
• Bioallethrin	0,50	0,30
• Méprobetyl (P.B.O)	2,50	1,50
• Bromure de benzododécinium	0,10	0,06
• Excipient q.s.p	100,00 g	60,00 g

MODE D'EMPLOI

- Usage antiscabieux (gale, gale surinfectée) chez l'adulte et l'enfant.

Massage léger mais prolongé sur tout le corps (en évitant les yeux, les muqueuses, le cuir chevelu) nécessitant un tube complet et parfois plus chez un adulte de grande taille. Il pourrait être répété en cas de récidive, ce qui imposerait aussi de traiter les parents et les proches, ainsi que le logement et les literies.

- Usage anti-phthiriasique.

Le Vermogal peut s'utiliser dans ce cas sous forme de lotion.

Diluer le contenu d'un tube dans 1 litre d'eau chaude, procéder à un massage soigné du cuir chevelu en mouillant peu à peu la racine des cheveux.

Essuyer et coiffer.

Effectuer une autre application 24 h plus tard.

Le troisième jour faire un shampooing pour éliminer les parasites détruits.

La solution préparée peut se conserver à la température ambiante.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il faut éviter les contacts muqueux. En cas de lavage des mains.

Ne pas laisser à la portée des enfants et l'oxydation des principes actifs.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : L'utilisation au cours du troisième trimestre de grossesse et au cours de l'allaitement.

Surinfections cutanées : à traiter selon prescription.

Durée de Conservation : 3 ans

Date de révision : 02/12

