

## SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.  
Veuillez fournir une facture.

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des						
DROITE GAUCHE				<b>Montant des soins</b>						
HAUT				<b>Début d'exécution</b>						
BAS				<b>Fin d'exécution</b>						
				<b>Coefficient des travaux</b>						
				<b>Montant des soins</b>						
				<b>Date du devis</b>						
				<b>Fin de</b>						
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances										
<p>Détermination du coefficient masticatoire</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td>25533412 00000000 00000000 35533411</td> <td>21433552 00000000 00000000 11433553</td> <td></td> </tr> </table> <p>(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession</p>					D	H	G	25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553	
D	H	G								
25533412 00000000 00000000 35533411	21433552 00000000 00000000 11433553									
<p>Signature du praticien en tenant le devis</p> <p>Mise en place de l'assurance affranchissement</p>										

VOLET ADHERENT

NOM : KACHANI MUSTAPHA

DECLARATION N°

W17-133703



MUPRAS  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

W17-133703

DATE DE DEPOT

11.05.2019

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 2538

Nom & Prénom

Fonction

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

Adhérente

Conjoint

Enfant

Age .....

Date .....

Date 1ère visite .....

Colique néphétique droite + colopathie + HTA

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

C

200DH

PHARMACIE

Date 82-05-18

Montant de la facture

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date .....

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date .....

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

DR HASSANAIN ABDELAZIZ  
DIABETOLOGUE  
BB REDAGUEDERA N° 214  
HCC CASABLANCA N° 0202  
M : 0651770202

BB REDAGUEDERA  
HCC CASABLANCA  
M : 0651770202

BB REDAGUEDERA  
HCC CASABLANCA  
M : 0651770202

# Docteur Abdelaziz HASSANAIN

Ex : Médecin de la Gendarmerie Royale

- Diplômé en Diabétologie & en Echographie de l'université de Montpellier
- Diplômé en Maladies des os et des articulations de l'université de Bordeaux
- Diplômé en Gériatrie de l'université de Bordeaux
- Diplômé en Dermatologie interventionnelle de l'hôpital Militaire de Rabat

Tél. : 05.22.55.64.60

GSM : 06.61.77.02.02 22.05.2019

# الدكتور عبد العزيز حسنين

طبيب سابق بالدرك الملكي

- دبلوم أمراض السكري والفحص بالصدى من جامعة مونتوبولي بفرنسا
- دبلوم أمراض العظام والمفاصل من جامعة بوردو
- دبلوم في علاج الأشخاص المسنين من جامعة بوردو
- دبلوم في الجراحة الجلدية من المستشفى العسكري بالرباط

الهاتف : 05.22.55.64.60

المتنقل : 06.61.77.02.02

Casablanca, le .....

Mme KACHANI Khadija

الدار البيضاء، في


120,60  
1 CIFLOXINE 500  
1 C P APRES FTOUR



1 CP PARES SHOUR PENDANT 10 JOURS

87.40  
2 ALOXIA 15 MG


Prendre 1 comprimé le soir, après le repas, pendant 10 jours.



53.10  
3 RELAXOL  
1 CP APRES FTOUR  
1 CP APRES SHOUR



78.50  
4 CARBOXANE CP  
1 CP APRES FTOUR  
1 CP APRES SHOUR



64.20 x3  
5 ANCINE PLUS 50/12.5

Prendre 1 comprimé le matin, après le repas, pendant 3 mois.

صيدلية سكينة  
PHARMACE SKIBA SARL  
Dr. Pharmacie  
Tél. 05 22 32 33 Casablanca

Dr Abdelaziz HASSANAIN

DR HASSANAIN ABDELAZIZ

Medecin

Bd Reda Guedira N° 214 CD

Casablanca

G.S.M. : 06 61 77 02 02

532.60

RDV: 22.08.2019

شارع رضى الڭذيرة (شارع النيل سابقا) رقم 214 قرية الجماعة - الدار البيضاء

INPE : 091074518 - ICE : 001651921000091

# CIFLOXINE® 500 mg

Ciprofloxacin chlorhydrate

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets non souhaités et gênants.

La Ciprofloxacine est généralement bien tolérée, mais elle peut provoquer quelques effets non souhaités et gênants tels :

- Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, douleur abdominale ou diarrhée.
- Troubles du système nerveux : vertige, céphalées, fatigue, agitation et rarement une insomnie.
- Altération de la vision, de l'audition ou de l'odorat.
- Réactions d'hypersensibilités ou allergiques : fièvre, démangeaison ou éruptions cutanées.
- Très rarement, il peut apparaître des douleurs musculaires, articulaires, tendinite.

## SURDOSAGE

En cas de surdosage, informer immédiatement votre médecin traitant.

## CONSERVATION


Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur le conditionnement extérieur.

## AUTRES FORMES ET PRÉSENTATIONS

**CIFLOXINE® 250 mg**, boîte de 10 ou de 20 comprimés enrobés.

## LES MEDICAMENTS DOIVENT ETRE TENUS HORS DE PORTEE DES ENFANTS

## LISTE 1



Laboratoires IPHARMA S.A.  
Km 4, Ancienne Route de l'Aviation  
Tanger, Maroc



## COMPOSITION

Chaque comprimé contient :

Ciprofloxacine (D.C.I) chlorhydrate ..... 500 mg  
Excipients : ..... q.s.p

## FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS

Boîte de 10 ou de 20 comprimés enrobés.

## PROPRIETES

La Ciprofloxacine est un antibiotique de synthèse de la famille des fluoroquinolones. Elle agit sur un grand nombre de micro-organismes (activité bactéricide par inhibition de l'ADN-gyrase bactérienne). Elle ne présente pas de résistance croisée avec les pénicillines, les céphalosporines, les tétracyclines et les aminosides.

## INDICATIONS THERAPEUTIQUES

La ciprofloxacine est indiquée chez l'adulte dans le traitement :

- de l'urétrite gonococcique chez l'homme,
- des infections urinaires basses et hautes, compliquées ou non (y compris prostatites),
- des infections intestinales,
- de relais des infections ostéo-articulaires,
- des infections ORL suivantes :
  - sinusites chroniques,
  - poussées de surinfections des otites chroniques (quelle que soit leur nature), et des cavités d'évidement,
  - préparations pré-opératoires d'otites chroniques ostéitiques ou cholestéatomateuses,
  - traitement de relais des otites malignes externes,
- des suppurations bronchiques, notamment quand un bacille Gram - est suspecté, à l'exception des infections pneumococciques :

NOT0014-01





# Carboxan®



Charbon végétal activé - Wakamé - Rhubarbe - Menthe poivrée et Fenouil

## FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîte de 30.

## COMPOSITION (Par comprimé) :

Charbon végétal activé 200 mg, Wakamé undaria (pinnatifida poudre) 100 mg, extrait sec de Rhubarbe (Rheum palmatum) 200 mg, Huile essentielle de Fenouil (Foeniculum vulgare) 24 mg, Huile essentielle de Menthe poivrée (Mentha piperita) 24 mg, Fructo-Oligosaccharides F.O.S 100 mg.

## PROPRIÉTÉS :

Carboxane® à base d'actifs naturels, apaise les sensations de ballonnement, flatulences et spasmes intestinaux, facilite la digestion et régule le transit intestinal.

## UTILISATION :

Carboxane® est recommandé en cas de :

- Ballonnement et Flatulences.
- Constipation, paresse intestinale.
- Colopathie fonctionnelle.
- Digestion difficile.
- Spasmes, Coliques.

## CONSEILS D'UTILISATION :

A prendre de préférence après les repas :

- Ballonnement : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.
- Constipation : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Lot : 190086  
À consommer de  
préférence avant le : 02/2022

PPC : 79,50 DH

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation va
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.



Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l. - Lecco - Italie

Importé au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisation du Ministère de la santé N° DA20161310001DMP/20UCAMAv2

Autorisation sanitaire ONSSA N° ES.5.229.16

# ANCINE PLUS®

## Losartan / Hydrochlorothiazide

### FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITIONS :

Comprimés pelliculés à 100mg /25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan potassium (exprimé en losartan).....

100 mg

Hydrochlorothiazide.....

25mg

Excipient q.s.p.....

un comprimé

Comprimés pelliculés à 50mg /12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan potassium (exprimé en losartan).....

50 mg

Hydrochlorothiazide.....

12,5mg

Excipient q.s.p.....

un comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

### INDICATIONS :

- ANCINE PLUS est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle lorsqu'une monothérapie avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II est insuffisante.

- Traitement initial de l'hypertension artérielle sévère (pression artérielle diastolique en position assise > 110 mm Hg).

### CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.

- Au cours des 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

- Insuffisance rénale et hépatique sévère.

- Hypokaliémie.

- Hypercalcémie.

- Goutte.

- Anurie.

### MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé d'ANCINE PLUS (100mg/25mg).

Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée.

ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas.

La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée.

Le **Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans)**.

Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

### MESURES EN CAS DE TOXICITE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

#### MISSION EN GARDE :

Le rapport bénéfice/risque doit être considéré quand les problèmes médicaux suivants existent :

- Insuffisance hépatique (possibilité d'augmentation des concentrations plasmatiques en Losartan. Une dose faible de ANCINE PLUS est recommandée).

- En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques peuvent induire une encéphalopathie hépatique, dans ce cas l'administration des diurétiques doit être immédiatement interrompue.

- Sténose artérielle rénale bilatérale ou les patients ayant un seul rein (l'augmentation du risque d'existence d'insuffisance rénale).

- Les patients ayant une déplétion de la volemie ou de sodium (l'hypotension symptomatique peut arriver après le début du traitement par Losartan).

- Hypersensibilité : risque d'ango-cédème.

- Insuffisance cardiaque congestive : risque d'hypotension artérielle brutale et d'insuffisance rénale parfois aigüe.

- Enfants : l'utilisation du ANCINE PLUS n'est pas recommandée chez l'enfant.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-mélanome :

Les patients qui prennent de l'Hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte. Toutes les tumeurs suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexamинée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

- Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales.

- ANCINE PLUS réduit l'excitation du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques.

Certains médicaments dans certaines classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue d'une hyperkaliémie : la ciclosporine, les diurétiques épargneurs de potassium, le lait peu salé. Les sels de potassium, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les héparines, le tacrolimus et le triméthoprime. Un contrôle de la kaliémie est recommandé.

### EFFECTS INDESIRABLES :

- Les effets les plus fréquents : Céphalées, hypotension orthostatique dose - dépendante.

- Les effets les moins fréquents : douleurs du dos, diarrhée, fatigue, congestion nasale, étourdissement, infection respiratoire supérieure, hyperkaliémie habituellement modérée.

- Les effets les plus rares : toux sèche, insomnie, douleur des jambes, douleur ou crampes musculaires, problème des sinus, hypersensibilité (ango-cédème et réactions anaphylactiques).

- Risque de cancer de la peau non-mélanome.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.

L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

### Allaitemnt :

L'allaitement est déconseillé au cours du traitement.

### SURDOSSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydroélectrolytique (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

### CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'un changement de posologie.

### CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Liste I

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non contrôlée peut entraîner des effets indésirables.

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses effets indésirables.

- N'arrêtez pas de prendre ce médicament sans le conseil de votre médecin.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par Le Laboratoire Pha  
Z.I.I Tit Mellil - Casablan

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg  
30 comprimés pelliculés



LOT : 123  
PER : 04/22  
PPV : 64,20 DH

6 118000 141051

# ANCINE PLUS®

## Losartan / Hydrochlorothiazide

### FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITIONS :

Comprimés pelliculés à 100mg/25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.  
Losartan potassium (exprimé en losartan).....100 mg  
Hydrochlorothiazide.....25 mg  
Excipient q.s.p.

Comprimés pelliculés à 50mg/12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.  
Losartan potassium (exprimé en losartan).....50 mg  
Hydrochlorothiazide.....12,5 mg  
Excipient q.s.p.

Excipient à effet notoire : Lactose.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

**INDICATIONS :**  
- ANCINE PLUS est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle lorsqu'une monothérapie avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II est insuffisante.  
- Traitement initial de l'hypertension artérielle sévère (pression artérielle diastolique en position assise  $\geq 110$  mm Hg).

### CONTRE - INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.  
- Au cours des 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.  
- Insuffisance rénale et hépatique sévère.  
- Hypokaliémie.  
- Hypercalcémie.  
- Goutte.

- Allaitement.

### MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé de ANCINE PLUS (100mg/25mg). Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée.

ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas.

La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée.

Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans).

Pour que ANCINE PLUS, comprimés pelliculés soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

### MISSIONS EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le rapport bénéfice/risque doit être considéré quand les problèmes médicaux suivants existent :  
- Insuffisance hépatique (possibilité d'augmentation des concentrations plasmatiques en Losartan. Une dose faible de ANCINE PLUS est recommandée).  
- En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques peuvent induire une encéphalopathie hépatique, dans ce cas l'administration des diurétiques doit être immédiatement interrompue.  
- Sténose artérielle rénale bilatérale ou les patients ayant un seul rein (l'augmentation du risque d'insuffisance rénale).  
- Les patients ayant une déplétion de la vésicule ou de sodium (l'hypotension symptomatique peut arriver après le début du traitement par Losartan).  
- Hypersensibilité : risque d'angio-oedème.  
- Insuffisance cardiaque congestive : risque d'hypotension artérielle brutale et d'insuffisance rénale parfois aigüe.  
- Enfants : l'utilisation du ANCINE PLUS n'est pas recommandée chez l'enfant.  
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

### Risque pour la peau non-mélanome :

Les patients présentant une hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou modification de lésion existante et à signaler toute lésion cutanée suspecte. Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réévaluée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II après une sécrétion de rénine compensatoire.

Chez les patients sous hémodialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs de ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines naturelles.

- ANCINE PLUS réduit l'excrétion de lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques.

- Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue d'une hyperkaliémie : la ciclosporine, les diurétiques épargneurs de potassium, le lait peu salé. Les sels de potassium, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs de l'angiotensine II, les anti-inflammatoire non stéroïdiens, les héparines, le tacrolimus et le triméthoprime. Un contrôle de la kaliémie est recommandé.

### EFFETS INDESIRABLES :

- Les effets les plus fréquents : Céphalées, hypotension orthostatique dose - dépendante.  
- Les effets les moins fréquents : douleurs du dos, diarrhée, fatigue, congestion nasale, étourdissement, infection respiratoire supérieure, hyperkaliémie habituellement modérée.

- Les effets les plus rares : toux sèche, insomnie, douleur des jambes, douleur ou crampes musculaires, problème des sinus, hypersensibilité (ango-tension et réactions anaphylactiques).

- Risque de cancer de peau non-mélanome.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.

L'administration d'ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ème et le 3ème trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

### Allaitemnt :

L'allaitement est déconseillé au cours du traitement.

### SURDOSSAGE :

Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'Hydrochlorothiazide ont été liés à des troubles hydroélectrolytique (hypokaliémie, acidose, etc.).

**CONDUITE ET UTILISATION DE MATERIELS :**  
Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors.

### CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Liste I

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non confiée.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a donné.
- Vos médecins et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.
- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par Le Laboratoire Phai  
Z.I.I, Tit Mellil - Casablanca

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg  
30 comprimés pelliculés



LOT : 123  
PER : 04/22  
PPV : 64,20 DH

6 11 800 14 1051

# ANCINE PLUS®

## Losartan / Hydrochlorothiazide

### FORME, PRÉSENTATIONS ET COMPOSITIONS :

Comprimés pelliculés à 100mg /25mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan potassium (exprimé en losartan).....

100 mg

Hydrochlorothiazide.....

.25mg

Excipient g.s.p.....

un comprimé

Comprimés pelliculés à 50mg /12,5mg, boîtes de 15 et de 30 sous plaquettes thermoformées.

Losartan potassium (exprimé en losartan).....

50 mg

Hydrochlorothiazide.....

.12,5mg

Excipient g.s.p.....

un comprimé

Excipient à effet notoire : Lactose.

Antihypertenseur, association d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II et d'un diurétique.

### INDICATIONS :

- ANCINE PLUS est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle lorsqu'une monothérapie avec un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II est insuffisante.

- Traitement initial de l'hypertension artérielle sévère (pression artérielle diastolique en position assise ≥ 110 mm Hg).

### CONTRE-INDICATIONS :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du médicament.

- Au cours des 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

- Insuffisance rénale et hépatique sévère.

- Hypokaliémie.

- Hypercalcémie.

- Goutte.

- Anurie.

### MODE, VOIE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE :

Voie orale.

- Dose initiale : 50mg/12,5mg une fois par jour chez certains patients ne répondant pas de façon adéquate, la posologie peut être augmentée à 2 comprimés de ANCINE PLUS (50mg/12,5mg) en une ou 2 prises quotidiennes ou à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg).

Une posologie supérieure à 1 comprimé / jour de ANCINE PLUS (100mg/25mg) n'est pas recommandée.

ANCINE PLUS peut être pris pendant ou à distance des repas.

La posologie initiale (losartan 50mg/Hydrochlorothiazide 12,5mg) chez les patients âgés de 65 ans ou plus est inchangée.

Le Losartan/Hydrochlorothiazide ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent (en dessous de 18 ans).

Pour que ANCINE PLUS soit pleinement efficace, suivez attentivement l'ordonnance de votre médecin et respectez la dose prescrite sans l'augmenter ni la diminuer.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

#### MISES EN GARDE :

Le rapport bénéfice/risque doit être considéré quand les problèmes médicaux suivants existent :

- Insuffisance hépatique (possibilité d'augmentation des concentrations plasmatiques dans Losartan. Une dose faible de ANCINE PLUS est recommandée). En cas d'atteinte hépatique, les diurétiques thiazidiques peuvent induire une encéphalopathie hépatique, dans ce cas l'administration des diurétiques doit être immédiatement interrompue.

- Sténose artérielle rénale bilatérale ou les patients ayant un seul rein (l'augmentation du risque d'existence d'insuffisance rénale).

- Les patients ayant une déplétion de la volemie ou de sodium (l'hypotension symptomatique peut arriver après le début du traitement par Losartan).

- Hypersensibilité : risque d'angio-oedème.

- Insuffisance cardiaque congestive : risque d'hypotension artérielle brutale et d'insuffisance rénale parfois aigüe.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

Risque du cancer de la peau non-melanome.

Les patients qui prennent de l'Hydrochlorothiazide seul ou en association avec d'autres médicaments doivent être informés de ce risque et de la nécessité de vérifier régulièrement l'état de leur peau afin de détecter toute nouvelle lésion ou localisation de lésion existante et de signaler toute lésion cutanée suspecte. Les lésions cutanées suspectes doivent être examinées. Le recours à la biopsie peut être nécessaire pour le diagnostic histologique.

Afin de réduire le risque de cancer de la peau, il sera conseillé aux patients de limiter l'exposition au soleil et aux rayons UV et d'avoir une protection adéquate en cas d'exposition solaire.

L'utilisation d'Hydrochlorothiazide doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients présentant un antécédent de cancer de la peau.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Chez les patients subissant une chirurgie majeure, ou durant l'anesthésie avec des agents causant l'hypotension, losartan bloque l'action d'angiotensine II et empêche la sécrétion de rénine compensatoire.

Chez les patients sous dialyse, une dose faible de ANCINE PLUS doit être considérée.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

D'une façon générale, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout médicament pris pendant le traitement par ANCINE PLUS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent être un antagoniste des effets antihypertenseurs d'ANCINE PLUS en causant la rétention hydro sodique et / ou l'inhibition de la synthèse des prostaglandines rénales.

- ANCINE PLUS réduit l'excrétion du lithium, entraînant une augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques.

- Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue d'une hyperkaliémie : la ciclosporine, les diurétiques épargneurs de potassium, le lait peu sucré. Les sels de potassium , les inhibiteurs de l'enzyme de conversion , les inhibiteurs de l'angiotensine II , les anti-inflammatoires non stéroïdiens , les héparines, le tacrolimus et le triméthoprime. Un contrôle de la kaliémie est recommandé.

### EFFETS INDÉSIRABLES :

- Les effets les plus fréquents : Céphalées, hypertension orthostatique dose - dépendante.

- Les effets les moins fréquents : douleurs du dos, diarrhée, fatigue, congestion nasale, étourdissement, infection respiratoire supérieure, hyperkaliémie, hirsutisme, cataracte.

- Les effets les plus rares : toux sèche, insomnie, douleur des jambes, douleur ou crampes musculaires, problème des sinus, hypersensibilité (angio-oedème et réactions anaphylactiques).

- Risque de cancer de la peau non-mélanome.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

#### Grossesse:

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ANCINE PLUS pendant le 1er trimestre de la grossesse.

L'administration de ANCINE PLUS est contre indiquée pendant le 2ième et le 3ième trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consulter votre médecin car lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

#### Allaitement :

L'allaitement est déconseillé au cours du traitement.

**SURDOSAGE :** Les symptômes possibles de surdosage par ANCINE PLUS incluent la bradycardie due à la stimulation vagale, hypotension avec tachycardie. Le traitement doit être symptomatique et de soutien. Les symptômes possibles de surdosage par l'hydrochlorothiazide ont été liés à des désordres hydroélectrolytique (hypokaliémie, hyponatrémie). Ni le Losartan ni son métabolite actif ne peuvent être éliminés par hémodialyse.

### CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Les conducteurs de véhicules ou utilisateurs de machines doivent être avertis que les traitements antihypertenseurs peuvent parfois provoquer des étourdissements ou une somnolence, en particulier en début de traitement ou lors d'un changement de posologie.

### CONDITIONS PARTICULIERS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

Liste I

### CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non doit être prise au hasard.

- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous prescrit.

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

- Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants.



Fabriqué par Le Laboratoire Pha  
Z.I.I, Tit Mellil - Casablanca

ANCINE Plus® 50mg/12,5mg  
30 comprimés pelliculés



LOT : 123  
PER : 04/22  
PPV : 64-20 DH

6 118000 141051