

Conditions Générales

POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
Visite de jour au domicile du malade par le médecin
Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
Acte de pratique médicale courant et de petite chirurgie
Actes de chirurgie et de spécialistes

SF	= Actes pratiqués par la sage Femme et relevant de sa compétence
SFI	= Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
AMM	= Actes pratiqués par le masseur ou le kinesithérapeute
AMI	= Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
AP	= Actes pratiqués par un orthophoniste
AMY	= Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
R-Z	= Electro - Radiologie
B	= Analyses

POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la Mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord ou de présenter ses observations.

Ce bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous enveloppe confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

HOSPITALISATION EN CLINIQUE

HOSPITALISATION EN HOPITAL

HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU REVENTORIUM

SEJOUR EN MAISON DE REPOS

TES ACTES EFFECTUES EN SERIE, il s'agit

d'actes répétés en plusieurs séances ou actes

obaux comportant un ou plusieurs échelons dans le temps.

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

- L'ORTHOPEDIE

- LA REEDUCATION

- LES ACCOUCHEMENTS

- LES CURES THERMALES

- LA CIRCONCISION

- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

EN CAS D'URGENCE

Les actes d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit se réenviser dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord.

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade.



M U P R A S
Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

DATE DE DEPOT

AEROPORT CASA ANFA
CASABLANCA
TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 / 2649 / 2857 / 2883
FAX : 05 22 91 26 52
TELEX : 3998 MUT
E-mail : mupras@RoyalAirMaroc.co.ma

FEUILLE DE SOINS 1595901

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom : MOBARAK MOHAMED YACINE

Matricule : 11761 Fonction : Analyste Ref. Poste : 2876

Adresse :

Tél. : 0661130377 Signature Adhérent :

A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : MOBARAK MOHAMED Age : 30

Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent Conjoint Enfant

Date de la première visite du médecin :

Nature de la maladie :

S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances : 12 JUIN 2010

A : , le : / / Durée d'utilisation 3 mois

Signature et cachet du médecin

DR MAMOUNI Abdellah MD.
Praticien en Allergologie
Intolérance alimentaire & Rhinitis
Télé 0522 91 26 42

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25.06			250 m	ZAHOUANI Abdellatif Médecin allergologie Dr. Hélia-Angèle Ratto Assurance maladie & Rottos Cas clinique 44.20
26.06				

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Al Mohit 1 Fadhal Saada Dar Bouazza - Nouaceur Tel : 05 22 96 14 45	25.6.10	344,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES


AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et Signature du praticien	Dates des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature de

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement car ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANT DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHÉSES DENTAIRES	DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	H 21433552 00000000 G 00000000 B 11433553		CŒFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANT DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

CABINET DE PEDIATRIE ET D'ALLERGOLOGIE

عيادة طب الأطفال و الحساسية

Docteur Abdelkhalak ZAHOUANI

Spécialiste en Pédiatrie et Allergologie

Asthme - Allergies dermatologiques et Alimentaires

Lauréat du C.H.U. Avérroès

Ancien Chef de Service

Al Muhit i Fauq Saada

Dar Bouazza - Nouaceur

Tél : 05 22 96 14 45

PHARMACIE BASSATINE RAHMA

الدكتور عبد الخالق زهوانى

أخصاصي في طب الأطفال والرضع

الضيق وأمراض الحساسية الجلدية والغذائية

خريج المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد

رئيس مصلحة سابقاً

25 JUIN 2019

140,-

- DEBO le mélange



56,80

- Flacon gel pur




133,-

- Rectopom pour la diarrhoe



344,20



BACTOSPRAY
LOT:1811072
EXP: 11/2021
PPC:138.00 DH

Laboratoire ADDAX
France

برمان و طريق أزمور
عيادة Communal-angle Bd Sidi Abderrahmane & Route d'Azemour

البيضاء - الهاتف : 05 22 91 43 33 / 06 63 48 11 21

E-mail : abd.zahouani@gmail.com

26.2019

1043-

MEBO Pommade

Traitement des plaies infectées et des brûlures

Introduction

Le traitement des brûlures traumatiques ou infectées, la technique médicale? Enduire une couche d'un autre thérapie est de soigner les restes de la brûlure pour augmenter la cicatrisation; ju la migration des kératines avec les facteurs de MEBO (Moist Ex) cien Rés. spéciallement dév...
Composition

NOVOPHARMA
UT.AV P.P.V
140,00

roduit dans Le concept biante dans el, pour que l'interaction de pour le la pommade

MEBO est originaire de plantes naturelles comestibles. Elle est composée de 0.25% de β -Sitostérol comme étant le principe actif majeur. La base de la pommade est constituée d'huile de Sésame et de la Cire d'abeille.

Mode d'action

MEBO agit en:

- Fournissant un optimum d'humidité physiologique nécessaire à la régénération et à la réparation.
- Provoyant un effet anti-inflammatoire et réduisant cependant l'œdème et l'érythème.
- Créeant une atmosphère défavorable à la colonisation bactérienne et longue.
- Isolant et protégeant les extrémités nerveuses exposées et lésées produisant cependant un effet analgésique.
- Fournissant une nutrition locale pour les cellules de fond lésées.
- Liquéfiant les tissus nécrotiques.
- Isolant et protégeant les plaies du milieu ambiant mais en même temps en conservant un drainage ainsi qu'un échange gazeux efficace.
- Réduisant la perte de fluide de la peau endommagée (brûlures).
- Absorbant la chaleur résiduelle dans les brûlures aiguës.
- Activant l'épithérialisation dans un ordre exceptionnellement acceptable.

Indications

MEBO a été utilisé avec succès dans le traitement des brûlures suivantes:

- Brûlures de premier degré, où le soulagement de la douleur et la cicatrisation sont remarquables, ex. coup de soleil.
- Les brûlures de second degré superficielles et profondes. S'il est appliqué proprement, une greffe de peau n'est pas nécessaire et la régénération aura lieu à partir des glandes et des follicules pileux dermiques et des tissus subcutanés.
- Les brûlures de troisième degré, pour isoler les plaies, réduire la douleur et activer le débridement non chirurgical des tissus nécrotiques dans le but de préparer les plaies à la greffe.
- Le site donneur, pour réduire la douleur, contrôler l'infection et activer la cicatrisation (une moyenne de 7 jours a été rapportée).
- Les plaies chroniques y compris les ulcères dues à l'alimentation, le pied du diabétique ainsi que les ulcères de jambe.
- À la suite d'une séance de laser, d'un peeling chimique ou d'une abrasion dermique.
- Les plaies chirurgicales y compris les plaies obstétriques.
- Les plaies de circoncision.
- Les plaies des membranes muqueuses comme les ulcères buccaux.
- Les crevasses des talons et des bouts de seins.

Mode d'administration

Brûlures

- Brûlures de premier degré (brûlures superficielles) MEBO doit être appliquée aussitôt que possible. Une couche fine de pommade (à peu près 1mm d'épaisseur) doit couvrir la région

brûlée. Il est préférable de laisser la plaie exposée, mais si nécessaire, un léger pansement occlusif peut être utilisé.

Une nouvelle application est à renouveler 3 à 4 fois par jour si la plaie est exposée et 2 fois par jour si elle est couverte.

Brûlures de second degré

Première phase- Période de liquéfaction

La région brûlée doit être couverte par une couche fine de pommade MEBO qui doit être renouvelée 3 à 4 fois par jour. Avant toute nouvelle application, bien sécher les tissus nécrotiques liquéfiés ainsi que tout résidu de pommade. Il est préférable de laisser la plaie exposée, mais si nécessaire, un léger pansement ainsi qu'une couche plus épaisse de pommade (à peu près 3mm) doivent être appliqués et renouvelés 2 fois par jour.

Deuxième phase- période de réparation

MEBO doit être appliquée selon le même processus expliqué ci-dessus, mais moins fréquemment (2-3 fois par jour).

Troisième phase- période de réhabilitation

Dans ce cas, MEBO doit être appliquée une fois par jour selon le même processus.

Brûlures de troisième degré

MEBO doit être appliquée selon le même processus ci-dessus dans le but de liquéfier les tissus nécrotiques. Une couche fine doit couvrir la région brûlée et renouvelée 3 à 4 fois par jour.

Le site donneur

Une couche fine de MEBO doit couvrir le site donneur et renouvelée 3 à 4 fois par jour si celui-là est exposé, et 2 fois s'il est couvert.

Les ulcères des pieds

Une gaze stérile imprégnée de la pommade MEBO doit boucher la cavité ulcéruse, et doit être renouvelée 2 fois par jour.

Les plaies obstétricales et chirurgicales

Les plaies doivent être couvertes d'une couche relativement épaisse (à peu près 3mm) de MEBO sous un pansement stérile et ceci renouvelé 2 fois par jour.

Les crevasses des bouts de seins

Une couche fine de MEBO doit être appliquée sur le bout du sein sous un léger pansement, et renouvelée 3 à 4 fois par jour. Puisque MEBO ne présente aucun danger pour le nouveau-né il peut être utilisé pendant l'allaitement.

Toxicité et effets secondaires

MEBO est constitué principalement de plantes naturelles comestibles pures. Jusqu'à présent des effets secondaires à ce produit n'ont pas été rapportés, à l'exception de rares réactions allergiques dues à l'huile de sésame.

Mises en garde

Pendant la conservation l'apparence physique de la pommade MEBO peut changer, spécialement durant les saisons chaudes mais sans que ceci puisse affecter l'efficacité du produit.

Présentation

La pommade MEBO se présente sous forme de tubes pliants de 15, 30 ou 75 grammes.

* Conserver au-dessous de 25°C.

Distribué par les laboratoires Novopharma



Sous licence des laboratoires Julphar
Industries Pharmaceutiques du Golfe
Ras Al Khaimah, E.A.U

FLAMMAZINE®

Crème

Sulfadiazine argentique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes.

Si vous...
• Garde...
• Si vo...
• Si le...
• Si v...
effets

Dans ce...
1. QU'...
QUI...
2. QUE...
AVAN...
3. COM...
4. QUE...
5. COM...
6. INFO...

1. QU'E...
ET DA...
Classe...
local.
• Trai...
tées e...
• Trai...
primit...
rinfec...
Les ag...

Crème
FLAMMAZINE®



LOT / BATCH: 15244
FAB / MFR: 01-2019
EXP: 12-2021

PPV: 66.80 DH

100g

route, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Soin de la relire. Pour de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Consultez un médecin. Si mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets indésirables indiqués, informez votre médecin ou votre pharmacien.

DANS
AUTRE
QUELLES ?

génants :
• Eczéma de contact,
• Photosensibilisation (cf. Précautions d'emploi),
• Un exsudat stérile peut se produire à la surface de la plaie. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER FLAMMAZINE®, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient FLAMMAZINE®, crème ?

La substance active est :

Sulfadiazine argentique.....1 g
Pour 100 g

Les autres composants sont : polysorbate 60, polysorbate 80, propylèneglycol, alcool cétylique, paraffine liquide, monostéarate de glycérol 40-55, eau purifiée.

Qu'est-ce que FLAMMAZINE®, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème ; tube de 50 g.

Titulaire/Exploitant :

SINCLAIR PHARMA FRANCE
35, rue d'Artois
75008 Paris – France

Fabricant :

RECIPHARM PARETS, S.L.
C/ Ramón y Cajal, 2
ES 08150 Parets del Vallès (Barcelone) – Espagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21 janvier 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

CONSEILS/ÉDUCATION SANITAIRE :

Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs. La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1. N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
2. Respectez strictement votre ordonnance.
3. Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
4. Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
5. Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

Faites attention avec FLAMMAZINE®, crème dans les cas suivants :

- Sensibilisation connue aux sulfamides, générale ou locale (eczéma de contact),
- Femme en fin de grossesse ou qui allaite (cf Grossesse et allaitement),
- Nouveau-né et prématuré.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec FLAMMAZINE®, crème dans les cas suivants :

- Chez les sujets souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique, éviter l'application sur des plaies ouvertes, surtout les ulcères.
- Il est recommandé d'éviter d'exposer les parties du corps traitées par FLAMMAZINE® à une lumière vive. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Prévenir votre médecin ou votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

3. COMMENT UTILISER FLAMMAZINE®, crème ?

Posologie et mode d'administration

Voie cutanée.

La crème peut être soit préalablement appliquée sur une gaze stérile, soit être étalée directement sur la plaie en couche de 2 à 3 mm d'épaisseur environ. Avant de renouveler les applications (en principe toutes les 24 heures), il convient de nettoyer la plaie par lavage à l'eau ou avec une solution saline isotonique.

N.B. : les taches sur le linge ou la literie disparaissent facilement au lavage.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins