

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Pathologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Déclaration de Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie : N° P19-0017927

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 1815 Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom :

Derssi Khaled Date de naissance :

Adresse :


Derb Kabil Rue 13 N° 114 Casablanca

Tél. : 0675128486

Total des frais engagés : 101.92 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

16/07/2019 Nom et prénom du malade : DERSSI Khaled Age :

Lien de parenté :


Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Hypertension et Bradycardie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/11/1993	3 + US (ECG)	300 DT	SOULAMIN SOCIETE DE CARDIOLOGIE 306, Rue Moustapha El Mami 1001-1002 Casablanca	16/11/1993 Signature du Médecin

EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	16/07/19	3786,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ORL.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
-----	-----
00000000	00000000
35533411	11433553

Création, remont, adjonction)

The diagram shows a dental arch with upper teeth. The teeth are labeled with letters A through G. Labels include:
 - A: Lingual side of the central incisors.
 - B: Buccal side of the central incisors.
 - C: Lingual side of the lateral incisor.
 - D: Buccal side of the lateral incisor.
 - E: Lingual side of the canine.
 - F: Buccal side of the canine.
 - G: Lingual side of the first molar.

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU
DEVIS

Docteur Saâd SOULAMI

Professeur de Cardiologie

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux

Diplômé de la Faculté de Médecine de Paris

Echo Doppler Couleur - Holter



الدكتور سعد السلمي

أستاذ سابق بكلية الطب بالدار البيضاء

إخلاصي في أمراض القلب والأوعية الدموية

خريج كلية الطب بباريس

فحص القلب بالصدى والدوبلير بالألوان

11 6 JUIL 2019

Patient : H. DELSSY

Casablanca, le

Neuf po 9% ns

CADRE 6, 28 SV

44,00x28.

1232,00 1 - 1 - 1



13150x9. TAPEZ SV

1183,00 1 - 1 - 1 cp ser



97600x9 redép à

898,40. 1 - 1 - 1 ser



3460x9 l'atelier SV

242,20 1/25 a Jan



30,70x7.

269,90 Kardep 26

3786,00 saletant



زنقة مصطفى المعاني (قرب زنقة أڭادير) - الدار البيضاء 356

356, Rue Mostafa El Maâni (coté Rue d'Agadir) - 1^{er} étage - Casablanca - E-mail : cabinetsoulami@gmail.com

Tél.: 05 22 22 18 84 / 06 62 88 90 91 - Tél./Fax: 05 22 26 13 36 - Urgence : 06 65 14 69 96

CNSS : 2700608 - IF : 41802254 - ICE : 001755076000067 - IPN : 091130922

valable 3 mois

mCe 4815

Le 16/07/2019

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE

(À adresser au médecin conseil de la MUPRAS sous pli confidentiel)

Je soussigné :

Certifie que Mlle, Mme, M. : BERHASY ICH HAFID

Présente

me HFA Nadeem o DNI: + Angle Stark

Nécessitant un traitement d'une durée de : tre 1081 mois

Dont ci-joint ordonnance : CARDIX 6.25 mg 80 - ledip 2.5 mg 100 - kast 160

(à défaut noter le traitement prescrit) précision apres 13/06/96

site : www.mupras.com // mail : reclamation@mupras.com // phone : 0522-22-78-14 ou 0522-22-78-15 / fax : 0522-22-78-18
Adresse : 6ème étage, Angle Rue Allal BENABDELLAH et Rue Fakir Mohamed (ex Rue Heintz) - Casablanca

DERSSY, KHALID
ID:

0yr
Unknown

Comment

61, 72, 18, 26, 18, 36-
356, Rus, Moselle, ECG, CAS,
Processeur de Cardiologie
DR BORG SOULAGAT

16-Jul-2019 09:24:26

Vent rate: 80 BPM
PR int: 162 ms
QRS dur: 147 ms
QT/QTc: 390 / 426 ms
P-R-T axes: 52 21 119

RYTHME SINUSAL
BLOC DE BRANCHE GAUCHE
ECG ANORMAL
ATTENTION: LA QUALITE DES DONNEES PEUT INFLUENCER L'INTERPRETATION
Revu par _____



Site Zero

Site # 0 Cart # 0 ELI Link 4.11.6.0 Sequence # 33359 25mm/s 10mm/mV 0.05-300 Hz

كارديكس®

كارفيديول

الدوكسيك:

يحتوي كل قرص على:

كاربيكس 6.25 مغ : كارفيديول

كاربيكس 25 مغ : كارفيديول

المسوّات : أكتون، سيليلوز بلوري بذريّن دقيق، هيدرو كسيبورو-بليتيبل سليكون، نشا الذرة، أوكسيد الحديد الأصفر، ثاني أوكسيد سيلليس غرواني، طالك، ستيرات المغنيزيوم

مع 6.25.....

مع 25.....

أقراص بـ 6.25 ملجم، بلبة 14 و 28 قرصاً

أقراص بـ 25 ملجم، بلبة 14 و 28 قرصاً

متوافق الاستعمال

كاربيكس 25 و 6.25

28 Co

LOT: 128
PER: FEB 2022
PPV: 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 Com

LOT: 127
PER: JAN 2022
PPV: 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 C

LOT: 128
PER: FEB 2022
PPV: 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 Comp

LOT: 123
PER: OCT 2021
PPV: 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 Co

CARDIX®

Carvédilol

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 Com

LOT : 127
PER : JAN 2022
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 Com

LOT : 128
PER : FEV 2022
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 Com

LOT : 125
PER : OCT 2021
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

28 C

LOT : 128
PER : FEV 2022
PPV : 44 DH 00

LOT : 123
PER : OCT 2021
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

..... 6,25 mg
..... 25 mg
stalline, hydroxypropylcellulose, amidon de maïs, oxyde de fer jaune, silice colloïdale dioxyde
ET PRÉSENTATIONS :

14 et de 28

1 et 28

ES :

ardiaque chronique stable, légère, modérée et sévère (fraction d'éjection ≤ 35%) en association à l'enzyme de conversion, diurétique et le plus souvent digitalique.

essentielle (dont l'origine organique n'est pas établie) et la cardiopathie chronique stable

ment observés sont les suivants :
tient.

atique, hypotension et, rarement, syncope ;
stural, des membres inférieurs, généralisé, hypervolémie, rétention hydrique) ;
auriculoventriculaire ;
l'insuffisance cardiaque pendant la période d'augmentation de dose.
et vomissements.

nécessitant l'arrêt du traitement.
e poids.

ibilité d'insuffisance rénale aiguë et anomalies de la fonction rénale chez les patients sur le plan rénal.

ne dépend pas de la dose, à l'exception des étourdissements, des anomalies de la vision et de la dépression.

NE TOUT EFFET INDESIRABLE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN

ardiaque sévère décompensée ;

ement hépatique ;
à l'un des excipients ;

stique :

ndiques obstructives ;

degrés ;

min) ;

blok sino-auriculaire) ;

hypotension artérielle (< 85 mm Hg) ;

circulatoires périphériques ;

ou de cimétidine ;

ce, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de Liddle, d'insuffisance rénale aiguë et anomalies de la fonction rénale chez les patients sur le plan rénal.

antagonistes calciques de type vérapamil, diltiazem, bépridil ; antiarythmiques par voie orale.

INDICATIONS D'EMPLOI :

de l'insuffisance cardiaque congestive chronique symptomatique à posologie optimale et efficace, et de l'hypertension artérielle essentielle. Il peut être prescrit pendant au moins 4 semaines avant la première prise de carvédilol pour les patients en insuffisance cardiaque chronique stable, et il doit prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol, comme tout traitement cardiaque, nécessite une adaptation progressive.

une première dose, suivie d'une posologie initiale faible puis progressivement croissante jusqu'à l'efficacité thérapeutique. Il faut prendre en compte le fait que le traitement, sauf en cas de nécessité selon l'avis de votre médecin traitant

de la glycémie est recommandée chez les diabétiques au moment de l'initiation du traitement.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

Il faut prendre en compte le fait que le traitement par carvédilol peut entraîner une diminution de la pression artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque.

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

LOT : 125
PER : DEC 2021
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

LOT : 120
PER : SEP 2021
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

LOT : 128
PER : FEV 2022
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

LOT : 118
PER : JUN 2021
PPV : 44 DH 00

CARDIX® 6,25mg
28 comprimés



6 118000 050568

6 118000 050568

REDLIP 20 et 40 mg, comprimé pelliculé en boîte de 30.

Simvastatine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, si.

Redlip[®] 20

30 Comprimés pelliculés



6 118000 420286

Composition qualitative en excipients :

crocristalline, butylhydroxyanisole, acide ascorbique, acide citrique
920 jaune, Opadry Y-1-7000 blanc (REDLIP 20 mg) et Opadry

97,60

sux du cholestérol total, du mauvais cholestérol (cholestérol LDL), et
sang. De plus, REDLIP augmente les niveaux du bon cholestérol
cavements appelés statines.

ases trouvées dans le système sanguin. Votre cholestérol total est

composée principalement de cholestérol LDL et de cholestérol HDL.

Redlip[®] 20

30 Comprimés pelliculés



6 118000 420286

• une maladie héréditaire (hypercholestérolémie familiale homozygote) qui augmente le taux de cholestérol dans le sang.

uffisance coronarienne (parce que vous avez un diabète, avec un
vasculaire d'origine athéroscléreuse). REDLIP peut prolonger votre
indemnité de la quantité de votre cholestérol sanguin.

iat dû à un taux élevé de cholestérol. Votre médecin peut mesurer
z votre médecin régulièrement, vérifiez votre cholestérol, et discutez

tre état de santé, de votre traitement en cours tout en tenant compte

vous l'a indiqué. Vérifiez avec votre médecin ou votre pharmacien si
vous devez suivre un régime faisant baisser le cholestérol pendant le traitement par REDLIP.

Dosage :
a REDLIP 20 mg ou 40 mg, par voie orale, par jour.

dans quelques cas 40 mg par jour. Votre médecin pourra ajuster la posologie après
se maximum de 80 mg/jour. Ne prenez pas plus de 80 mg par jour.
ible dosage, surtout si vous prenez certains des médicaments listés ci-dessous, ou

handes aux patients adultes à très haut taux de cholestérol et à fort risque de
t le taux de cholestérol souhaité à de faibles doses.

se usuelle recommandée pour débuter le traitement est de 10 mg par jour à prendre
commandée est de 40 mg par jour.
ent :

s pouvez le prendre avec ou sans aliments. Continuez à prendre REDLIP, à moins
que votre médecin ne vous demande

medicamenteux qui fait baisser le cholestérol contenant un chélateur de
ures avant ou 4 heures après avoir pris le chélateur de l'acide biliaire.

ne ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,

s d'un des principes actifs suivants :
zou ou du voriconazole (utilisés dans le traitement de certaines
des inhibiteurs de protéase du VIH tels qu'indinavir, nelfinavir, ritonavir et saquinavir (inhibiteurs de protéase du VIH
par le VIH).

és dans le traitement des infections induites par le virus de l'hépatite C,
lement de la dépression),
le cholestérol),
patients transplantés),

lise, utilisée pour traiter l'endométriose, lorsque la muqueuse utérine se développe à
s 7 derniers jours, ou si on vous a administré un médicament appelé acide fusidique
unes),
es pas certain que votre médicament soit listé ci-dessus.

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,
doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),
- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

erroué accompagné d'une faiblesse des membres et des muscles du cou,

- douleur ou inflammation des articulations (rhumatisme inflammatoire),

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),

- canaux, éruptions cutanées et gonflement (dermatomyosite), urticaire, sensibilité de la peau au soleil,

comme tous les médicaments, REDLIP[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Le terme effets indésirables n'est pas utilisé pour décrire les effets indésirables :
e les effets indésirables ont été rapportés :

données disponibles).

a médicament et consultez votre médecin immédiatement ou
proche.

nsulaire ou crampes musculaires. Dans de rares cas, ces effets
uant des problèmes rénaux ; et de très rares décès sont survenus,

pouvant provoquer des difficultés respiratoires,
épaules et les hanches,

doux et les muscles du cou,

- inflammation des vaisseaux sanguins (vasculite),



KARDEGIC® 160mg

KARDEGIC 160 MG
SACHETS B20

P.P.V : 35DHZ0



ARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DHZ



KARDEGIC 160MG
SACHETS B30

P.P.V : 35DH70



KARDEGIC 160MG
SACHETS 30

P.V : 35 DH 70



l'aspirine est prescrite à fortes doses ($>3\text{g/j}$).
ai

SANOFI

ACTIVE
quantité
160 mg).

LOT : 8MA070
PER.: 02 2020

LOT : 8MA0668
PER.: 01 2020

K
S
P
J

d'utilisations extrêmement limitées, et qui justifient une surveillance spécialisée, tout médicament à base d'aspirine est CONTRE-INDIQUE à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. Grossesse et Allaitement).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS être utilisé sauf avis contraire de votre médecin, en cas de : - goutte, - règles ou saignements gynécologiques anormaux, - traitement concomitant par les anticoagulants oraux (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à faibles doses) ou par l'héparine, les uricosuriques, ou d'autres anti-inflammatoires (notamment lorsque l'aspirine est prescrite à des doses > 3g/j) (d). **Interactions médicamenteuses et autres interactions.**

illé pendant le traitement (cf.

.01

er à votre médecin certains problèmes de santé : la maladie des reins, l'asthme, l'estomac ou du duodénum, ou la hypertension artérielle, le diabète.

risques hémorragiques et ce d^es les
me lorsque la prise date de plusi^{eurs}
decin traitant, le chirurgien,
ment votre dentiste au cas où un geste
ur, est envisagé.

enant pas de sodium (sel), il peut être
ime désodé ou hyposodé.

DICAMENTEUSES ET AUTRES

TUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUS EURS
 SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TO JT
 EN COURS A VOTRE MEDECIN OU AVANT TRE
 ment si vous prenez des anticoagulants Is
 lorsque l'aspirine est prescrite à faibles ou
 par l'héparine, des uricosuriques e est
 atoires (notamment lorsque l'aspirin
 >3g/j).

Lasilix® 40 mg

Lasilix® 20 mg/2 ml

SANOFI

Lasilix 40mg
20 Cp séc
P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

de cette notice avant de prendre ce médicament.
importantes sur votre traitement.
si vous avez un doute, demandez plus d'informations à
en.
sonnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
mes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
z avoir besoin de la relire à nouveau.

Lasilix 40mg
20 Cp séc
P.P.V : 34DH60



Lasilix 40mg
20 Cp séc
P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

- des œdèmes d'origine h

Lasilix 40mg
20 Cp séc
P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

Pour être utilisé en réanimation pédiatrique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas s

40 mg/comprimé.
e, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

hydroxyde de sodium,

ENTRAÎNEMENTS

à dosages à 40 mg ; boîte
able,

ICAMENT

traitement :
ou rénale,
plus souvent en ass

suivants :
gu du poumon, ar
ation importante de
ardiaque, rénale, c
t test de lavage « w

Lasilix 40mg
20 Cp séc

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

Lasilix 40mg
20 Cp séc

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468

Lasilix 40mg
20 Cp séc

P.P.V : 34DH60



6 118000 060468