



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

W18-353011

DATE DE DEPOT

/...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 365

Nom & Prénom FIKRI Yed

fonction Retraité Phone. 0645983436

mail

MEDECIN

Prénom du patient

FIKRI mohamed y

Adhérent Conjoint Enfant

Age

Date 18.07.2019.

Nature de la maladie

Date 1ère visite

Reception + Affit' envoi -

'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Dr.

BERRADA SOUNI CHAKIB
Ophtalmologiste

Galerie Familia Angle Rue Jura
Av. Vergne 2ème étage Maârif
Casablanca - Tél: 05 22 36 24 25

Nature des actes Nbre de Coefficient Montant détaillé des honoraires

C2

20,72

PHARMACIE

Date

18/07/19 18/07/19

Montant de la facture

1600DH 167,70DA

ICCE:002264846000022

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Date :

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

AM

PC

IM

IV

CACHET

CABINET D'OPHTALMOLOGIE

Dr. BERRADA SOUNI Chakib

Spécialiste des Maladies et Chirurgies des yeux

Strabologie - Lentilles de Contact - Laser - Angiographie

Membre de la Société Française d'Ophtalmologie



الدكتور براة السنی شکیب

اختصاصي في أمراض وجراحة العيون

طب العين - عدسة الاتصال - الليزر - أخبيوغرافي

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض العيون

دار البيضاء، في Casablanca, le 18.07.2019.

M^e. Fikri mohamed

La mire de Comberi (ven + Lentille)
- Impression Anti reflet

$$v_m = (10 + 3,5)$$

$$v_m = (17,5 + 1,25)$$

$$v_m = 18,75$$

90°

égalité nul.

77,5°

lire affiche. 14 (n=2)

167,7°

Galerie Familia Angle Rue Jura Auvergne (Ancien Cinéma)

Familia 3ème étage - Maârif - Casablanca

Tél. : 05.22.99.45.68 / 69

رواق فامليا زاوية زنقة جورا وأوفري (ستيفا فامليا سابقاً)

الطابق 3 - المعاريف - الدار البيضاء

الهاتف: 05.22.99.45.68/69



Bidah Soumia
OPTICIENNE

FACTURE

N° 004670

Clin d'oeil

30, Rue Assâad Ibnou Zarara
(Ex Ballon d'Alsace - Maârif)

Casablanca

Tél.: 022 25 17 65

Fax: 022 25 17 65

Mr. Elkri Mohamed

Sur Ordonnance du Dr. : Soumi

Casablanca le : 18/07/13

QUANTITE	DESCRIPTION	TOTAL
1	Monture	600dt
2	Verre Torique Sphérique Progressif 1.6 Orga - Minéral Anti-reflets (B.B.G.R.) N° Nom	3600dt
1	Monture	
1	Verre Torique Sphérique	
1	Orga - Minéral	
1	N° Nom	
Arrêtée la présente Facture à la somme de:		TOTAL H.T.
Quatre mille deux cent dtls .		T.V.A. 20%
		TOTAL T.T.C.
		4200dt
		—
		—

FR

Siccafluid 2,5 mg/g Gel ophthalmique

Veuillez lire att
de prendre ce i
des information
traitemen

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice de la relire.
- Si vous avez besoin de conseils, adresses ou de consulter un médecin.
- Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés, ou que vous ressentez une sensation de sécheresse comme étant grave, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

SICCAFLUID 2,5 mg/g
Gel ophthalmique 10 g - PPV : 38,50 DH



Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,
Casablanca - Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

14.2238

SICCAFLUID 2,5 mg/g
Gel ophthalmique 10 g - PPV : 38,50 DH



Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,
Casablanca - Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

14.2218

6 118001 070442

Laboratoires Sotherma Bouskoura
Opatanol 0,1% collyre, 5 ml
A.D.S.P. Maroc N° 1458/DMP/21/NPP
PPV : 90,00 DHS

407252

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ?
3. COMMENT UTILISER SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

SICCAFLUID est un substitut lacrymal contenant une substance active lubrifiante appelée Carbomère 974P.

Il s'agit d'un gel ophthalmique indiqué pour soulager les symptômes de la sécheresse oculaire (douleur, brûlure, irritation ou sécheresse) causée par une production insuffisante de larmes.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ?

N'utilisez jamais SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au Carbomère ou à l'un des composants de SICCAFLUID listés à la rubrique 6 « Que contient SICCAFLUID ».

Faites attention avec SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique :

- si vous portez des lentilles de contact souples : vous devez les retirer avant d'utiliser SICCAFLUID gel ophthalmique. Après instillation

1.



2.



3.



1. Tirez légèrement la paupière inférieure de l'œil à traiter vers le bas jusqu'à la formation d'une petite « poche ».

2. Retournez le flacon la tête en bas. Pressez-le pour faire tomber une goutte dans la « poche ».

3. Relâcher la paupière inférieure, et fermez vos yeux quelques instants.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre œil, s'il a aussi besoin d'être traité.

Afin de prévenir les infections, évitez le contact de l'embout du flacon avec votre œil, la peau environnante ou quoi que soit d'autre. Revissez le bouchon pour fermer le flacon immédiatement après utilisation.

Conserver le flacon tête en bas, afin de faciliter la formation des gouttes lors de la prochaine utilisation de SICCAFLUID.

Après la première ouverture du flacon, vous devez pas l'utiliser plus de 28 jours ; merci de voir aussi chapitre 5, « Comment conserver SICCAFLUID ».

vous avez utilisé plus de SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique que vous n'auriez dû :

L'utilisation de plus de gouttes que vous n'auriez dû ne présentent aucun danger.

Si vous oubliez de prendre SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique :

Si vous avez oublié de mettre une goutte de SICCAFLUID poursuivez votre traitement en vous mettant votre prochaine goutte comme prévu initialement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SICCAFLUID est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Contactez votre médecin si :

- vos symptômes s'aggravent ou persistent après le début du traitement avec SICCAFLUID.

Si vous ressentez un des effets indésirables suivant juste après avoir appliqué le gel ophthalmique, parlez-en à votre médecin s'ils vous inquiètent :

- gêne visuelle passagère.
- picotements ou sensation de brûlures, légers et passagers.

Les effets indésirables mentionnés ci-dessus sont connus pour se produire, mais le nombre de personne susceptible de les ressentir peut varier.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SICCAFLUID 2,5 mg/g, gel ophthalmique ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser SICCAFLUID après la date de