

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mme

Nom & Prénom

SARDAoui Fatima

Fonction

Retraite Jeuile

Phones 0666133223

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

FATIMA

2019

Adhérent

Conjoint

Enfant

Age 1/1/1931

Date

Nature de la maladie

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

27/04/2019 contrôle gratuit

PHARMACIE

Date 27.04.2019

Montant de la facture

180,00

Pharmacie Naima

TINP: 92044569

Dr. Hassane MIR

Dr. Hassane MIR
Bd. Anta 1900
Cardiologue
Bd. Anta 1900
Hassane MIR
Casablanca
0512 222 0811
0512 903100

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Date

CACHET

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

CACHET

Cardiologue

Diplômé des Universités Paris V et VI
Echo-Doppler Couleur Cardio-vasculaire

Holter Tensionnel et E.C.G

Epreuve d'effort

اختصاصي في أمراض

القلب والشرايين

خريج كلية الطب بباريز

التخخيص الآلي



Casablanca, le 27/04/2019 الدار البيضاء في

Dr. Hassane MIR
Bd d'Anfa 19 Rue Jaber B. Hayane
Tél: 05 22 21 34 / 05 27 95 63 11 - Urgences: 06 61 13 83 31
Fax: 05 22 21 34 11 - E-mail: hassanemir@gmail.com

Mme

SARAJAACHI FATNA VENUE

45.00 x 4

Rouzane



Dr. MIR Hassane
Cardiologue
Bd d'Anfa 79 Rue Jaber B. Hayane
CP 158 - Casablanca

30TRol 100 mg. 4x4

180,00 PAR FAUR L'MATIN

4 Boîtes



FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS

Boîtes de 28 et 98 comprimés sécables dosés à 50 mg

Boîtes de 14,28 et 98 comprimés sécables dosés à 100

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aténolol

Excipients

Aténolol

Excipients

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Béta-bloquant sélectif.

ZOTROL® 100 mg 28 comprimés sécables

PPV 45DH00

EXP 11/2021

LOT 83077 1

ZOTROL®
(ATENOLOL)**FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS**

Boîtes de 28 et 98 comprimés sécables dosés à 50 mg

Boîtes de 14,28 et 98 comprimés sécables dosés à 100

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aténolol

Excipients

Aténolol

Excipients

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Béta-bloquant sélectif.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine de poitrine.

ZOTROL® 100 mg 28 comprimés sécables

PPV 45DH00

EXP 04/2019

LOT 62037 1

ZOTROL®
(ATENOLOL)**FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS**

Boîtes de 28 et 98 comprimés sécables dosés à 50 mg

Boîtes de 14,28 et 98 comprimés sécables dosés à 100

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aténolol

Excipients

Aténolol

Excipients

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Béta-bloquant sélectif.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine de poitrine.

ZOTROL® 100 mg 28 comprimés sécables

PPV 45DH00

EXP 04/2021

LOT 60041 3

ZOTROL®
(ATENOLOL)**FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRESENTATIONS**

Boîtes de 28 et 98 comprimés sécables dosés à 50 mg

Boîtes de 14,28 et 98 comprimés sécables dosés à 100

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Aténolol

Excipients

Aténolol

Excipients

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Béta-bloquant sélectif.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine de poitrine.

ZOTROL® 100 mg 28 comprimés sécables

PPV 45DH00

EXP 04/2021

LOT 60041 3

MES EN GARDE SPECIALES

NE JAMAIS ARRETER BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS AVIS DE VOTRE MEDECIN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir le médecin en cas de grossesse, allaitement, diabète, insuffisance rénale, certaines maladies des artères (syndrome de Raynaud).

En cas d'intervention chirurgicale, avertissez votre anesthésiste que vous prenez le l'aténolol.

INTERACTION MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, NOTAMMENT l'amiodarone, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, dans la mesure où certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant. Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter d'allaiter pendant la durée du traitement.