

08.08.2019

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle

11414

Nom & Prénom Bichi et thomas

131

Fonction : Phones.....

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

Adhérent Conjoint Enfant Age 15 Ans

Date 01 AOUT 2019

Nature de la maladie

Date 1ère visite

gouffre + lolo fable

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

120,00

Docteur Ahmed LIYIRI
Médecin Générale
Avenue El Jouana B Imm.33
Bld. 3 Salmia Casablanca

PHARMACIE

Date 01.08.2019

Montant de la facture

281,00 dh

Dr.
B. Samira El OUAJANCA
Télé: 38 74 51

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Date :

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des

AM

PC

IM

IV

Honoraires

CHA
MUPRAS

03 SEP. 2019

ACCUEIL

Docteur Ahmed LIYIRI

MEDECINE GENERALE

ECHOGRAPHIE

DIABETOLOGIE

Ex. MEDECIN CHEF

DU CENTRE SANTÉ SALMIA

TÉL : 05 22 55 10 69



الدكتور أحمد لييري

الطب العام

الفحص بالصدى

علاج داء السكري

رئيس المركز الصحي السالمية سابقا

الهاتف : 05 22 55 10 69

Casablanca, Le

01 AOUT 2019

الدار البيضاء في

Signature DTHMAZEE

69,00dh - coffee sou
refill x 6 (0 - 1 - 1 0 8 8)

- Aspirin
refill x 6 X

79,70 - Aspirin 300

refill x 8 X

79,50dh - carbosane
refill x 10 X

52,80dh - oels 20 (me)
refill



شارع الجولان بـ 3 شقة 3 السالمية عمالة مقاطعات بن امسيك - الدار البيضاء
Bd. Al Joulane B immeuble 33 Appt 3 Salmia Prefecture des Arrondissements Ben M'Sik - Casablanca



SUPERFORM-GS®

Vitamines, minéraux et oligo-éléments

Sans Sucre



PPC

69,00 Dhs

dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SUPERFORM et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPERFORM ?
3. Effets secondaires.
4. Comment utiliser SUPERFORM ?
5. Comment conserver SUPERFORM ?
6. Présentation.
7. Composition et informations nutritionnelles.

1- Qu'est-ce que SUPERFORM et dans quel cas est-il utilisé ?
SUPERFORM contient des vitamines, minéraux et oligo-éléments essentiels en quantités équilibrées les uns par rapport aux autres. Les vitamines, sels minéraux et oligo-éléments sont des substances vitales non fabriquées par notre organisme et qui sont apportées principalement par l'alimentation. Ces substances ne sont cependant pas toujours présentes en quantités suffisantes dans l'alimentation quotidienne. SUPERFORM complète l'alimentation en apportant des quantités adéquates en vitamines, sels minéraux et oligo-éléments et peut être utilisé en cas de fatigue et asthénie passagères ou chroniques ; convalescence à la suite d'une maladie ou d'une opération chirurgicale ; curbes d'amincissement de longue durée ou des régimes spéciaux ou bien en cas d'efforts physiques ou intellectuels intenses.

2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SUPERFORM ?

Précautions et contre-indications:

Parler à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser SUPERFORM si vous :

Souffrez d'insuffisance rénale.

Êtes en situation d'hypervitaminose.

Utilisez d'autres produits ou compléments alimentaires.
DANS TOUS LES CAS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :

SUPERFORM ne doit pas être utilisé pendant la grossesse lorsque l'alimentation contient des produits riches en vitamine A tels que le foie, les produits laitiers, les œufs, la margarine, l'huile de table.

SUPERFORM peut être utilisé au cours de l'allaitement.

DANS TOUS LES CAS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN.

3- Effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

4- Comment utiliser SUPERFORM ?

Reservé à l'adulte.

La posologie de SUPERFORM est de 1 comprimé effervescent par jour à prendre de préférence à jeun. Mettre le comprimé effervescent dans un verre d'eau et boire après dissolution complète.

Ne pas dépasser la dose journalière sauf avis contraire de votre médecin ou pharmacien.

Fermer le tube immédiatement après utilisation.

5- Comment conserver SUPERFORM ?

A conserver hors de portée ou de la vue des enfants.

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption mentionnée sur le tube.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

6- Présentation :

Boîte de 20 ou 10 comprimés.

Arôme agréable fruité.

Complément alimentaire, n'est pas médicament.

SUPERFORM-GS®

Vitamins, minerals and trace elements

Sugar Free



Read all of this leaflet carefully before you start taking this product

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have further questions, please ask your doctor or pharmacist

In this leaflet:

1. What SUPERFORM is and what it is used for ?
2. What you need to know before you take SUPERFORM ?
3. How to use SUPERFORM ?
4. Possible side effects
5. How to store SUPERFORM ?
6. Presentation
7. Ingredients and nutritional facts

1. What SUPERFORM is and what it is used for ?

SUPERFORM contains vitamins, minerals and essential trace elements in balanced amounts relative to each other. Vitamins, minerals and trace elements are vital substances not produced by our body and provided mainly by food. However, these substances are not always present in sufficient quantities in the daily diet.

SUPERFORM completes diet by providing adequate amounts of vitamins minerals and trace Elements.

SUPERFORM can be used for acute or chronic fatigue and asthenia; convalescence and post-surgery recovery period; high physical or intellectual stress; long-term weight-loss program and special diets.

2. What you need to know before you take SUPERFORM ?

Warning and precautions:

Talk to your doctor or pharmacist before taking SUPERFORM if you:

Suffer from Kidney failure, hypervitaminosis.

Use other drugs or dietary supplement.

IN ANY CASE ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

Pregnancy and breast-feeding?

SUPERFORM must be avoided during pregnancy if the diet is rich in vitamin A such as liver, dairy products, eggs, margarine, cooking oil.

SUPERFORM can be used during breast-feeding.
IN ANY CASE ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

3. Possible side effects

If you experience any side effect, please report it to your doctor or your pharmacist.

4. How to use SUPERFROM ?

For adults use only, take 1 effervescent tablet daily preferably before Breakfast.

Put the effervescent tablet in a glass of water and drink after complete dissolution.

Do not exceed the recommended daily dosage unless otherwise advised by your doctor or pharmacist.

Close the tube immediately after use

5. How to store SUPERFORM ?

Keep out of the sight and reach of children.

Keep away from heat and moisture.

Do not use after the expiry date which is stated on the tube.

The expiry date refers to the last day of that month.

6. Presentation:

Box of 20 or 10 effervescent tablets.

Fruit pleasant flavor.

Food supplement not a medicine

OEDES® 20 mg

Microgranules gastro-résistants en gélules

OEDES 20mg

14 gélules



DENOMINATION DU MEDICAMENT :

OEDES® 20 mg

COMPOSITION :

Chaque gélule contient 20mg de substance active : oméprazole.

Excipients : qsp 1 gélule.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :

Microgranules gastro-résistants en gélules. Disponibles en boîtes de 7, 14, 28 et 56

CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE :

Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule contient une substance appelée oméprazole. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications :

Adulte :

- En association à une bithérapie antibiotique, éradication de Helicobacter pylori en cas de maladie ulcéruse gastroduodénale.
- Ulcère duodénal évolutif.
- Ulcère gastrique évolutif.
- Oesophagite érosive ou ulcéратive symptomatique par reflux gastro-oesophagien.
- Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien associé ou non à une oesophagite, en cas de résistance à la posologie de 10 mg d'oméprazole par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux chez les patients non infectés par Helicobacter pylori ou chez qui l'éradication n'a pas été possible.
- Traitement d'entretien des oesophagites par reflux gastro-oesophagien.
- Syndrome de Zollinger-Ellison.
- Traitement des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens lorsque la poursuite des anti-inflammatoires est indispensable.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

Enfant à partir de 1 an :

- Oesophagite érosive ou ulcératrice symptomatique par reflux gastro-oesophagien.

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Contre-indications :

Ne prenez jamais Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule:

- En cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.
- En association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

LOT 181041
EXP 01/2021
PPV 52.80DH

grave ou si vous remarquez un effet indésirable
notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule.

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares). Certains enfants atteints d'affections chroniques peuvent nécessiter un traitement au long cours bien que cela ne soit pas recommandé.

Précautions d'emploi

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas d'affections chroniques du foie.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament est contre-indiqué en association avec l'atazanavir associé au ritonavir (médicament anti-infectieux).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

En raison du passage du médicament dans le lait, l'allaitement est à éviter.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Saccharose (cf. mises en garde spéciales)

EFFETS NON SOUHAITES OU GENANTS

Comme tous les médicaments, Oedes 20mg, microgranules gastro-résistants en gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Ces effets indésirables sont généralement d'intensité légère et disparaissent à l'arrêt du traitement.

Effets indésirables fréquents (chez 1 à 10 % des patients traités) :

Maux de tête, diarrhée, constipation, nausées, vomissements, douleurs abdominales, flatulence.

Effets indésirables peu fréquents (chez moins de 1 % des patients traités) :

Sensation vertigineuse, paresthésie (sensation anormale dans une région cutanée ou profonde), somnolence, insomnie, augmentation des enzymes du foie, réactions cutanées (éruption cutanée, prurit, urticaire), malaise.

Effets indésirables rares (chez moins de 0,1 % des patients traités) :

Confusion mentale réversible, agitation, agressivité, dépression et hallucinations, particulièrement chez des patients présentant des pathologies sévères, gynécomastie (gonflement des seins chez l'homme), sécheresse de la bouche, stomatite (inflammation de la bouche), candidose gastro-intestinale (infection due à un champignon), diminution du nombre des cellules sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), encéphalopathie chez les patients ayant une insuffisance hépatique sévère préexistante, hépatite avec ou sans ictere, insuffisance hépatique, douleurs articulaires ou musculaires, fatigue musculaire, photosensibilisation, réactions cutanées graves (réactions bulleuses),

Carboxan®



Charbon végétal activé - Wakamé - Rhubarbe - Menthe poivrée et Fenouil

Lot : 190251
À consommer de préférence avant le : 04/2022

EPC : 79,50 DH



8 032578 47731

mg, Wakamé undaria (pinnatifida poudre) 100 mg, Rhubarbe rhubarbum palmatum) 200 mg, Huile essentielle de Fenouil 10 mg, Huile essentielle de Menthe poivrée (Mentha piperita) 10 mg, Succharides F.O.S 100 mg.

Les plantes naturelles, apaise les sensations de ballonnement, les tensions intestinaux, facilite la digestion et régule le transit intestinal.

UTILISATION :

Carboxane® est recommandé en cas de :

- Ballonnement et Flatulences.
- Constipation, paresse intestinale.
- Colopathie fonctionnelle.
- Digestion difficile.
- Spasmes, Coliques.

CONSEILS D'UTILISATION :

A prendre de préférence après les repas :

- Ballonnement : 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.
- Constipation : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- A utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Respecter la dose journalière recommandée.
- Tenir hors de la portée des jeunes enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

Fabriqué par Pharmalife Research s.r.l. - Lecco - Italie

Importé au Maroc par MEDIPRO Pharma

Autorisation du Ministère de la santé N° DA20161310001DMP/20UCAMA_{v2}

Autorisation sanitaire ONSSA N° ES.5.229.16

AZIX®

PPV 79 DH70
PER 02 / 22
LOT 1422



- infections respiratoires banales;
- infections odontostomatologiques;
- infections cutanées;
- infections des tissus mous;
- urétrites et cervicites non gonococciques (chlamydia trachomatis).

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'azithromycine et aux macrolides.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE :

- Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison ...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin.
- Signaler au médecin traitant toute allergie ou manifestation allergique survenue lors de traitements par les antibiotiques de la famille des macrolides.
- Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une maladie hépatique.
- En l'absence de données, l'association aux dérivés de l'ergot de seigle n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir le médecin traitant en cas de :

Insuffisance hépatique, antécédents allergiques, manifestations cutanées d'origine allergique, prise concomitante d'autres médicaments, grossesse, allaitement.

EFFETS INDESIRABLES :

- Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques; prurit, rash cutané, oedème de Quincke.

POSOLOGIE :

Se conformer à la prescription médicale.

Adulte et enfant de plus de 45 kg : 500 mg par jour, 1 comprimé de 500 mg en une prise par jour pendant 3 jours.

MODE D'ADMINISTRATION :

Azix peut être pris pendant ou en dehors des repas.

TABLEAU A (LISTE I).



bottu SA
82, Allée des Casuarinas - Ain Sebaï - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable