

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Médecine et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Déclaration de Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie : N° P19- 0024845

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4681 Société : QAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : DOULIB Nohame

Date de naissance : 1959

Adresse : E1145 lot Kpt02 au 1A OULFAS CASA

Tél. 06.52.74.75.40 Total des frais engagés : 5652,02 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. A. BENABDALLAH
Urgentiste
Centre Al Kindy - Casablanca

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Tamine Zahra Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

ALD

pulmonaire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à CASA BLANCA

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 03/09/2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/08/2019	G			Dr A. BENABDALLAH Urgentiste Centre Al Kindy - Casablanca
20/09/2019				
30/08/19	Acte	N° 06111-19	du 23/08/2019	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	30/08/19		

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Montant détaillé des Honoraires			
		AM	PC	IM	IV

CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
Oncologie & Diagnostic du Maroc

Tél. : 05 20 48 72 00

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
MONTANTS DES SOINS				
DEBUT D'EXECUTION				
FIN D'EXECUTION				
Coefficient DES TRAVAUX				
MONTANTS DES SOINS				
DATE DU DEVIS				
DATE DE L'EXECUTION				

ODF PROTHESES DENTAIRES

H 25533412 21433552
D 00000000 00000000
B 00000000 00000000
G 35533411 11433553

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E

RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
RADIOOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINICS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIOTHÉRAPIE - CHIOTHÉRAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياص - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستئفاء

CASABLANCA, LE.....

30/08/2019

أخصائيين في العلاج بالأشعة

RADIO-ONCOLOGUES

الدكتور محمد المرشد

Docteur M. EL MORCHID

الدكتور عبد اللطيف بويه

Dr A. BOUIH

الدكتورة نوال بويه

Docteur N. BOUIH

الدكتورة مالحة آيت محمد بور حيم

Docteur M.AIT MOHAMED BOURHIM

الدكتور عبد العزيز بيلا

Docteur A. BAYLA

أخصائي في العلاج بالمواد الكيماوية

ONCOLOGUE MEDICAL

الدكتور سعيد تاشفين

Docteur S. TACHFINE

طبيب المستعجلات

MEDECIN URGENTISTE

الدكتور عبد الحليم بنعبد الله

Docteur A. BENABDALLAH

الفحص بالأشعة

MEDECIN RADILOGUE

الدكتورة زبيدة العمراني

Docteur Z. LAMRANI

A MONSIEUR LE MEDECIN
CONSEIL

Mon Cher Confrère,

MR/MME TAMIME ZAHRA, est suivie au centre de Traitement AL-KINDY pour un carcinome mammaire.

A la date du 27/08/2019 AU 29/08/2019 la patiente a reçu une perfusion avec traitement cortico-antalgique, antibiotique ainsi que des facteurs de croissance hématopoïétique.

En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, Veuillez croire mon cher confrère, en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Docteur :

Dr BENABDALLAH A.
Urgentiste
CENTRE AL KINDY
2-4, rue Al Kindy - Tél. : 022.39.33.33
CASABLANCA

RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE

RADIOOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINICS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
 CURIOTHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل، للسكنبر - الجراحة الإشعاعية
 العلاج الإشعاعي الباطني و الفيماض - الإشعاعي النوروي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE 26/18/19



090001405

JN = Tamime Zahra

TDO : TAP

Evaluation

مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
 Oncologie & Diagnostic du Maroc
 2-4, Rue Al Kindy
 Tél. : 05 20 48 72 00 - Casablanca

Dr BENABDALLAH A.
 Urgentiste
 CENTRE AL KINDY
 2-4, rue Al Kindy - Tél. : 022.39.33.33
 CASABLANCA

DÉTAIL MÉDICAMENT

N° Dossier : 19011542 Patient : TAMIME ZAHRA N°Pièce d'identité : B440490

Code de l'article	Désignation article	P.U	Quantité	Montant
MED00210	METHYLPREDNISOLONE 40mg* INJECTABLE	14.00	1	14.00
RDM00011	VISIPAQUE 320 MG/100 ML	334.00	1	334.00
				Total 348.00

Les produits pharmaceutiques et à usage unique cités ci-dessus sont à utilisation hospitalière et sans vignettes.



RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
RADIOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINICS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياص - الإشعاعي النووي - العلاج الكمياني الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE.....

F A C T U R E



N° de l'admission : 19011542 N° Facture : 19009609 Date facturation : 30/08/2019

Nom et prénom du patient : ZAHRA TAMIME

Convention : PAYANT

Traitements : Examen radiologie Entrée: 28/08/2019 Sortie: 28/08/2019

PRESTATIONS	nombre	prix unitaire	montant
TDM THORACO-ABDOMINO-PELVienne	1.00	3 000.00	3 000.00
		sous-total	3 000.00
PHARMACIE	nombre	prix unitaire	montant
Pharmacie			348.00
		sous-total	348.00

arrêtée la présente facture à la somme de :

Trois mille trois cent quarante huit dirhams total : **3 348.00**

Immatriculation :

N° prise en charge :

Notre compte bancaire : 011 780 0000192100009974 65

مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
Oncologie & Diagnostic du Maroc
2-4, Rue Al Kindy
Tél. : 05 20 48 72 00 - Casablanca

RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
RADIOOTHERAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياص - الإشعاعي النووي - العلاج الكمياني الباطني - الإستشفاء

INPE : 090001405

CASABLANCA, LE.....

F A C T U R E



N° de l'admission : 19011488 N° Facture : 19009611 Date facturation : 30/08/2019

Nom et prénom du patient : ZAHRA TAMIME

Convention : PAYANT

Traitement : PERFUSION Entrée: 27/08/2019 Sortie: 29/08/2019

PRESTATIONS	nombre	prix unitaire	montant
PERFUSION	3.00	550.00	1 650.00
		sous-total	1 650.00
PHARMACIE	nombre	prix unitaire	montant
Pharmacie			654.02
		sous-total	654.02

arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux mille trois cent quatre dirhams deux centimes total : **2 304.02**

Immatriculation :

N° prise en charge :


Notre compte bancaire : 011 780 0000192100009974 65

مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
Oncologie & Diagnostic du Maroc
2-4, Rue Al Kindy
Tél. : 05 20 48 72 00 - Casablanca

DÉTAIL PHARMACIE CUMULÉ

N° Dossier : 19011488 Patient : TAMIME ZAHRA

Code article	Désignation article	Quantité	Montant HT
CONSOMMABLE			
CON00044	BAVETTES A LASSER	2	8.00
CON00078	CHAMP STERIL	2	20.28
CON00083	CHARLOTTE	2	6.00
CON00114	GANTS STERILES 7.5	3	29.25
CON00156	PERFUSEURES EN Y	3	36.00
CON00195	ROBINETS A 3 VOIES	3	33.00
CON00210	SERINGUES 10 CC	12	48.00
CON00395	AIGUILLE DE HUBERT 20 G (001)	1	65.00
CON00487	GANTS N STERILES INFIRMIERES	7	4.27
MEDICAMENT			
CON00223	SERUM SALE 0.9% 500 ML	6	90.00
MED00208	METHYLPREDNISOLONE 120mg* INJECTABLE	3	105.00
MED00258	PERFALGAN* 1g INJECTABLE	6	119.52
MED00424	OMEPRAZOLE NORMON 40 MG	3	89.70
Total:			654.02



مركز العلاج الكندي
CENTRE DE TRAITEMENT AL KINDY
Oncologie & Diagnostic du Maroc
24, Rue Al Kindy
Tél. : 0520 48 72 00 - Casablanca

RADIOOTHERAPIE PAR VMAT (IMRT - IGRT - ARCTHERAPIE) - RADIOCHIRURGIE
RADIOTHÉRAPIE STEREOTAXIQUE - 2 CLINACS EN MIROIRS - SCANNER BIG BORE - RADIOTHERAPIE METABOLIQUE
CURIETHERAPIE A HAUT DEBIT DE DOSE (HDR) - CHIMIOTHERAPIE - CHIMIOTHERAPIE INTRA PERITONEALE (CHIP) - HOSPITALISATION

العلاج الإشعاعي المطور الموجه بالصور - معجل الإلكترونات حامل للسكانر - الجراحة الإشعاعية
العلاج الإشعاعي الباطني و الفياصن - الإشعاعي النووي - العلاج الكيميائي الباطني - الإستشفاء

CASABLANCA, LE.....

أخصائيين في العلاج بالأشعنة

RADIO-ONCOLOGUES

الدكتور محمد المرشد

Docteur M. EL MORCHID

الدكتور عبد اللطيف بوبيه

Dr A. BOUIH

الدكتورة نوال بوبيه

Docteur N. BOUIH

الدكتورة مالحة آيت محمد بورحيم

Docteur M. AIT MOHAMED BOURHIM

الدكتور عبد العزيز بيلاء

Docteur A. BAYLA

أخصائي في العلاج بالمواد الكيماوية

ONCOLOGUE MEDICAL

الدكتور سعيد تاشفین

Docteur S. TACHFINE

طبيب المستعجلات

MEDECIN URGENTISTE

الدكتور عبد الحليم بنعبد الله

Docteur A. BENABDALLAH

الفحص بالأشعة

MEDECIN RADILOGUE

الدكتورة زبيدة العمراني

Docteur Z. LAMRANI

Nom du patient(e)

: MME TAMIME ZAHRA

Date de réception

: 28/08/2019

Médecin prescripteur

: DR. BENABDALLAH

TDM THORACO-ABDOMINO- PELVIENNE

TECHNIQUE :

Examen réalisé en séquences spiralées reconstruites en coupes fines de 2,5 mm et 3,75mm d'épaisseur sans et avec injection de PDC.

RESULTATS : Ex .comparatif avec celui du 08/03/2019

A l'étage thoracique :

- Stabilité de la condensation apicale droite et l'épaississement de la coiffe pleurale.
- Disparition totale des micronodules pulmonaires préexistants.
- Régression totale de la pleurésie gauche.


A l'étage abdomino pelvien:

- Densité hépatique homogène.
- Aspect normal des reins, de la rate et du pancréas.
- Absence d'épanchement intra péritonéal.
- Absence d'adénopathie profonde décelable.
- Vessie de capacité normale.
- Aspect normal de l'utérus.
- Loges ovariennes libres.
- Stabilité de l'atteinte sternale, de l'omoplate droit, de D1, D11 et du bassin.

AU TOTAL :

Rémission totale pleuro pulmonaire avec stabilité de l'atteinte osseuse.

Confraternellement
DR. Z. LAMRANI



DR. Z. LAMRANI
Radiologue

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse

Boîte de 1 flacon. Boîte de 50 flacons.

DCI : Oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse** et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
3. Comment prendre **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

OMEPRAZOLE NORMON® contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée «inhibiteurs de la pompe à protons». Il diminue la quantité d'acide produite par l'estomac.

OMEPRAZOLE NORMON® Lyophilisat pour perfusion intraveineuse peut être utilisée comme une alternative au traitement par voie orale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse ?

Ne prenez jamais OMEPRAZOLE NORMON®

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans **OMEPRAZOLE NORMON®**.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzaprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- Si vous prenez des médicaments contenant du nelfinavir (utilisé pour l'infection par le VIH).

Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien avant que l'on vous administre ce médicament.

Avertissement et précautions:

Faites attention avec OMEPRAZOLE NORMON®:

OMEPRAZOLE NORMON® peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre **OMEPRAZOLE NORMON® lyophilisat pour solution injectable** ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit:

- Vous perdez beaucoup de poids sans raison et vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

Vous devrez faire de la courroie ou du casque.

Effets indésirables peu fréquents

- Gonflement des pieds et des jambes.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissement, fourmillement.
- Vertiges.
- Modifications des résultats du fonctionnement de votre foie.
- Eruptions cutanées, urticaire sur la peau.
- Malaise général et manque d'énergie.

N° AMM : 250 DMP/21/NCI

Lot: P1AL 1
EXP.: 02-2021
PH.: 29, 90DH

Effets indésirables rares

- Troubles sanguins tels qu'une diminution des globules blancs ou des plaques qui peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses et survenue d'infections.
- Réactions allergiques, parfois très graves, tels que gonflement des lèvres, de la langue et de la tête, fièvre, une respiration sifflante.
- Faibles taux de sodium dans le sang qui peuvent provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.
- Agitation, confusion ou dépression.
- Troubles du goût.
- Troubles de la vue, tels que vision trouble.
- Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).
- Sécheresse buccale.
- Inflammation de l'intérieur de la bouche.
- Infection appelée «muguet» qui peut affecter l'intestin et aussi causée par un champignon.
- Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.
- Perte de cheveux (alopecie).
- Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.
- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
- Problèmes rénaux sévères (nephrite interstitielle).
- Augmentation de la sueur.

Effets indésirables très rares

- Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).
- Agressivité.
- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.
- Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.
- Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).
- Faiblesse musculaire.
- Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée

Eruption cutanée, potentiellement accompagnée de douleurs articulaires.

Si vous prenez un traitement par l'oméprazole pendant plus de 3 mois, il est possible que les taux de magnésium dans le sang puissent diminuer. Des faibles taux de magnésium peuvent engendrer une fatigue, des contractions musculaires involontaires (tétanie), une désorientation, des convulsions, vertiges et augmentation du rythme cardiaque. Si vous souffrez un de ces effets indésirables, consulter immédiatement votre médecin. Des taux faibles de magnésium peuvent provoquer une diminution des niveaux de potassium et d'autres éléments dans le sang. Votre médecin

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse

Boîte de 1 flacon. Boîte de 50 flacons.

DCI : Oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

N° AMM : 250 DMP/21/NCI

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse** et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
3. Comment prendre **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse** ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?**

OMEPRAZOLE NORMON® contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée «inhibiteurs de la pompe à protons». Il diminue la quantité d'acide produite par l'estomac.

OMEPRAZOLE NORMON® Lyophilisat pour perfusion intraveineuse peut être utilisée comme une alternative au traitement par voie orale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAITRE AVANT DE PRENDRE **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse ?**

Ne prenez jamais **OMEPRAZOLE NORMON®**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans **OMEPRAZOLE NORMON®**.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanzoprazole, rabeprazole, ésomeprazole).
- Si vous prenez des médicaments contenant du nelfinavir (utilisé pour l'infection par le VIH).

Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien avant que l'on vous administre ce médicament.

Avertissement et précautions:

Faites attention avec **OMEPRAZOLE NORMON®:**

OMEPRAZOLE NORMON® peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre **OMEPRAZOLE NORMON® lyophilisat pour solution injectable** ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit:

- Vous perdez beaucoup de poids sans raison et vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

Effets indésirables peu fréquents

- Gonflement des pieds et des jambes.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Etourdissement, fourmillement.
- Vertiges.
- Modifications des résultats du fonctionnement de votre foie.
- Eruptions cutanées, urticaire peau.
- Malaise général et manque d'énergie.

P1AL 1

02-2021

29,90DH

Lot:

EXP.:

PH:

Effets indésirables rares

- Troubles sanguins tels qu'une diminution des globules blancs ou des plaques provoquant une faiblesse, des ecchymoses et survenue d'infections.
- Réactions allergiques, parfois très graves, tels que gonflement des lèvres, de la langue, fièvre, une respiration sifflante.
- Faibles taux de sodium dans le sang pouvant provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.
- Agitation, confusion ou dépression.
- Troubles du goût.
- Troubles de la vue, tels que vision trouble.
- Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).
- Sécheresse buccale.
- Inflammation de l'intérieur de la bouche.
- Infection appelée «muguet» qui peut affecter l'intestin et aussi causée par un champignon.
- Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.
- Perte de cheveux (alopecie).
- Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.
- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
- Problèmes rénaux sévères (nephrite interstitielle).
- Augmentation de la sueur.

Effets indésirables très rares

- Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).
- Agressivité.
- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.
- Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.
- Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).
- Faiblesse musculaire.
- Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée

Éruption cutanée, potentiellement accompagnée de douleurs articulaires.

Si vous prenez un traitement par l'oméprazole pendant plus de 3 mois, il est possible que les taux de magnésium dans le sang puissent diminuer. Des faibles taux de magnésium peuvent engendrer une fatigue, des contractions musculaires involontaires (tétanie), une désorientation, des convulsions, vertiges et augmentation du rythme cardiaque. Si vous souffrez un de ces effets indésirables, consulter immédiatement votre médecin. Des taux faibles de magnésium peuvent provoquer une diminution des niveaux de potassium et de calcium dans le sang. Votre médecin

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse

Boîte de 1 flacon. Boîte de 50 flacons.

DCI : Oméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice:

1. Qu'est-ce que **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse** et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
3. Comment prendre **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver **OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse**?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg, lyophilisat pour perfusion intraveineuse ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

OMEPRAZOLE NORMON® contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée «inhibiteurs de la pompe à protons». Il diminue la quantité d'acide produite par l'estomac.

OMEPRAZOLE NORMON® Lyophilisat pour perfusion intraveineuse peut être utilisée comme une alternative au traitement par voie orale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OMEPRAZOLE NORMON® 40 mg. Lyophilisat pour perfusion intraveineuse ?

Ne prenez jamais OMEPRAZOLE NORMON®

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans **OMEPRAZOLE NORMON®**.
- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lanoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- Si vous prenez des médicaments contenant du nelfinavir (utilisé pour l'infection par le VIH).

Si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin, votre inférieure ou votre pharmacien avant que l'on vous administre ce médicament.

Avertissement et précautions:

Faites attention avec OMEPRAZOLE NORMON®:

OMEPRAZOLE NORMON® peut masquer des symptômes d'autres maladies. Par conséquent, avant que vous ne commencez à prendre **OMEPRAZOLE NORMON® lyophilisat pour solution injectable** ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit:

- Vous perdez beaucoup de poids sans raison et vous avez des problèmes à avaler.
- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

Vous manquez de la nourriture ou du eau.

Effets indésirables peu fréq

- Gonflement des pieds et des jambes.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissement, fourmillement.
- Vertiges.
- Modifications des résultats du fonctionnement de votre foie.
- Eruptions cutanées, urticaire peau.
- Malaise général et manque d'énergie.

N° AMM : 250 DMP/21/NCI

P1AL1

02-2021

29, 900H

Lot:

EXP.:

PH.:



Effets indésirables rares

- Troubles sanguins tels qu'une diminution des globules blancs ou des plaques qui peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses et survenue d'infections.
- Réactions allergiques, parfois très graves, tels que gonflement des lèvres, de la langue et de la tête, fièvre, une respiration sifflante.
- Faibles taux de sodium dans le sang qui peuvent provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.
- Agitation, confusion ou dépression.
- Troubles du goût.
- Troubles de la vue, tels que vision trouble.
- Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme).
- Sécheresse buccale.
- Inflammation de l'intérieur de la bouche.
- Infection appelée «muguet» qui peut affecter l'intestin et aussi causée par un champignon.
- Troubles hépatiques incluant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue.
- Perte de cheveux (alopecie).
- Eruption cutanée lors d'une exposition au soleil.
- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
- Problèmes rénaux sévères (nephrite interstitielle).
- Augmentation de la sueur.

Effets indésirables très rares

- Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).
- Agressivité.
- Hallucinations visuelles, sensorielles ou auditives.
- Troubles hépatiques sévères entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.
- Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes de la peau pouvant être associées à une fièvre importante et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique).
- Faiblesse musculaire.
- Gonflement des seins chez l'homme.

Effets indésirables de fréquence indéterminée

Éruption cutanée, potentiellement accompagnée de douleurs articulaires.

Si vous prenez un traitement par l'oméprazole pendant plus de 3 mois, il est possible que les taux de magnésium dans le sang puissent diminuer. Des faibles taux de magnésium peuvent engendrer une fatigue, des contractions musculaires involontaires (tétanie), une désorientation, des convulsions, vertiges et augmentation du rythme cardiaque. Si vous souffrez un de ces effets indésirables, consulter immédiatement votre médecin. Des taux faibles de magnésium peuvent provoquer une diminution des niveaux de potassium et d'autres électrolytes dans le sang. Votre médecin