

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## **ditions générales :**

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## **macie :**

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## **ologie et Biologie :**

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## **que :**

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## **ducation :**

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## **taire :**

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## **adie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## **Adresses Mails utiles**

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

### **Cadre réservé à l'adhérent(e)**

Matricule : 7698 Société : Retraite RAM

Actif  Pensionné(e)  Autre : Retraité'

Nom & Prénom : KREIM Driss

Date de naissance : 01.01.1953

Adresse :

Tél. : 06 61 42 29 98 Total des frais engagés : ..... Dhs

### **Cadre réservé au Médecin**

Cachet du médecin :



Date de consultation : 16/01/2012 Age : .....

Nom et prénom du malade : Driss KREIM ..... Age : .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : 

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/6/19	SCB		15000	Dr. Abdessalam BENI BRAHIM Praticien Diabetologue 146, Rue Oued Ziz Hiba - Casablanca Tel.: 05 22 83 83 50
8/7/19				

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
STE PHAR	25/6/19	4637
Lotis, Hiba Casablanca - Tel: 05 22 83 50	08/7/19	332,00

## ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

# RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué, en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan d'état.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			MONTANTS DES SOINS
	H 25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553	B	
	D 00000000	G 00000000		
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	DATE DU DEVIS			
DATE DE L'EXECUTION				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS	VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION			

**Dr. Abdesslam BENKIRANE**  
**OMNIPRATICIEN**



Diabète et Hypertension Artérielle  
Asthme et Allergies  
Electrocardiogramme

الدكتور ابن كيران عبد السلام  
الطب العام

أمراض السكري و الضغط الدموي  
أمراض الضيق و الحساسية  
التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca le : ..... الدار البيضاء، في :

25/06/2019

Madame BOUAFLIA SAADIA

13316

185.00

1) SAFLU 250 Aerosol

2MOIS

2 bouffées matin et soir

75.10

2) EVOX 500

5HJOURS

83.90 0 1 0

3) OZEN CP 10 0 0 1

Docteur BENKIRANE ABDESSLAM

4) Riwel moy / moy / 1 - 0 - C / mis


110.10

463.00

Casablanca - Tel. 0522 83 83 50  
Lot. N° 102, Tanger - Maroc - 31020  
SOCIÉTÉ CASABLANCA  
Z.I. ZIZ FIDA - CASABLANCA

SAFLU 250 microgrammes

Suspension pour inhalation  
en flacon pressurisé  
120 doses



RÉCIPIENT SOUS PRESSION :  
Ne pas exposer à une chaleur excessive.  
Ne pas percer, ni jeter au feu même vide.



لا يُثقب ولا يرمي في النار  
ولو فارغاً

#### Tableau A (liste I)

--

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES  
احترم الجرعات المحددة

Uniquement sur ordonnance  
لا يسلم إلا بوصفة الطبيب

PPV: 185 DH 00  
PER: 10/2021  
LOT: GB81782


# SAFLU®

Propionate de fluticasone /salmétérol

250/25 µg  
Voie inhalée

Suspension pour inhalation en flacon pressurisé

120 x



Cipla Maroc



**Comprimé pelliculé sécable**  
boites de 5, 7 et 10

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :**

Lévofoxacine (DCI) ..... 500 mg

Sous forme de lévofoxacine hemihydraté

Excipients ..... qsp un comprimé pelliculé sécable

Excipients à effets notoires : sans objet

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :**

La lévofoxacine appartient à un groupe de médicaments appelés antibiotiques. La lévofoxacine est un antibiotique de type « quinolone ». Elle détruit des bactéries responsables d'infections dans l'organisme.

**INDICATIONS THERAPEUTIQUES :**

EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, peut être utilisé pour le traitement des infections suivantes:

*Chez l'adulte*

- Sinusites aigües bactériennes
  - Exacerbations aigües de bronchite chronique
  - Pneumonies communautaires
  - Infections compliquées de la peau et des tissus mous
- Pour les infections mentionnées ci-dessus EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, ne doit être utilisé que lorsque les antibiotiques recommandés dans les traitements initiaux de ces infections, sont jugés inappropriés.
- Pyélonéphrites et infections urinaires compliquées
  - Prostatites chroniques bactériennes
  - Cystites non compliquées
  - Maladie du charbon : prophylaxie post exposition et traitement curatif

EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, peut également être utilisé en relais d'un traitement intraveineux initial de lévofoxacine chez les patients ayant montré une amélioration de leur état.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée.

**POSÉLOGIE, MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :**

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

• Par voie orale, à avaler avec de l'eau

• Les comprimés peuvent être pris au cours ou en dehors des repas.

**Protégez votre peau de la lumière solaire**

Évitez l'exposition directe au soleil pendant que vous recevez ce médicament et pendant les 2 jours qui suivent l'arrêt du médicament.

Votre peau devient bien plus sensible au soleil et peut vous donner des sensations de brûlure, de picotements ou former des cloques sévères, si vous ne prenez pas les précautions suivantes :

- Vérifiez que vous utilisez une crème solaire à indice de protection élevé
- Portez toujours un chapeau et des vêtements qui couvrent vos bras et vos jambes.
- Évitez les bains de soleil.

**Si vous prenez déjà des comprimés de fer, des suppléments à base de zinc, des antiacides, de la didanosine ou du sacrafacide :**

Ne prenez pas ces médicaments en même temps que EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable. Prenez ces médicaments au moins 2 heures avant ou après EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable.

**Les comprimés à prendre :**

• Votre médecin décide le nombre de comprimés de EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, que vous devez prendre.

• La dose dépend du type et du siège de l'infection dont vous souffrez.

• La durée de votre traitement dépend de la gravité de votre infection.

• Si vous avez l'impression que l'effet de votre médicament est trop faible ou trop fort, ne modifiez pas la dose de vous-même, mais interrogez votre médecin.

**Adultes et personnes âgées**

**Infections des sinus, infections pulmonaires chez les personnes ayant des problèmes respiratoires à long terme et infections de la prostate**

1 comprimé de EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, une fois par jour.

**Pneumonies et infections de la peau et des tissus sous-cutanés, y compris les muscles**

1 comprimé de EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, une ou deux fois par jour.

**Infections des voies urinaires, y compris au niveau des reins ou de la vessie**

1/2 ou 1 comprimé de EVOX® 500 mg comprimé pelliculé sécable, chaque jour.

Adultes et  
Votre médecin  
Enfants et  
Ce médicament

**CONTRE-INDICATIONS**

• Vous ne prenez pas

• Vous êtes

ou l'officier

Les signes

gonflement

• Vous avez

• Vous avez

antibiotiqu

• Vous êtes

• Vous êtes

Si vous av

séable.

**EFFETS SECONDAIRES**

• Comme tou

systématiq

temps.

Arrêtez de

ment dan

Très rare

Vous faire

des signes

plusieurs

notamment

une éruption

cutanée, u

à respirer,

la gomme

des lèvres

de la gorge ou

de la langue.

Arrêtez de

prendre EVOX®

500 mg

comprimé

pelliculé

sécable

et consultez

immédiat

ement un

médecin si

vous

pouvez

avoir

besoin

d'un

traitement

médical

en urgence :

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

Déshydratation

pouvant

éventuellement

avec des

crampes

d'estomac

et une

température

élève

nte.

Elle peut

être

le signe

d'un

problème

intestinal

sévère,

douleur

et inflam

ation

de vos

tendons

ou ligamen

ts, pouvant

entraîner

une

rupture.

Le tendon

d'Achille

est le plus

souvent

afecté,

crises

d'épilepsie

(convulsions).

Très rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 10 000)

Brûlures,

picotements,

douleur

ou engourdisse

ment, qui

peuvent

être les

signes d'une

neuropathie.

Autre :

Eruptions

cutanées

sévères

pouvant

inclure

l'apparition

de vésicules

ou un décollement

de la peau

autour

des lèvres,

des yeux,

de la bouche,

du nez

et des

organes

genitaux.

Perte

d'appétit,

jâunissement

de la peau

et des

yeux,

urines

foncées,

démangeai

s ou estomac

sensibles

(abdomen),

qui

peuvent

être

des

signes

de problèmes

au niveau

du foie

notamment

une

insuffis

ance

hépatique

(augmenta

tion de la

bilirubine

ou rénaux

(augmenta

tion de la

créatinine),

faiblesse

générale.

Rare (peut toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000)

Tendance

aux

hématomes

et aux

saignements

par diminu

tion du

nombre de

plaquettes

sanguines

(thrombopénie),

diminu

tion du

nombre de

globules

blancs

(neutropénie),

réponse

immunitaire

exagérée

(hypersensibil

ité), hypoglycémie

(important

pour les

personnes

diabétiques),

impressions

visuelles

ou auditiv

es (hallucinati

on, paranoïa),

modificati

on de

votre opini

on et de

vos pensi

es (réactions

psychotiq

ues) avec un risq

ue de pensées

suicidaires

et de passage

à l'acte,

sensation

de stress (anxié

ité), sensation

de confusion

, sensation

de nervosit

e, sensation

de somnolence

(somnol

ence),

modificati

on de

vos pensi

es (problèmes

mentaux,

agitation,

rêves anomau

s ou cauchemar

s, sensation

de picotement

des mains et

les pieds (paresthesi

s), problèmes

d'audition (bourdonnement d'oreille) ou de vision (vision trouble), battements inhabituellement rapides du cœur (tachycardie) ou hypotension, faiblesse musculaire (important chez les personnes atteintes de myasthénie), modifications du fonctionnement des reins et insuffisance rénale occasionnelle qui peut

عن طريق الفم

500 مل

EVOX® 500 mg

DCI : Levofloxacin

5 Comprimés pelliculés sécables

6 118000 340478

أقواس ملبيسة  
قابلة للكسر

5

**OZEN 10 mg**

(Cétirizine Dichlorhydrate)

**1. DENOMINATION DU MEDICAMENT :**

OZEN 10 mg

(Cétirizine Dichlorhydrate)

**Formes/Présentation :**

OZEN 10 mg, comprimé pelliculé, Boîtes de

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous doutez, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement donné. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes identiques, cela pourrait entraîner des effets indésirables.

Si l'un des effets indésirables devient grave, ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE :**

Pour un comprimé pelliculé : OZEN 10 mg

**Principe Actif :**

Cétirizine Dichlorhydrate 10 mg

**Excipients :**

Lactose, amidon de maïs, talc, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium., Opadry white 31F58914, eau purifiée

**Excipients à effet notoire :** Lactose.**3. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE :**

Le dichlorhydrate de Cétirizine est la substance active d'OZEN.

OZEN est un médicament antihistaminique utilisé dans le traitement d'allergie, c'est un dérivé de la piperazine.

**4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES :****DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

Chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans, il est indiqué :

- Pour le traitement des symptômes nasaux et oculaires de la rhinite allergique saisonnière ou perennuelle.

- Pour le traitement des symptômes de l'urticaire chronique (urticaire chronique idiopathique).

**5. POSOLOGIE :****Mode et voie d'administration :****Par voie orale.**

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson. Essayez de prendre votre traitement quotidien à la même heure chaque jour. Il est important de ne pas arrêter le traitement par OZEN, comprimé pelliculé sans l'aviser de votre médecin.

**Durée de traitement :**

La durée du traitement dépend du type, de la durée et de vos symptômes et est déterminée par votre médecin.

**Fréquence d'administration :**

Ces instructions doivent être suivies sauf si votre médecin vous a donné des instructions différentes sur la manière d'utiliser OZEN.

Suivez ces instructions, dans le cas contraire OZEN pourrait ne pas être complètement efficace.

Adultes et adolescents de plus de 12 ans:

10 mg une fois par jour soit 1 comprimé.

Enfants de 6 à 12 ans:

5 mg deux fois par jour, soit un demi comprimé deux fois par jour.

**Ozen 10 mg**

28 comprimés



عن طريق الفم

28

لبيفارما  
IPHARMA S.A.

LOT : 170612  
PER : 04-2020  
PDU : 83,90DH

Avant tout, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre OZEN.

**7. EFFETS INDESIRABLES :**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables suivants sont rares ou très rares ; cependant, en cas d'apparition, vous devez arrêter immédiatement votre traitement et consulter votre médecin :

- Réactions allergiques, y compris réactions graves et angioédème (réaction allergique grave provoquant un gonflement du visage et de la gorge).

Ces réactions peuvent apparaître immédiatement ou de façon retardée par rapport à la prise du médicament.

**Effets indésirables fréquents** (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 10)

- Somnolence

- Sensations vertigineuses, maux de tête

- Pharyngite, rhinite (chez l'enfant)

- Diarrhée, nausées, sécheresse de la bouche

- Fatigue

**Effets indésirables peu fréquents** (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 100)

- Agitation

- Paresthésie (sensation tactile anormale au niveau de la peau)

- Douleur abdominale

- Prurit (démangeaison), éruption cutanée

- Asthénie (fatigue intense), malaise

**Effets indésirables rares** (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 1 000)

- Réactions allergiques, parfois graves (très rare)

- Dépression, hallucinations, agressivité, confusion, insomnie

- Convulsions

- Tachycardie (battements du cœur trop rapides)

- Anomalies du fonctionnement du foie

- Urticaire

- Édème (gonflement)

- Prise de poids

**Effets indésirables très rares** (peut concerner jusqu'à 1 patient sur 10 000)

- Thrombocytopénie (diminution des plaquettes sanguines)

- Tics (contractions musculaires involontaires répétées)

- Syncope, dyskinésie (mouvements involontaires), dystonie (contraction musculaire anormalement prolongée), tremblements, dysguestie (altération du goût)

- Vision floue, troubles de l'accommodation (difficultés à voir de façon nette), crises oculogyrées (mouvements circulaires incontrôlés des yeux)

- Angioédème (réaction allergique grave provoquant un

érythème et/ou gonflement du visage et de la gorge), érythème

érythème et/ou gonflement de l'urine (incontinence urinaire, douleur et/ou difficultés à uriner)

Les effets indésirables de fréquence indéterminée (la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles) peuvent également se produire, troubles de la mémoire, ressentez un quelconque effet indésirable, qu'il ait été mentionné ou non dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**SE EN GARDE SPECIALES ET / CAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI :**

Attention avec OZEN, comprimé pelliculé : nez votre médecin de toute autre maladie ou état, car il lui faudra peut-être en tenir compte. En particulier, informez votre médecin : si vous avez une insuffisance rénale; si nécessaire, devrez prendre une dose inférieure. La posologie sera déterminée par votre médecin.

Si vous êtes épileptique ou si vous présentez des risques de convulsions.

Il n'a pas été observé d'interaction spécifique entre la Cétirizine utilisée aux doses recommandées et l'alcool (jusqu'à la concentration sanguine de 0,5 pour mille correspondant à un verre de vin).

Comme avec tout autre antihistaminique, il est recommandé d'éviter la prise d'alcool avec OZEN. Si vous devez subir des tests pour le diagnostic de l'allergie (test cutané par exemple), il convient d'arrêter de prendre ce médicament au moins 3 jours avant la réalisation des tests car il peut en modifier les résultats. Demandez à votre médecin ce qu'il convient de faire avant la réalisation des tests pour le diagnostic de l'allergie.

**9. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourrez prendre tout autre médicament. Ceci inclut les médicaments obtenus sans ordonnance.

**Interactions avec les aliments et les boissons**

La prise alimentaire n'affecte pas significativement l'absorption de la Cétirizine.

**10. UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT****Grossesse, allaitement et fertilité**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Comme pour d'autres médicaments, l'utilisation d'OZEN doit être évitée pendant la grossesse.

L'utilisation accidentelle lors de la grossesse ne devrait pas affecter le fœtus. Cependant, ce médicament devra être administré uniquement si nécessaire et après avis médical.

OZEN ne doit pas être pris pendant l'allaitement en raison de son passage dans le lait maternel.

**11. CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINE :**

Les études cliniques n'ont pas mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire après administration d'OZEN aux doses recommandées.

Si vous êtes susceptible de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines, vous devez évaluer au préalable votre propre réaction au traitement par OZEN.

Vous devez également évaluer soigneusement votre réponse au traitement par Cétirizine au préalable.

Chez certains patients sensibles, l'utilisation concomitante d'alcool ou d'autres dépresseurs du système nerveux central peut entraîner une diminution de l'attention ou de la capacité à réagir.

**12. SURDOSAGE :**

Si vous avez pris plus d'OZEN, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Contacter votre médecin si vous pensez que avez pris plus de comprimés d'OZEN qu'il ne le fallait. Votre médecin décidera alors, si nécessaire, des mesures à prendre.

En cas de surdosage, les effets indésirables décrits ci-dessous peuvent apparaître avec une intensité augmentée. Des effets indésirables tels que confusion, diarrhée, vertige, fatigue, céphalée, sensation de malaise, dilatation des pupilles, démagrison, agitation, sédation, somnolence, stupeur, augmentation anormale du rythme cardiaque, tremblements et rétention urinaire ont été rapportés.

**13. CONDUITE A TENIR EN CAS D'OMMISION D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES :****Si vous oubliez de prendre OZEN :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**14. MENTION, SI NÉCESSAIRE D'UN SYNDROME DE SEVRAGE**

Sans objet.

- Tableau C (liste II)

- Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.

- Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

- **Fabricant par :** COOPER PHARMA Route 107, Km 2,5 Douar Oulad Abbou - TIT MELLIL  
- **Titulaire de l'AMM au Maroc**
**LABORATOIRES IPHARMA**  
 Km 4 Ancienne route de l'aviation Tanger

**DERNIERE DATE A LAQUELLE CETTE NOTICE A ETE APPROUVE EST JJ/MOIS/ANNEE : Nov 2015.**

Ceci est un médicament.

Un médicament n'est pas un produit comme les autres.

Il vous concerne, vous et votre santé.

Le médicament est un produit actif.

Une longue recherche a permis de découvrir son activité.

Mais, son absorption n'est pas toujours sans danger, il ne faut jamais abuser des médicaments.

Il ne faut pas utiliser les médicaments qu'à bon escient.

Utiliser les médicaments prescrits comme vous le dit votre médecin.

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin.

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas. Ne le reprenez pas de votre initiative. Votre pharmacien connaît les médicaments / suivez ses conseils.

Il ne s'agit pas pour vous de prendre beaucoup de médicaments.

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin.

**LABORATOIRES IPHARMA**  
 Km4, Ancienne Route de l'Aviation – TANGER  
 Mr NAJIB EL HADAR – Pharmacien Responsable





Diabète et Hypertension Artérielle  
Asthme et Allergies  
Electrocardiogramme

أمراض السكري والضغط الدموي  
أمراض الضيق والحساسية  
التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca le : ..... الدار البيضاء، في :

08/07/2019

Madame BOUAFIA SAADIA

13316

1) GLUCOPHAGE cp à 500mg

3 mois  
au milieu repas

2) JUVAMINE Ampoule Buvable

1 Boite.  
Au milieu du repas.

AB MATIN

3) FERPLEX

1 0 0

4) DECIDOUZE cp

1 cp 2 fois par jour

1 Boite.  
Au milieu du repas.

Docteur BENKIRANE ABDESSLAM

RDV 21/07/2019

**Composition :**

Metformine chlorhydrate.....500 mg  
 Excipient : q.s.p .....un comprimé pelliculé  
 Un comprimé contient 500 mg de chlorhydrate de  
 metformine correspondant à 390 mg de metformine  
 base.

**GLUCOPHAGE® 500**

50 COMPRIMÉS PELLICULÉS



**التركيب :**

كلورهيدرات الميتفورمین 500 مغ  
 سواغ : ك.ك.لقرص واحد مغلق

**GLUCOPHAGE® 500**

50 COMPRIMÉS PELLICULÉS



6 118000 080626

**GLUCOPHAGE® 500**

50 COMPRIMÉS PELLICULÉS



6 118000 080626

**Composition :**

Metformine chlorhydrate.....500 mg  
 Excipient : q.s.p .....un comprimé pelliculé  
 Un comprimé contient 500 mg de chlorhydrate de  
 metformine correspondant à 390 mg de metformine  
 base.

**التركيب :**

كلورهيدرات الميتفورمین 500 مغ  
 سواغ : ك.ك.لقرص واحد مغلق  
 يحتوي كل قرص على 500 مغ من كلورهيدرات الميتفورمین

**Composition :**

Metformine chlorhydrate.....500 mg  
 Excipient : q.s.p .....un comprimé pelliculé  
 Un comprimé contient 500 mg de chlorhydrate de  
 metformine correspondant à 390 mg de metformine  
 base.

**التركيب :**

كلورهيدرات الميتفورمین 500 مغ  
 سواغ : ك.ك.لقرص واحد مغلق  
 يحتوي كل قرص على 500 مغ من كلورهيدرات الميتفورمین  
 ما يعادل 390 مغ من الميتفورمین.

JU

## COMPOSITION PO

PANAX GINSENG C..

Extrait de Maté.....

Extrait de Guarana....

La Guarana et le Ma  
pour raviver l'éveil et

## PROPRIÉTÉS :

- Pouvoir anti-fatigi  
(vieillesse, post-accc
- Accroît les résistan
- Augmente les pei
- d'entraînement et en
- Augmente le tonus
- Excellent stimulant
- Stimule les défense
- Favorise l'activité ir

## CONSEILS D'UTILI

Diluer le contenu de  
Prendre une ampoule

## PRÉSENTATION :

Boîte de 10 ampoules

FR

Pour 1 ampoule de 10 ml

Extrait de GINSENG	90 mg
	soit 11 mg de ginsénosides
Extrait de MATE	67 mg soit 14 mg

de caféine

Extrait de GUARANA

130 mg

de caféine

### Conseils d'utilisation :

Diluer le contenu de l'ampoule dans un verre d'eau ou de jus de fruits. Prendre 1 ampoule par jour, de préférence le matin, pendant 20 jours en période difficile ou 10 jours pour l'entretien de sa forme.

Un léger dépôt est normal, bien agiter l'ampoule avant utilisation.

Teneur élevée en caféine (14mg/ampoule).  
déconseillé aux enfants de moins de 15 ans et aux femmes enceintes ou allaitantes.

EN

For 1 vial of 10 ml

90 mg

Ginsenosides

soit 14 mg

de caféine

LOT

PER

Prix

99,00


a glass of per day.  
20 days during times of stress or for 10 days to stay in shape. A slight deposit is normal. Shake the vial vigorously before use.

High caffeine content (14mg/vial),  
not recommended for children under 15 years old and pregnant or nursing mothers.

LABORATOIRES  
**JUVAMINE**

# GINSENG TONUS

PHYSICAL AND INTELLECTUAL TONIC



100%  
natural  
origin

Alcohol free  
Preservatives free  
Colouring agents free

1 a day

10 DAYS PROGRAM

L'efficacité du P...  
plusieurs études

Laboratoires JUVA SANTE

8- Rue Christophe Colomb, 75008 – Paris  
France

# **FERPLEX®** 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Fabricant :  
ITALFARMACO S.A.  
C/San Rafael 3, Polígono Industrial de  
Alcobendas.  
28108 Alcobendas-Madrid. Espagne.



Importateur:  
La femme et son enfant  
Laboratoire pharmaceutique VERSALYA  
Zone industrielle Had Soualem Lot 149. Maroc.  
Dr N. KHALED Pharmacien Responsable  
Médicament autorisé N° 70/18 DMP/21/NRQ

# **FERPLEX®** 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Fabricant :  
ITALFARMACO S.A.  
C/San Rafael 3, Polígono Industrial de  
Alcobendas.  
28108 Alcobendas-Madrid. Espagne.



Importateur:  
La femme et son enfant  
Laboratoire pharmaceutique VERSALYA  
Zone industrielle Had Soualem Lot 149. Maroc.  
Dr N. KHALED Pharmacien Responsable  
Médicament autorisé N° 70/18 DMP/21/NRQ

# **FERPLEX®** 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Fabricant :  
ITALFARMACO S.A.  
C/San Rafael 3, Polígono Industrial de  
Alcobendas.  
28108 Alcobendas-Madrid. Espagne.



Importateur:  
La femme et son enfant  
Laboratoire pharmaceutique VERSALYA  
Zone industrielle Had Soualem Lot 149. Maroc.  
Dr N. KHALED Pharmacien Responsable  
Médicament autorisé N° 70/18 DMP/21/NRQ

# **FERPLEX®** 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables  
PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

# **FERPLEX®** 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables  
PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

# **FERPLEX®** 40 mg

Fer protéinsuccinylate

Boîte de 10 Falcons buvables  
PPV 60,00 Dhs



6 118001 440016

# PRINCI-B FORT®

Vit B1, Vit B6, Vit B12  
Boîte de 30 comprimés enrobés

Pour les médicaments non soumis à prescription, veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.  
Vous devez toujours prendre ce médicament :  
- Garder cette notice, vous pourrez avoir :  
- Adresser-vous à votre pharmacien pour :  
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables :  
- Vous devez vous adresser à votre médecin.



Medicamente autorisé N° : 224 DMP/21/A/0



Laboratoires SYNTHEMEDIC

20 - 22 Rue Zoubeir Benou El Aouam  
Roches Noires - Casablanca

PRINCI-B FORT  
30 comprimés enrobés



6 118000 180234

1. Que contient cette notice :

- 2. Qu'est-ce que PRINCI-B FORT et dans quel cas est-il utilisé ?
- 3. Quelles sont les informations à connaître ?
- 4. Comment prendre PRINCI-B FORT, combien ?
- 5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 6. Comment conserver PRINCI-B FORT, combien ?
- 7. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que PRINCI-B FORT et dans quel cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Vitamines (A : Appareil digestif et métabolisme).

Code ATC : (Vit B1 : A11DA01), (Vit B6 : A11HA02), (Vit B12 : B03BA01).

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué en cas de :

- Prophylaxie et traitement des états de carence nutritionnelle en vitamines du groupe B en association avec d'autres vitamines de ce groupe, notamment des carences induites par l'alcoolisme chronique
- Traitement des algies à composante neurologique et neuromusculaire.

- Athénose.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PRINCI-B FORT ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Contre-indications :

Ne prenez jamais PRINCI-B FORT, comprimé enrobé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à l'un des constituants du comprimé.
- En association avec la lévodopa.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec PRINCI-B FORT, comprimé enrobé.

Ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée.

Ne pas associer la pyridoxine (Vitamine B6) à la lévodopa sauf si celle-ci est associée à un inhibiteur de la dopa décarboxylase.

EN CAS DE DOUBTE, NE PAS HESITER A DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments :

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons :

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Allaitement :

En cas d'allaitement, évitez de prendre ce médicament.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Sportifs :

Sans objet

Effets sur l'aptitude de conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

Sans objet

Excipients à effets notoires :

Ce médicament contient le glycérol et laque de coccine.

## 3. COMMENT PRENDRE PRINCI-B FORT ?

Instruction pour un bon usage

Posologie, mode et/ou voie d'administration, fréquence d'administration :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie :

REFLECHIR À L'AUTOLITE.

1 comprimé 2 ou 3 fois par jour.

Medec et voie d'administration :

Voie orale

Les comprimés sont à avaler sans croquer au début ou au milieu des repas avec un peu d'eau.

Durée du traitement :

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Prenez PRINCI-B FORT uniquement comme il vous a été prescrit. Si vous avez utilisé ou pris plus de PRINCI-B Fort, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien. Un excès de consommation de vitamines B dans le corps n'est, en principe, pas connu. A signaler toutefois, que lors de l'utilisation de doses beaucoup trop fortes (c'est-à-dire, dépassant beaucoup les quantités recommandées), la vitamine B6 peut provoquer une atteinte des nerfs périphériques, du foie ou une éruption sur la peau.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage.

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PRINCI-B FORT, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ces effets indésirables sont liés à la vitamine B6, ils sont caractérisés par des manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement suite à des fortes doses et/ou en cures prolongées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER PRINCI-B FORT, COMPRIME ENROBE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte (La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois mentionné).

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

« Ne jetez aucun médicament au bout à l'égout ni avec les ordures ménagères ».

Donnez vos propres pharmaciens d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Que contient PRINCI-B FORT, comprimé enrobé :

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) par unité de prise :

Thiamine mononitrate (Vitamine B1) ..... 250,00 mg

Pyridoxine hydrate (Vitamine B6) ..... 250,00 mg

Cyanocobalamine (Vitamine B12) ..... 1,00 mg

Composition qualitative en excipients :

Povidone K90, Aerosil 200, Cellulose microcristalline, Stéarate de Magnésium, Hypromellose, Laque coccine (20%), Glycerol, Dioxyde de titane.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc :

Laboratoires SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir Benou El Aouam, Roches noires, 20300 Casablanca, Maroc

La dernière page à laquelle cette notice a été révisée : 12/2017.

Conditions de prescription et de délivrance :

Médicament délivré sans ordonnance.