

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR
ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS**

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
 Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
 La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
 L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
 En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
 Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Diagnostique et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
 Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
 Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèse dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
 La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
 La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Déclaration : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0044978

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7205 Société : RAM
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : SAÏD NAJEM
 Date de naissance : 16-05-1957
 Adresse : 13 Rue Nazim AL MALAKA Hay
 TISSIN II BERRECHID
 Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 05/08/2022
 Nom et prénom du malade : NAJEM SAÏD Age : 62 ans
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : hémiparésie
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/09	205	2	2520,00	
18/09	122	2	1590,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	5/08/19	889,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>


O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H		G	
25533412	21433552		
00000000	00000000		
00000000	00000000		
35533411	11433553		
B			

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION


VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E

Docteur Abdellah TAYB

Spécialiste des Maladies Respiratoires
de l'Allergie Adultes et Enfants

Ex-Médecin au Département des
Maladies Respiratoires de 20 Août
et Averroes à Casablanca



دكتور عبد الله التائب

اختصاصي في أمراض التنفس - الحساسية

لللكبار والصغار

طبيب سابق بالمصلحة الكبرى لأمراض
الصدر بمستشفى 20 غشت و ابن رشد

بالدار البيضاء

Berrechid, le 07/07/19 برشيد، في

6 118001 041114
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg/dose
(Tiotropium)
Solution pour inhalation
Inhalateur + cartouche de 60 doses
BOTTU S.A. 12213-01
PPV : 422 DH 00

Foster 100/6µg, solution pour
inhalation en flacon pressurisé
Distribué par PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel - Had Soualem
PPV : 291DH00

428,00

سليڤا ريسپيمات

S.V

51,50

فوسٲر ١٠٠/٦

S.V

291,00

فوسٲر ١٠٠/٦

S.V

125,00

فوسٲر ١٠٠/٦

S.V

889,50

Dr. Abdellah TAYB
Pneumologue-allergologue
87, Bd. Moulay Ismail
Tél.: 0522 32 55 01 - Berrechid

87, شارع مولاي اسماعيل - برشيد - الهاتف : 0522 32 55 01 - المحمول : 0661 79 02 05

INP : 061133435 / ICE : 00191809000064

87, Boulevard Moulay Ismail - Berrechid - Tél./Fax : 0522 32 55 01 - GSM : 0661 79 02 05

BIOTIC PLUS

Amoxicilline + Acide clavulanique

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice et prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des difficultés à comprendre ce qui est écrit sur cette notice, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Pharmacien

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous observez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre médecin ou à votre pharmacien.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous observez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, contactez votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BIOTIC PLUS®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BIOTIC PLUS® ?
3. COMMENT PRENDRE BIOTIC PLUS® ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BIOTIC PLUS® ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE BIOTIC PLUS®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

- Amoxicilline : Antibiotique bactéricide à large spectre de la famille des bêta-lactamines du groupe des aminopénicillines.
- Acide clavulanique : puissant inhibiteur de bêta-lactamases.

Indications thérapeutiques

Elles sont limitées aux infections causées par les germes sensibles, notamment dans certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et/ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles, en particulier les germes producteurs de bêta-lactamases. BIOTIC PLUS® est particulièrement conseillé dans les infections suivantes :

sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée), angines récidivantes, otite moyenne aiguë, exacerbation de bronchite chronique, pneumonie aiguë communautaire, cystite, pyélonéphrite, infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite, infections des os et

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Les médicaments déconseillés sont : Méthotrexate : augmentation de la toxicité hématologique due au méthotrexate par la sécrétion tubulaire rénale par les pénicillines.

Prenez BIOTIC PLUS® avec prudence :

risque accru de réactions cutanées.

Effets indésirables : surveiller avec attention le temps de Quick

Utilisation concomitante de probiotiques :

Prenez BIOTIC PLUS® avec les aliments et les boissons, sans objet de restriction avec les produits de phytothérapie ou thérapies complémentaires sans objet

Allaitement :

Une association amoxicilline-acide clavulanique peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.

Prendre conseil auprès de son médecin ou bien de son pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement : Le passage de l'association amoxicilline-acide clavulanique dans le lait maternel est faible et les quantités ingérées sont inférieures aux doses thérapeutiques. En conséquence, l'allaitement est possible en cas de prise de cet antibiotique.

Toutefois, interrompre l'allaitement (ou le médicament) en cas de survenue de diarrhée, de candidose, ou d'éruption cutanée chez le nourrisson.

Sports : sans objet

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :

BIOTIC PLUS® peut provoquer des effets indésirables (par exemple réactions allergiques, vertiges, convulsions) susceptibles de réduire la capacité à conduire.

- Tenir compte de la teneur en potassium chez les personnes suivant un régime hypokaliémiant.

- BIOTIC PLUS® enfant et nourrisson contient de l'aspartame, est une source de phénylalanine. Ce médicament doit être utilisé avec prudence chez les patients atteints de phénylcétonurie.

- Tenir compte de la teneur en sodium dans la poudre, la suspension et sachets, chez les personnes suivant un régime hyposodé strict.

- En raison de la présence de lactose, la forme poudre et sachets est contre-indiquée en cas de galactosémie congénitale ou de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

3. COMMENT PRENDRE BIOTIC PLUS® ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez au

BIOTIC PLUS 1g/125mg

Poudre pour suspension buccale en sachet

Boîte de 14 sachets - PPV : 125,00 DH



6 118000 191025

Librairie

Xanthium® LP 200 mg, boîte de 30 gélules
 Xanthium® LP 300 mg, boîte de 30 gélules
 Xanthium® LP 400 mg, boîte de 30 gélules

LOT 18B06 4
 EXP 02 2021
 PPV 51-50 DH

longée
 longée
 longée

Veillez lire attentivement l'intégral du médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, consultez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE XANTHIUM LP ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XANTHIUM LP ?
3. COMMENT PRENDRE XANTHIUM LP ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER XANTHIUM LP ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE XANTHIUM LP ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Traitement et prévention des symptômes du bronchospasme (contraction spasmodique des bronches) associé à l'asthme, la bronchite chronique, l'emphysème (destruction de la paroi des alvéoles pulmonaires).
 En cas de crise aiguë, il y aura lieu d'utiliser d'autres médicaments plus appropriés, que votre médecin vous indiquera.
 Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE XANTHIUM LP ?

Ne prenez jamais Xanthium LP :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Allergie à l'aminophylline ou aux autres xanthines (théobromine, caféine).
- Enfant en dessous de 6 ans.

Avertissement et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Xanthium LP.
 • Ne pas ouvrir les gélules et ne pas croquer les micro granules.
 • Ne pas augmenter la dose préconisée sans prendre l'avis du médecin traitant.
 • La prudence est recommandée chez les patients souffrant de maladies du cœur, du foie, du poulmon, des reins, d'infections virales aiguës, de troubles de la thyroïde, de maux de tête, ainsi que d'ulcère d'estomac ou du duodénum et chez les personnes âgées.

- En cas de crise d'asthme, on évitera l'administration d'un autre médicament à base de théophylline et on s'abstiendra d'augmenter la quantité prescrite de gélules.
- La prudence s'impose en cas d'épilepsie.
- Si vous prenez un produit ou un médicament contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*), il est nécessaire d'interrompre sa prise AVANT de commencer un traitement par Xanthium LP.
- Si vous êtes actuellement traité simultanément par un médicament ou un produit contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) et Xanthium LP, il ne faut pas arrêter spontanément la prise du millepertuis sans avoir consulté un médecin car cette décision pourrait nécessiter une adaptation de la posologie de Xanthium LP.

Enfant et adolescents

Ne pas prendre Xanthium LP avant l'âge de 6 ans.

Autres médicaments et Xanthium LP

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
 • L'association avec des sympathicomimétiques par inhalation permet de diminuer la posologie des deux substances et ainsi de diminuer le risque d'effets non désirés.

• La théophylline peut guérir les symptômes associés à des

Âge	Doses de théophylline anhydre par 24h exprimées en mg par kg de poids corporel*	Doses de théophylline anhydre toutes les 24h	Type et nombre de gélules Xanthium LP toutes les 24h		
			200 mg	300 mg	400 mg
6-9 ans	20 mg/kg/jour	300 à 500 mg	2	/	ou 1
9-12 ans	18 mg/kg/jour	500 à 600 mg			
		400 mg	2	/	ou 1
		500 mg	1+	1	/
12-16 ans	16 mg/kg/jour	600 mg	/	2	/
		500 à 800 mg			
		700 mg	/	1+	1
A partir de 17 ans	10 mg/kg/jour	800 mg	/	/	2
		600 à 1000 mg			
		700 mg	/	1+	1
		800 mg	/	/	2
Patients âgés	6 à 8 mg/kg/jour	900 mg	/	3	/
		1000 mg	/	2+	1
		300 à 600 mg			
		400 mg	2	/	ou 1
		500 mg	1+	1	/
		600 mg	/	2	/

*En cas d'obésité, les doses seront calculées sur base du poids idéal du patient.

Dans le cas où le Xanthium LP est administré en une seule dose journalière, les gélules prescrites seront absorbées en une seule fois, soit le matin, soit le soir, mais toujours à la même heure chaque jour et toujours de la même façon par rapport aux repas (soit toujours pendant soit toujours en dehors des repas).
 Dans les cas où le médicament jugera préférable de donner le médicament 2 fois par jour, les gélules seront prises et le matin et le soir à 12 heures d'intervalle et toujours dans les mêmes conditions par rapport aux repas.
 Quel que soit le mode d'administration, ne pas ouvrir les gélules et ne pas croquer ou écraser leur contenu.

Mode d'administration

Voie orale.

Si vous avez pris plus de Xanthium LP que vous n'auriez dû

La prise d'une dose trop forte de théophylline peut se traduire par les signes suivants : troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, douleurs d'estomac, diarrhées, vomissements sanglants), troubles nerveux (excitation excessive, agitation, nervosité, confusion), troubles cardiaques (palpitation, troubles du rythme, hypotension ou hypertension). Une intoxication plus importante peut provoquer des convulsions.

Les risques de surdosage sont généralement plus fréquents chez les patients âgés ainsi que chez les personnes atteintes de troubles hépatiques, d'une défaillance cardiaque ou de fièvre prolongée.
 Le médecin sera averti en cas d'apparition de l'un de ces troubles. Une hospitalisation pourra être jugée nécessaire en présence de signes manifestes d'intoxication.

On traitera une intoxication à la théophylline par vidange gastrique ou par utilisation de charbon actif ; des sédatifs (par exemple du diazépam à raison de 5-10 mg en i.v. (enfants 0,1 à 0,2 mg/kg en injection intraveineuse) seront administrés en cas de convulsions ; oxygénation, maintien de la pression artérielle, traitement de la déshydratation (maintien de l'équilibre hydro-électrolytique), hémoperfusion avec résines.

Une hémoperfusion doit être pratiquée si les taux de théophylline sont supérieurs à :


- 40 à 60 µg/ml chez un patient déjà traité,
- 80 µg/ml chez un patient non traité,
- 50 µg/ml chez un patient âgé de plus de 60 ans ou en cas d'insuffisance cardiaque ou hépatique.

Une hémodialyse est aussi efficace qu'une hémoperfusion.
 Si vous avez utilisé ou pris trop de Xanthium LP, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Docteur Abdellah TAYB

Spécialiste des Maladies Respiratoires
de l'Allergie Adultes et Enfants

Ex-Médecin au Département des
Maladies Respiratoires de 20 Août
et Averroes à Casablanca



دكتور عبد الله التائب

اختصاصي في أمراض التنفس - الحساسية
لل كبار والصغار
طبيب سابق بالمصلحة الكبرى لأمراض
الصدر بمستشفى 20 غشت و ابن رشد
بالدار البيضاء

Berrechid, le 5/8/14 برشيد. في

Rapport :


Docteur ABDELLAH TAYB
PNE. All. - ALLERGOL. BERRECHID
X7114 M. Casablanca

ملاحظة (A) :

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

Amio 200 mg

F105
Csten horizontal
il n'y a pas de
les espaces
inter costaux



FACULTÉ

$E_{12} = 150,0024 = \text{CENT}$
CINQUANTE DIX MILLE


Docteur ABDELLAH TAYB
PNEUMO - ALLERGOLOGUE
N° 11146 - Royal Boudouia