


SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES



Dents
Traitées

Nature
des soins

Coefficient

Coefficient des travaux


Montant des soins

Début d'exécution

Fin d'exécution

O.D.F. Prothèses dentaires

Détermination du coefficient
masticatoire



	H	G
D	25533412 00000000	21433552 00000000
	00000000	00000000
	35533411	11433553

(Création, Remont, adjonction)
Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient des travaux

Montant des soins

Date du devis

Fin d'exécution

Visa et cachet du praticien
attestant le devis

Visa et cachet du praticien
attestant l'exécution

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mme 822

Nom & Prénom HAMZA Zohra

Fonction Fonction

Phones 0672 136056

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

HAMZA Zohra

Adhérent Conjoint Enfant Age

Date 05/08/2019

Nature de la maladie

Santé dentaire

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des
honoraires

C

150.04

PHARMACIE

Date 09/08/2019

Montant de la facture

151.60

03 SEP.

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Date 10/08/2019

Désignation des
Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

28.03

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date

Nombre

AM PC IM IV

Montant détaillé des
Honoraires

CACHET

Signature et
cachet de
l'adherent

Dr. Raphaël GUESSOUS
234 Av. du N° 110
Medecine Générale
Essalam, Casablanca
13/05/2019

Signature et
cachet de
l'adherent

Dr. Abdejabbar HILAL
PHARMACIE NIRINE
234 Av. du N° 10 Mars
Bloc 50 N° 80
Sidi Othmane
Casablanca
Tél: 05.22.57.72.01

Docteur Rajae GUESSOUS
Médecine Générale
234 Av du Nil - Hay Essalama Casablanca
Tél: 06 22 37 05 72

Le : 11 9 AOUT 2019

ORDONNANCE

~~31,3° x 2~~ HANZA 20mg
1) Zylopic 200 SV
40° 1 gr. li

2) Anti SPA SV
49° 1 gr. 3+li au delà

3) Pimcav SV
151,60 1 gélule 2+li au delà

PHARMACIE NISRINE
Dr. Abdeljabbar HILLAL
Av. 10 Mars Bloc 50 N°80 Sidi Othmane
CASA - Tél : 05 22 57 77 03

Docteur Rajae GUESSOUS
Médecine Générale
234 Av du Nil - Hay Essalama Casablanca
Tél: 06 22 37 05 72



ANTI-SPA®

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice pour avoir besoin de nouveau.

DENOMINATION
ANTI-SPA® 200 mg

COMPOSITION QUANTITATIVE

Mébénzépine (chlordiazépoxide) 200 mg
Excipients...q.s.p. u

FORME PHARMA

PRÉSENTATION :

Comprimé pelliculé dosé à 200 mg,
boîte de 30.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEU-
TIQUE :**

Antispasmodique musculotrope.

**DANS QUELS CAS UTILISER CE
MÉDICAMENT?**

Il est indiqué dans les douleurs spasmodiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.

ATTENTION !

**a) DANS QUELS CAS NE PAS
UTILISER CE MÉDICAMENT?**

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE

UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'un des constituants,
- chez l'enfant de moins de 6 ans (risque d'avaler "de travers").

**EN CAS DE DOUTE, IL EST
INDISPENSABLE DE DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.**

**b) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET
MISES EN GARDE SPÉCIALES :**

En raison de la présence de la lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

40,00

Anti-Spa® 200 mg
30 comprimés pelliculés
AMM N° 656/17/DMP/21/NRQ



6 118000 021780

OBTENUS SANS ORDONNANCE.

d) GROSSESSE – ALLAITEMENT :
Grossesse :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car

lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

En cas de grossesse ou de projet de grossesse, prévenir votre médecin.

Allaitements :

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaité.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL
CONVIENT AU COURS DE LA
GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT,
DE TOUJOURS PRÉVENIR VOTRE**



ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés

ALLOPURINOL

Veuillez lire
médicament

- Gardez cette boîte.
- Si vous avez acheté ce médicament ou à votre pharmacien, il est recommandé d'autres personnes qui ont des symptômes identiques.
- Si l'un des médicaments est indésirable non prescrit par votre pharmacien.

LOT 190407
EXPIRATION 03/2023
31.30

ZYLORIC 200 mg
Boîte de 28 comprimés
A.M.M. N° 62 DMP/21/NTT
SOTHEMA BOUSKOURA

Remboursable AMO



6 118000 022244

Que contient cette boîte ?

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC comprimé ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables événementiels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimé ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines. ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnies Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

ZYLORIC® 100 mg, 200 mg et 300 mg, comprimés ALLOPURINOL

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés. ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines.

ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAIRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissemens et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

Souffrez actuellement d'une crise de goutte.

Etes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.

Avez des problèmes de thyroïde.

avez particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, bâtements (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers l'apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

l'allopurinol et contactez immédiatement votre médecin.

• Si vous avez

passer

Autres

Informi

pourrié

• Aspir

• Théo

• Médi

• Vida

• Didal

• Antib

• Médici

• Médica

presseurs,

• Médicame

• Médicaments pour les

comme des IEC (inhibiteur

diurétiques pour éliminer

• Médicaments utilisés

warfarine

• Tout autre médicament

Veuillez avoir votre n

récemment pris tout au

sans ordonnance, y compris

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notable: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous avez une intolérance à certains sucrels, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé ?

VEillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après les repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée, le cas échéant.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

31,30

ZYLORIC 200 mg
bte de 28 comprimés
J.M. N° 62 0MP/21/UNIT
IOTHEM BOUSKOURA

Remboursable AMO



6 118000 022244



Gélule
Voie orale

Purcarb®

Extrait de séné - Extrait de rhubarbe - Charbon végétal

Deva
Pharmaceutique

COMPOSITION

Extrait sec de feuille de séné (cassia angustifolia) 95 mg, extrait sec de racine rhubarbe (extractum Rhei) 30 mg, charbon végétal activé 180 mg. Excipients qsp1 gélule.

PRESENTATIONS

Boite de 15 gélules

Boite de 30 gélules

PROPRIÉTÉS

Purcarb est un régulateur naturel de la fonction intestinale. Son action unique : adsorbe les gaz (réduit et soulage les sensations de gaz), améliore et régule le transit intestinal (effet laxatif); possède des propriétés désintoxiquantes. Cette action repose sur la synergie d'action de la combinaison de ses actifs naturels.

VOIE D'ADMINISTRATION - INDICATIONS ET POSOLOGIE

Voie orale

Posologie chez l'adulte en fonction des effets recherchés :

- Effet adsorbant (en cas de digestion difficile et ballonnements par formation de gaz intestinaux) : **1 à 3 gélules par jour**
- Effet régulateur du transit intestinal en favorisant la vidange du tube digestif (en cas de constipation) : **4 à 6 gélules par jour**

Avaler avec un grand verre d'eau en dehors des repas

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de santé n° DA 20171612034DMP/20UCAv1

IMPRIMEPEL 10/18

Deva
Pharmaceutique

146-147, Zone Industrielle T1 Mellè - Casablanca

Docteur Rajae GUESSOUS
Médecine Générale
234 Av du Nil - Hay Essalama Casablanca
Tél: 06 22 37 05 72

Bilan Biologique

Date: 19 AOUT 2019

Nom/Prénom: HANZA

Age:

Poids:

Hématologie

- NFS
- Plaquettes
- VS
- CRP
- Hémoculture

Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

Hémostase

- Temps de Prothrombine
- TCK
- Fibrinogène
- INR
- Plaquettes

Glucose

- Glycémie à jeun
- glycémie postprandiale
- Hémoglobine glycosylée
- Test O'Sullivan

Ionogramme sanguin

- Na+
- K+
- Cl-
- Ca++
- Phosphore
- Mg++
- Bicarbonates (HCO3-)
- Urée
- Créatinine
- Acide urique

Exploration d'anomalies lipidiques (EAL)

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

Fonction hépatique et enzymologie

- Amylasémie
- Bilirubine libre, conjuguée, totale
- Phosphatases acides
- Phosphatases alcalines
- Lactate Déshydrogénase LDH
- Transaminases ASAT, ALAT
- Gamma GT
- 5' Nucléotidase
- CPK (Créatine PhosphoKinase)
- Troponine
- Électrophorèse des protéines EPP
- G6PD

Ionogramme urinaire

- Ca++
- Phosphore
- Na+
- K+ **Docteur Rajae GUESSOUS**
Médecine Générale
234 Av du Nil - Hay Essalama Casablanca
Tél: 06 22 37 05 72
- Cl-
- Urée
- Créatinine

Examen des urines

- Protéinurie des 24 h
- ECBU
- Antibiogramme

Groupage sanguin

- ABO
- Rhésus
- Dosage des RAI

Sérologie et immunologie:

- VDRL
 - Quantitatif
 - Qualitatif
- TPHA
 - Quantitatif
 - Qualitatif
- Hépatite B
 - Antigène Hbs
 - Anticorps Anti-Hbs
 - Anticorps Anti-Hbc
 - Anticorps Anti-Hbe
- Hépatite C
 - Anticorps Anti-HVC
- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Rubéole
- β -hCG
 - Plasmatique
 - Urinaire
- Facteur Rhumatoïde : (Latex, Waaler Rose)
- Anticorps anti-nucléaires
- Anticorps anti-DNA natif
- ASLO
- Dosage du Complément

Bilan thyroidien

- T3, T4
- TSHs
- AC antithyroïdiens
- Iode sanguin

Autres :

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES

EXAMED

LABORATOIRE

S.A.R.L. au Capital de 100.000,00 Dhs - R.C. 121337 - Patente : 32740051 - Ident. Fiscal : 2821353 - ICE : 000079511000007
 Centre Médical Sidi-Othman, Av. 10 Mars, Place de la Préfecture, Sidi Othman - CASA - Tél. : 05 22 59 95 95 - Fax : 05 22 59 95 96

Taoufik LOUANJLI
 Pharmacien-Biologiste

N° 1908109

DIS Biologie Médicale
 Biologie de la Reproduction
 Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Nom/Prénom : **Madame HAMZA Zohra**

Casablanca le :10/08/2019

Medecin : **Dr Rajae GUESSOUS**

Analyses	Clé	Cotation
TRANSAMINASES ASAT (GOT)	B	40
TRANSAMINASES ALAT (GPT)	B	40
Acide Urique	B	20
TRIGLYCERIDES	B	50
CHOLESTEROL TOTAL	B	20
CREATININE	B	20
UREE	B	20
HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE	B	100
GLYCEMIE A JEUN	B	20
VITESSE DE SEDIMENTATION	B	15
Numeration Formule Sanguine	B	65
Montant en Dhs:		280.00

Arrêtée la présente facture à la somme de: Deux Cent Quatre-vingt Dirhams

Taoufik LOUANJLI
 Pharmacien-Biologiste
 Centre Médical Sidi Othman - CASA - Tél. : 05 22 59 95 95 - Fax : 05 22 59 95 96

Taoufik LOUANJLI
Pharmacien-Biologiste

DIS Biologie Médicale
Biologie de la Reproduction
Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Code Patient : 370466
Date du prélèvement : 10/08/19
Dossier édité le : 15/08/2019

Madame Zohra HAMZA
Référence : 100819 501
Dr. Rajae GUESSOUS

Page: 2/2

BIOCHIMIE

		Valeurs de référence	Antécédents
GLYCEMIE A JEUN : 1.35 ** ou : 7.49	g/l (0,70 à 1,10) mmol/l (3,88 à 6,12)	/
HEMOGLOBINE GLYQUEE (HbA1C) ... : 10.10 (Par Technique HPLC, Selon le DCCT/NGSP)		%	/
	-L'hémoglobine glyquée d'un sujet normal ou d'un diabétique équilibré se situe entre 4,2 et 6,5%. -L'hémoglobine glyquée d'un sujet diabétique non traité ou non équilibré est supérieure à 8,5%.		
UREE	: 0.38 ou : 6.31	g/L (0,10 à 0,50) mmol/L (1,70 à 7,60)	
CREATININE	: 10.6 ou : 93.3	mg/L (6,0 à 11,0) μmol/L (44 à 106)	
CHOLESTEROL TOTAL	: 1.94 ou : 5.01	g/L (1,40 à 2,20) mmol/L (3,61 à 5,68)	
TRIGLYCERIDES	: 1.17 ou : 1.33	g/l (< à 1,50) mmol/l (< à 1,72)	/
ACIDE URIQUE	: 83 ** ou : 494	mg/L (26 à 60) μmol/L (142 à 416)	/
TRANSAMINASES ALAT (GPT) ... : 12		UI/L (<50)	
TRANSAMINASES ASAT (GOT) ... : 14		UI/L (<40)	

EXAMED
LABORATOIRE
Taoufik LOUANJLI
Pharmacien - Biologiste
Centre Médical Sidi Othman, Av. 10 Mars
Place de la Préfecture - Sidi Othmane - Casablanca
Tel. : 05 22 59 95 95 - Fax : 05 22 59 95 96

Biologiste

Taoufik LOUANJLI
Pharmacien-Biologiste

DIS Biologie Médicale
Biologie de la Reproduction
Ancien Interne des Hôpitaux de Bordeaux.

Code Patient : 370466
Date du prélèvement : 10/08/19
Dossier édité le : 15/08/2019

Madame Zohra HAMZA
Référence : 100819 501
Dr. Rajae GUESSOUS

Page: 1/2

HEMATOLOGIE

Valeurs de référence

Antécédents

HEMOGRAMME

SYSMEK XT-2000i

GLOBULES ROUGES	: 5.27	M/mm3	(4,0 à 5,3)
HEMOGLOBINE	: 12.3	g/dL	(12 à 16)
HEMATOCRITE	: 38	%	(37 à 46)
V.G.M	: 72	u3	(80 à 95)
T.C.M.H	: 23	pg	(28 à 32)
C.C.M.H	: 32	g/dL	(30 à 35)
GLOBULES BLANCS	: 13 080 /mm3		(4 000 à 10 000)

✓

FORMULE LEUCOCYTAIRE :

POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES	: 56	%	(40 à 75)
Soit	: 7 325	/mm3	(2000 à 7500)
LYMPHOCYTES	: 36	%	(20 à 45)
Soit	: 4 709	/mm3	(1500 à 4000)
MONOCYTES	: 7	%	(3 à 11)
Soit	: 916	/mm3	(120 à 1100)
POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES	: 1	%	(0 à 4)
Soit	: 131	/mm3	(40 à 300)
POLYNUCLEAIRES BASOPHILES	: 0	%	(0 à 1)
Soit	: 0	/mm3	(0 à 100)
PLAQUETTES	: 331 000		(150 000 à 400 000)

COMMENTAIRES :

La formule leucocytaire est contrôlée sur frottis sanguin.

VITESSE DE SEDIMENTATION

1 ère heure .. : 26 mm ($<(\text{âge}+10)/2$)
2 ème heure .. : 30 mm

EXAMED
LABORATOIRE
Taoufik LOUANJLI
Pharmacien Biologiste
Centre Medical Sidi-Othman, Av. 10 Mars
Place de la Préfecture - Sidi Othmane Casablanca
Tel. : 05 22 59 95 95 Fax : 05 22 59 95 96

Biologiste