

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Prothèse :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com  
Prise en charge : pec@mupras.com  
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge  
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° P19-0038721

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 02383 Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : IJAHED I Mohammed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

### VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° P19-038721

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.  
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :



# Conditions Générales

## POUR LE PRATICIEN

L'acte médical est désigné par l'une des mentions suivantes :

- = Consultation au Cabinet du médecin omnipraticien
- = Consultation au Cabinet par le médecin spécialiste ou qualifié (autre que le médecin neuro-psychiatre)
- = Consultation au Cabinet par le neuro-psychiatre
- = Visite de jour au domicile du malade par le médecin
- = Visite de nuit au domicile du malade par le médecin
- = Visite du dimanche par le médecin au domicile du malade
- = Visite de jour au domicile du malade par un spécialiste qualifié
- = Acte de pratique médicale couvrant et de petite chirurgie
- = Actes de chirurgie et de spécialistes

- SF = Actes pratiqués par la sage Femme et relevant de sa compétence
- SFI = Soins infirmiers pratiqués par la sage femme
- AMM = Actes pratiqués par le masseur ou le kinésithérapeute
- AMI = Actes pratiqués par l'infirmier ou l'infirmière
- AP = Actes pratiqués par un orthophoniste
- AMY = Actes pratiqués par un aide-orthophoniste
- R-Z = Electro-Radiologie
- B = Analyses

## POUR L'ADHERENT

La mutuelle ne participe aux frais résultant de certains actes que si après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge.

Pour les actes soumis à cette formalité, le malade est tenu, avant l'exécution de ces actes d'adresser au service de la mutuelle une demande d'entente préalable remplie et signée par son médecin traitant.

Ce bulletin doit mentionner les raisons pour lesquelles l'application de tel acte ou tel traitement est proposé pour permettre au médecin contrôleur de donner son accord au de présenter ses observations.

Ce bulletin d'entente préalable peut être demandé auprès du service Mutuelle, il sera remis sous pli confidentiel au médecin contrôleur dûment rempli par le médecin traitant.

## LES ACTES SOUMIS A ACCORD PREALABLE

HOSPITALISATION EN CLINIQUE  
HOSPITALISATION EN HOPITAL  
HOSPITALISATION EN SANATORIUM OU  
VENTORIUM  
HOSPITALISATION EN MAISON DE REPOS  
ACTES EFFECTUES EN SERIE, il s'agit  
des répétées en plusieurs séances. ou actes  
aux comportant un ou plusieurs échelons  
le temps.

- LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES
- L'ORTHOPEDIE
- LA REEDUCATION
- LES ACCOUCHEMENTS
- LES CURES THERMALES
- LA CIRCONCISION
- LE TRANSPORT EN AMBULANCE

## EN CAS D'URGENCE

En cas d'urgence échappant à la procédure d'entente préalable, l'intéressé doit venir dans les 24 heures le Service Mutuelle qui donnera ou non son accord

Cette feuille complétée par le praticien, à l'occasion de chaque visite ou l'exécution de chaque ordonnance médicale ne doit être utilisée que pour un seul malade



# MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

DATE DE DEPOT

AEROPORT CASA ANFA  
CASABLANCA  
TEL : 05 22 91 26 46 / 2648 / 2857 / 2883  
FAX / 05 22 91 26 52  
TELEX : 3998 MUT  
E-mail : mupras@RoyalAirMaroc

## FEUILLE DE SOINS

N° 834641

### A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom & Prénom : MIAHED Mohamed  
Matricule : 2383 Fonction : retiré Poste :   
Adresse : Ville 107 Casablanca AS ANFA  
Tél. : 0648119934 Signature Adhérent :

### A REMPLIR PAR LE MEDECIN TRAITANT

Nom & Prénom du patient : MIAHED Mohamed Age : 45  
Lien de parenté avec l'adhérent : Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant ☐  
Date de la première visite du médecin : 12/09/19  
Nature de la maladie : ATA  
S'il s'agit d'un accident : causes et circonstances :   
Signature et cachet du médecin : Dr. TAJAOUI ABDERRAHIM  
2 Bd Mohammed V, Casablanca  
05 22 33 12 23  
05 22 33 12 23  
Durée d'utilisation 3 mois



## RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et Signature du Medecin attestant le paiement des Actes
12.09.19	3 + 267	1	300	Dr. TAHAOUI ABDELRAHIM CARDIOLOGUE 2 Bd Mohamed 5 MOHAMED 05 23 31 23 25 01 12 27 76

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE AL KAYTAR RÉS. ATLANTIC Bld MANSOURIA Tél. 06 23 33 09 03	12/09/19	103 1,10

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et Signature du Laboratoire et du Radiologie	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et Signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Important : Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																
				COEFFICIENT DES TRAVAUX															
				MONTANT DES SOINS															
				DEBUT D'EXECUTION															
				FIN D'EXECUTION															
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																		
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td></td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D 00000000</td> <td></td> <td>00000000 G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td></td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>B</td> <td>11433553</td> </tr> </table>				H		25533412		21433552	D 00000000		00000000 G	00000000		00000000	35533411	B	11433553	COEFFICIENT DES TRAVAUX
		H																	
	25533412		21433552																
	D 00000000		00000000 G																
	00000000		00000000																
	35533411	B	11433553																
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANT DES SOINS															
				DATE DU DEVIS															
				DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT





**DIPREZAR®**  
Losartan 50 mg +  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 041558

PPV 1260 H00  
PER 02/22  
LOT 1425



#### Classe pharmacothérapeutique :

DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

#### Indications thérapeutiques :

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

#### Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

#### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de un comprimé de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé une fois par jour pour contrôler votre pression artérielle sur une période de 24 heures. Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou changée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé (un dosage plus important). La dose maximum par jour est de 2 comprimés par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

#### Contre-indications :

- Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin,
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'1 patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés :

#### Fréquents

- Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus,
- Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion,

**DIPREZAR®**  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé. Boîte de 30

consultez cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Qu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être utile non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

50 mg  
12,5 mg

aliskiren, carmésilol sodique type A, povidone, opadry 2022730 (Yellow) par

- Douleurs musculaires ou crampes, douleur dans la jambe, douleur dorsale,
- Insomnie, maux de tête, étourdissements,
- Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques,
- Augmentation des taux de potassium (pouvant entraîner un rythme cardiaque anormal),
- Modification de la fonction rénale incluant insuffisance rénale,
- Trop peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

#### Peu fréquents

- Anémie, boutons rouges ou marbrés sur la peau (parfois particulièrement autour des articulations, gonflement des mains et des pieds, et douleurs à l'estomac),
- nombre de plaquettes,
- Perte d'appétit, augmentation du taux d'acide urique et crises de goutte, le sang,
- Anxiété, nervosité, troubles paniques (attaques de panique récurrentes), de la mémoire,
- Picotements ou sensations similaires, douleurs dans les extrémités, tremblements,
- Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, ou
- Tintements, bourdonnements, grandement ou chuchets dans les oreilles,
- Pression sanguine basse qui peut être associée à des changements posturaux (douleur thoracique), battements du cœur anormaux, accident vasculaire cérébral,
- Inflammation des vaisseaux sanguins qui est souvent associée à une éruption cutanée, congestion,
- Mal de gorge, essoufflement, bronchite, pneumonie, toux dans les poumons,
- Constipation, constipation opiniâtre, flatulences, troubles gastro-intestinaux, des glandes salivaires, mal de dents,
- Jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), inflammation du pancréas,
- Urticaire, démangeaisons, inflammation de la peau, éruption cutanée, rougeur, transpiration, perte de cheveux,
- Douleur dans les bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations,
- Mictions fréquentes y compris la nuit, anomalies de la fonction rénale, des urines,
- Diminution de l'appétit sexuel, impuissance,
- Gonflement du visage, gonflement localisé (œdème), fièvre.

#### Rare

Hépatite (inflammation du foie), anomalies des tests de la fonction hépatique.

#### Fréquence indéterminée

- Symptômes pseudo-grippaux,
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines noires (couleur du thé),
- Taux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Sensation de mal-être général (malaise).

#### Mises en garde spéciales et Précautions particulières

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse.

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue.

Si vous prenez des diurétiques,

Si vous faites un régime sans sel,

Si vous avez ou avez eu des vomissements,

Si vous avez une insuffisance cardiaque,

Si votre fonction hépatique est altérée,

Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose),

Si vous avez une transplantation rénale,

Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine,

Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves),

Si vous avez un épaississement du muscle cardiaque,

Si vous êtes diabétique,

Si vous avez de la goutte,

Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie des sinus,

Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel,

Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale à l'avance.

Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à des glandes surrénales),

Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doit pas être donné aux enfants.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé contient du Mannitol.

#### Interactions :

#### Prise d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre :

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doivent pas être pris simultanément.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément.





**DIPREZAR®**  
Losartan 50 mg +  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

30 comprimés pelliculés



PPV 1260 H00  
PER 02/22  
LOT 1425

**DIPREZAR®**  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé. Boîte de 30

Prenez cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Si vous avez d'autres symptômes, cela pourrait lui  
aider à diagnostiquer votre problème. Si vous avez un symptôme non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

50 mg

12,5 mg

hydrochlorothiazide, croscarmellose sodique type A, povidone, opadry 2022730 (Yellow) par

Cellulose  
comprimé pelliculé.  
Liste des excipients à effet notoire :  
Mannitol.

#### Classe pharmacothérapeutique :

DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

#### Indications thérapeutiques :

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

#### Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

#### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de un comprimé de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé une fois par jour pour contrôler votre pression artérielle sur une période de 24 heures. Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou changée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé (un dosage plus important). La dose maximum par jour est de 2 comprimés par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

#### Contre-indications :

- Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin,
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous avez une faible teneur de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés :

#### Fréquents

- Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus,
- Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion,

- Douleurs musculaires ou crampes, douleur dans la jambe, douleur dorsale,
- Insomnie, maux de tête, étourdissements,
- Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques,
- Augmentation des taux de potassium (pouvant entraîner un rythme cardiaque anormal),
- Modification de la fonction rénale incluant insuffisance rénale,
- Trou ou peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

#### Peu fréquents

- Anémie, boutons rouges ou marbrés sur la peau (parfois particulièrement autour des articulations, gonflement des mains et des pieds, et douleurs à l'estomac),
- Nombre de plaquettes,
- Perte d'appétit, augmentation du taux d'acide urique et crises de goutte, le sang,
- Anxiété, nervosité, troubles paniques (attaques de panique récurrentes),
- de la mémoire,
- Picotements ou sensations similaires, douleurs dans les extrémités, tremblements,
- Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, ou
- Tintements, bourdonnements, grandement ou chuchets dans les oreilles,
- Pression sanguine basse qui peut être associée à des changements posturaux (douleur thoracique), battements du cœur anormaux, accident vasculaire cérébral,
- palpitations,
- Inflammation des vaisseaux sanguins qui est souvent associée à une éruption cutanée, congestion,
- Mal de gorge, essoufflement, bronchite, pneumonie, toux dans les poumons,
- glandes salivaires, mal de dents,
- Jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), inflammation du pancréas,
- Urticaire, démangeaisons, inflammation de la peau, éruption cutanée, rougeur,
- transpiration, perte de cheveux,
- Douleur dans les bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations,
- Mictions fréquentes y compris la nuit, anomalies de la fonction rénale, des urines,
- Diminution de l'appétit sexuel, impuissance,
- Gonflement du visage, gonflement localisé (œdème), fièvre.

#### Rare

- Hépatite (inflammation du foie), anomalies des tests de la fonction hépatique.

#### Fréquence indéterminée

- Symptômes pseudo-grippaux,
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines noires (couleur du thé),
- Toux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Sensation de mal-être général (malaise).

#### Mises en garde spéciales et Précautions particulières

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte ou si vous êtes allaitante.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte, il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

Il est important de prévenir un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue.

Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue, ne prenez pas DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

Si vous prenez des diurétiques, Si vous faites un régime sans sel, Si vous avez ou avez eu des vomissements, Si vous avez une insuffisance cardiaque, Si votre fonction hépatique est altérée, Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose),

Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine, Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves), Si vous avez un épaississement du muscle cardiaque, Si vous êtes diabétique, Si vous avez de la goutte, Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie des sinus, Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un traitement par dialyse, Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale à l'avance.

Si vous avez une hyperaldostérémie primaire (un syndrome associé à des glandes surrénales), Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé chez les enfants et les adolescents.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé contient du Mannitol.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec DIPREZAR®.

#### Interactions :

##### Prise d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou prévoyez prendre d'autres médicaments.

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doivent pas être pris simultanément avec des médicaments contenant du lithium.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas être prises simultanément avec DIPREZAR®.

**DIPREZAR®**  
Losartan 50 mg +  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

30 comprimés pelliculés



PPV 1260 H00  
PER 02/22  
LOT 1425

**DIPREZAR®**  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé. Boîte de 30

Prenez cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Si vous avez d'autres symptômes, cela pourrait lui  
aider à diagnostiquer votre problème. Si vous avez un symptôme non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

50 mg

12,5 mg

hydrochlorothiazide, croscarmellose sodique type A, povidone, opadry 2022730 (Yellow) par

Cellulose  
comprimé pelliculé.  
Liste des excipients à effet notoire :  
Mannitol.

#### Classe pharmacothérapeutique :

DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

#### Indications thérapeutiques :

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

#### Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

#### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de un comprimé de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé une fois par jour pour contrôler votre pression artérielle sur une période de 24 heures. Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou changée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé (un dosage plus important). La dose maximum par jour est de 2 comprimés par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

#### Contre-indications :

- Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamide (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin,
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous avez une faible teneur de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés :

#### Fréquents

- Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus,
- Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion,

- Douleurs musculaires ou crampes, douleur dans la jambe, douleur dorsale,
- Insomnie, maux de tête, étourdissements,
- Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques,
- Augmentation des taux de potassium (pouvant entraîner un rythme cardiaque anormal),
- Modification de la fonction rénale incluant insuffisance rénale,
- Trou ou peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

#### Peu fréquents

- Anémie, boutons rouges ou marbrés sur la peau (parfois particulièrement autour des articulations, gonflement des mains et des pieds, et douleurs à l'estomac),
- nombre de plaquettes,
- Perte d'appétit, augmentation du taux d'acide urique et crises de goutte, le sang,
- Anxiété, nervosité, troubles paniques (attaques de panique récurrentes), de la mémoire,
- Picotements ou sensations similaires, douleurs dans les extrémités, tremblements,
- Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, ou
- Tintements, bourdonnements, grandement ou chuchets dans les oreilles,
- Pression sanguine basse qui peut être associée à des changements posturaux (douleur thoracique), battements du cœur anormaux, accident vasculaire cérébral,
- Inflammation des vaisseaux sanguins qui est souvent associée à une éruption cutanée, congestion,
- Mal de gorge, essoufflement, bronchite, pneumonie, toux dans les poumons,
- Constipation, constipation opiniâtre, flatulences, troubles gastro-intestinaux, problèmes des glandes salivaires, mal de dents,
- Jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), inflammation du pancréas,
- Urticaire, démangeaisons, inflammation de la peau, éruption cutanée, rougeur, transpiration, perte de cheveux,
- Douleur dans les bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations,
- Mictions fréquentes y compris la nuit, anomalies de la fonction rénale, des urines,
- Diminution de l'appétit sexuel, impuissance,
- Gonflement du visage, gonflement localisé (œdème), fièvre.

#### Rare

- Hépatite (inflammation du foie), anomalies des tests de la fonction hépatique.

#### Fréquence indéterminée

- Symptômes pseudo-grippaux,
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines noires (couleur du thé),
- Toux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Sensation de mal-être général (malaise).

#### Mises en garde spéciales et Précautions particulières

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte ou si vous êtes allaitante.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte, il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction hépatique est altérée,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose),
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine,
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves),
- Si vous avez un épaississement du muscle cardiaque,
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie des bronches (asthme chronique),
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un traitement pour l'un de ces problèmes,
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale à l'avance.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à des glandes surrénales).

Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doit pas être donné aux enfants.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé contient du Mannitol.

#### Interactions :

##### Prise d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre d'autres médicaments. Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doivent pas être pris simultanément avec des médicaments contenant du lithium.



**DIPREZAR®**

Losartan 50 mg +

Hydrochlorothiazide 12,5 mg

30 comprimés pelliculés

6 118000 041558

PPV 1260 H00

PER 02/22

LOT 1425

Cellulose

comprimé pelliculé

Liste des excipients à effet notoire :

Mannitol.

**DIPREZAR®**  
Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé. Boîte de 30

cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

qu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui

able non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

50 mg

12,5 mg

magnésium, croscarmellose sodique type A, povidone, opadry 2022730 (Yellow) par

**Classe pharmacothérapeutique :**

DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

**Indications thérapeutiques :**

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

**Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration :**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

**Hypertension**

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de un comprimé de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé une fois par jour pour contrôler votre pression artérielle sur une période de 24 heures. Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou changée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé (un dosage plus important). La dose maximum par jour est de 2 comprimés par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

**Contre-indications :**

- Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin),
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous avez une faible teneur de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

**Effets Indésirables :**

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés :

**Fréquents**

- Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus,
- Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion,

- Douleurs musculaires ou crampes, douleur dans la jambe, douleur dorsale,
- Insomnie, maux de tête, étourdissements,
- Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques,
- Augmentation des taux de potassium (pouvant entraîner un rythme cardiaque anormal),
- Modification de la fonction rénale incluant insuffisance rénale,
- Trou ou peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

**Peu fréquents**

- Anémie, boutons rouges ou marbrés sur la peau (parfois particulièrement articulations, gonflement des mains et des pieds, et douleurs à l'estomac),
- nombre de plaquettes,
- Perte d'appétit, augmentation du taux d'acide urique et crises de goutte, le sang,
- Anxiété, nervosité, troubles paniques (attaques de panique récurrentes) de la mémoire,
- Picotements ou sensations similaires, douleurs dans les extrémités, tremblements,
- Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, ou
- Tintements, bourdonnements, grandement ou chuchets dans les oreilles,
- Pression sanguine basse qui peut être associée à des changements posturaux (douleur thoracique), battements du cœur anormaux, accident vasculaire cérébral,
- Inflammation des vaisseaux sanguins qui est souvent associée à une éruption cutanée, congestion,
- Mal de gorge, essoufflement, bronchite, pneumonie, toux dans les poumons,
- Constipation, constipation opiniâtre, flatulences, troubles gastro-intestinaux, problèmes des glandes salivaires, mal de dents,
- Jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), inflammation du pancréas,
- Urticaire, démangeaisons, inflammation de la peau, éruption cutanée, rougeurs,
- transpiration, perte de cheveux,
- Douleur dans les bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations,
- Mictions fréquentes y compris la nuit, anomalies de la fonction rénale, des urines,
- Diminution de l'appétit sexuel, impuissance,
- Gonflement du visage, gonflement localisé (œdème), fièvre.

**Rare**

Hépatite (inflammation du foie), anomalies des tests de la fonction hépatique.

**Fréquence indéterminée**

- Symptômes pseudo-grippaux,
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines noires (couleur du thé),
- Toux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Sensation de mal-être général (malaise).

**Mises en garde spéciales et Précautions particulières**

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte ou si vous êtes allaitante (ou susceptible de le devenir).

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez d'être enceinte, il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction hépatique est altérée,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose),
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine,
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves cardiaques),
- Si vous avez un épaississement du muscle cardiaque,
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie des reins,
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel,
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale à l'avance.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à des glandes surrénales),
- Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

**Enfants et adolescents**

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doit pas être donné aux enfants.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé contient du Mannitol.

**Interactions :****Prise d'autres médicaments :**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre d'autres médicaments. Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doivent pas être pris simultanément.

**DIPREZAR®**

Losartan 50 mg +

Hydrochlorothiazide 12,5 mg

30 comprimés pelliculés

6 118000 041558

PPV 1260 H00

PER 02/22

LOT 1425

Cellulose

comprimé pelliculé

Liste des excipients à effet notoire :

Mannitol.

**DIPREZAR®**  
Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé. Boîte de 30

cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Qu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui

n'est pas mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

50 mg

12,5 mg

magnésium, croscarmellose sodique type A, povidone, opadry 2022730 (Yellow) par

**Classe pharmacothérapeutique :**

DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

**Indications thérapeutiques :**

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

**Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration :**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

**Hypertension**

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de un comprimé de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé une fois par jour pour contrôler votre pression artérielle sur une période de 24 heures. Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou changée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé (un dosage plus important). La dose maximum par jour est de 2 comprimés par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

**Contre-indications :**

- Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin),
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

**Effets Indésirables :**

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés :

**Fréquents**

- Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus,
- Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion,

- Douleurs musculaires ou crampes, douleur dans la jambe, douleur dorsale,
- Insomnie, maux de tête, étourdissements,
- Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques,
- Augmentation des taux de potassium (pouvant entraîner un rythme cardiaque anormal),
- Modification de la fonction rénale incluant insuffisance rénale,
- Trou ou peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

**Peu fréquents**

- Anémie, boutons rouges ou marbrés sur la peau (parfois particulièrement articulations, gonflement des mains et des pieds, et douleurs à l'estomac),
- nombre de plaquettes,
- Perte d'appétit, augmentation du taux d'acide urique et crises de goutte, le sang,
- Anxiété, nervosité, troubles paniques (attaques de panique récurrentes), de la mémoire,
- Picotements ou sensations similaires, douleurs dans les extrémités, tremblements,
- Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, ou
- Tintements, bourdonnements, grandement ou chuchets dans les oreilles,
- Pression sanguine basse qui peut être associée à des changements posturaux (douleur thoracique), battements du cœur anormaux, accident vasculaire cérébral,
- polypéptites,
- Inflammation des vaisseaux sanguins qui est souvent associée à une éruption cutanée, congestion,
- Mal de gorge, essoufflement, bronchite, pneumonie, toux dans les poumons,
- glandes salivaires, mal de dents,
- Jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), inflammation du pancréas,
- Urticaire, démangeaisons, inflammation de la peau, éruption cutanée, rougeur,
- transpiration, perte de cheveux,
- Douleur dans les bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations,
- Mictions fréquentes y compris la nuit, anomalies de la fonction rénale, des urines,
- Diminution de l'appétit sexuel, impuissance,
- Gonflement du visage, gonflement localisé (œdème), fièvre.

**Rare**

Hépatite (inflammation du foie), anomalies des tests de la fonction hépatique.

**Fréquence indéterminée**

- Symptômes pseudo-grippeux,
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines noires (couleur du thé),
- Toux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Sensation de mal-être général (malaise).

**Mises en garde spéciales et Précautions particulières**

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse.

Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction hépatique est altérée,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose),
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine,
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves),
- Si vous avez un épaississement du muscle cardiaque,
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie des sinus,
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel,
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale à l'avance.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à des glandes surrénales),
- Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

**Enfants et adolescents**

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doit pas être donné aux enfants.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé contient du Mannitol.

**Interactions :****Prise d'autres médicaments :**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre :

Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doivent pas être pris simultanément.





**DIPREZAR®**  
Losartan 50 mg +  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 041558

PPV 1260 H00  
PER 02/22  
LOT 1425



**DIPREZAR®**  
hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé. Boîte de 30

Prenez cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
Si vous avez d'autres symptômes, cela pourrait lui  
aider à diagnostiquer votre problème.

Si vous ne mentionnez pas dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre

50 mg  
12,5 mg

hydrochlorure de sodium type A, povidone, opadry 2022730 (Yellow) par

Cellulose  
comprimé pelliculé.  
Liste des excipients à effet notoire :  
Mannitol.

#### Classe pharmacothérapeutique :

DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de la paroi des vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs entraînant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sels. Ceci contribue également à réduire la pression artérielle.

#### Indications thérapeutiques :

DIPREZAR® est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

#### Posologie, Mode et voie(s) d'administration, Durée du traitement et Fréquence d'administration :

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de doute. Votre médecin décidera de la posologie appropriée de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en fonction de votre état et si vous prenez d'autres médicaments. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé aussi longtemps que votre médecin vous le prescrit, cela permettra un contrôle régulier de votre pression sanguine. Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

#### Hypertension

La posologie habituelle pour la plupart des patients hypertendus est de un comprimé de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé une fois par jour pour contrôler votre pression artérielle sur une période de 24 heures. Cette dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou changée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé (un dosage plus important). La dose maximum par jour est de 2 comprimés par jour de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR® FORT 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

#### Contre-indications :

- Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé :
- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament,
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamides (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antibiotiques tels que le cotrimoxazole) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin,
- Si votre fonction hépatique est gravement dégradée,
- Si vous avez une faible teneur de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement,
- Si vous souffrez de goutte,
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé en début de grossesse - Voir rubrique "Grossesse").
- Si votre fonction rénale est gravement dégradée ou si vos reins ne produisent plus d'urine,
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous ressentez l'effet suivant, arrêtez de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé et informez immédiatement votre médecin ou allez aux urgences de l'hôpital le plus proche :

- Une réaction allergique grave (éruption cutanée, démangeaisons, gonflement du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à avaler ou à respirer). C'est un effet secondaire grave mais rare qui peut affecter plus d'un patient sur 1 000. Vous pouvez avoir besoin de soins médicaux en urgence ou d'une hospitalisation.

Les effets indésirables ci-dessous ont été rapportés :

#### Fréquents

- Toux, infection des voies respiratoires supérieures, congestion du nez, sinusite, problèmes de sinus,
- Diarrhée, douleur abdominale, nausées, indigestion,

- Douleurs musculaires ou crampes, douleur dans la jambe, douleur dorsale,
- Insomnie, maux de tête, étourdissements,
- Faiblesse, fatigue, douleurs thoraciques,
- Augmentation des taux de potassium (pouvant entraîner un rythme cardiaque anormal),
- Modification de la fonction rénale incluant insuffisance rénale,
- Trou ou peu de sucre dans le sang (hypoglycémie).

#### Peu fréquents

- Anémie, boutons rouges ou marbrés sur la peau (parfois particulièrement autour des articulations, gonflement des mains et des pieds, et douleurs à l'estomac),
- Nombre de plaquettes,
- Perte d'appétit, augmentation du taux d'acide urique et crises de goutte, le sang,
- Anxiété, nervosité, troubles paniques (attaques de panique récurrentes),
- de la mémoire,
- Picotements ou sensations similaires, douleurs dans les extrémités, tremblements,
- Vision trouble, sensation de brûlure ou de picotement dans les yeux, ou
- Tintements, bourdonnements, grandement ou chuchotés dans les oreilles,
- Pression sanguine basse qui peut être associée à des changements posturaux (douleur thoracique), battements du cœur anormaux, accident vasculaire cérébral,
- palpitations,
- Inflammation des vaisseaux sanguins qui est souvent associée à une éruption cutanée, congestion,
- Mal de gorge, essoufflement, bronchite, pneumonie, toux dans les poumons,
- glandes salivaires, mal de dents,
- Jaunisse (jaunissement des yeux et de la peau), inflammation du pancréas,
- Urticaire, démangeaisons, inflammation de la peau, éruption cutanée, rougeur,
- transpiration, perte de cheveux,
- Douleur dans les bras, les épaules, les hanches, les genoux ou autres articulations,
- Mictions fréquentes y compris la nuit, anomalies de la fonction rénale, des urines,
- Diminution de l'appétit sexuel, impuissance,
- Gonflement du visage, gonflement localisé (œdème), fièvre.

#### Rare

Hépatite (inflammation du foie), anomalies des tests de la fonction hépatique.

#### Fréquence indéterminée

- Symptômes pseudo-grippaux,
- Douleur musculaire inexpliquée avec des urines noires (couleur du thé),
- Toux bas de sodium dans le sang (hyponatrémie),
- Sensation de mal-être général (malaise).

#### Mises en garde spéciales et Précautions particulières

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte ou si vous êtes allaitante (ou susceptible de l'être).

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé est déconseillé en début de grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le faire, consultez votre médecin. Il est important de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé.

- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
- Si vous prenez des diurétiques,
- Si vous faites un régime sans sel,
- Si vous avez ou avez eu des vomissements,
- Si vous avez une insuffisance cardiaque,
- Si votre fonction hépatique est altérée,
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose),
- Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine,
- Si vous avez une sténose des valves aortique ou mitrale (rétrécissement des valves),
- Si vous avez un épaississement du muscle cardiaque,
- Si vous êtes diabétique,
- Si vous avez de la goutte,
- Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie des sinus (rhinite chronique),
- Si vous avez un taux élevé de calcium ou bas de potassium, ou si vous suivez un régime sans sel,
- Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale, vous devez informer votre médecin ou l'équipe médicale à l'avance.
- Si vous avez une hyperaldostéronémie primaire (un syndrome associé à des glandes surrénales),
- Si vous prenez un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'aliskiren.

#### Enfants et adolescents

Il n'y a pas de données sur l'utilisation de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doit pas être donné aux enfants. DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé contient du Mannitol.

#### Interactions :

##### Prise d'autres médicaments :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pouvez prendre d'autres médicaments. Les diurétiques tels que l'hydrochlorothiazide contenu dans DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé ne doivent pas être pris simultanément avec des médicaments contenant du lithium.



UT. AV :

P.P.V

LOT N° :

via®



23,10

primés.

Lysanxia

0 mg

40 comprimés



6 118000 250289

stéarate de magnésium, silice colloïdale, q.s.p.

Prac.  
Excipients  
un comprimé  
LYSANXIA

Pour 1 ml =  
Excipients: p  
patenté V.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE (TYPE D'ACTIVITE) :**

Benzodiazépine (anxiolytique)  
(N: système nerveux central)

**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES) :**

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.  
**ATTENTION !**

**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS) :**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

- insuffisance respiratoire grave,
- insuffisance hépatique grave,
- syndrome d'apnée du sommeil (pauses respiratoires durant le sommeil),
- allergie connue à cette classe de produits.

Il ne doit pas être utilisé, sauf avis contraire du médecin, en cas de myasthénie ou d'allaitement.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**MISES EN GARDE SPECIALES :**

Ne JAMAIS arrêter BRUTALEMENT ce traitement, en raison du risque d'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de symptômes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires mais on peut observer également de l'agitation, une irritabilité, des migraines, sensibilité anormale au bruit ou à la lumière, etc...

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire. La réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété, insomnie) qui avaient justifié la mise en route du traitement. Ce médicament peut être à l'origine des troubles de la mémoire. Ceux-ci surviennent le plus souvent dans les heures qui suivent la prise du produit.

Chez certains sujets, en particulier l'enfant et la personne âgée, ce médicament peut entraîner des effets contraires aux effets recherchés:

- aggravation de l'insomnie, cauchemars,
- nervosité, irritabilité, agitation, agressivité, accès de colère,
- idées délirantes, hallucinations, troubles du comportement.

Dans ce cas, vous devez interrompre le traitement et consulter votre médecin.

**LYSANXIA® gouttes :**

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

**LYSANXIA® comprimé :**

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares). Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (rubrique posologie).

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé, notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.

Un contrôle régulier par votre médecin est nécessaire, notamment du fait du risque de survenue d'idées suicidaires.

La prise d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

10mm/mV 25mm/s

Filtre Principal: On Filtre ADS: On



Fréquence :	1000 Hz	Intervalle QT :	394 ms
Durée Echantillon :	7 s	Intervalle QTc :	413 ms
FC :	66 bpm	Axe P :	35.9°
Durée P :	157 ms	Axe QRS :	-33.8°
Durée QRS :	90 ms	Axe T :	46.8°
Durée T :	274 ms	RV5/SV1:	0.55/0.24mV
PQ Interval :	234 ms	RV5+SV1:	0.78mV

Suggestion :

**Dr. TAJAOUI ABDERRAHIM**  
**CARDIOLOGUE**  
 2 Bd. Mohammed V  
 05 23 31 23 23  
 091132779

Signature Médecin: