



Casablanca, le

26. 8. 13

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
M.TAHIRI HASSANI
10 Ave. Afghanistan
Hay Hassani - Casablanca
Tél.: 0522 90 32 63 - Fax: 0522 90 46 04

ORDONNANCE

Medicament : Ratiopharm

1/1000 mg

10 ml forte

20ml

Ratiopharm

1/1000 mg

en sachet de

of

89.50

100 x 21; x 2

149.50

periode 100 x 21 j.

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
M.TAHIRI HASSANI
10 Ave. Afghanistan
Hay Hassani - Casablanca
Tél.: 0522 90 32 63 - Fax: 0522 90 46 04

89.00 21 x 1
89.00 21 x 1

100 x 21 j.

sp. Juros
100 x 21 j.

89.00

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
M.TAHIRI HASSANI
10 Ave. Afghanistan
Hay Hassani - Casablanca
Tél.: 0522 90 32 63 - Fax: 0522 90 46 04

21

Ketue

REVEAL SARL
PHARMACIE CHIFA
M.TAHIRI HASSANI
10 Ave. Afghanistan
Hay Hassani - Casablanca
Tél.: 0522 90 32 63 - Fax: 0522 90 46 04

x 21 j.

PROPRIETES :

Curarti forte contribue à la mobilité et au confort articulaires tout en limitant l'usure du cartilage.

UTILISATIONS :

Phase d'attaque : 1 comprimé 2 fois par jour.

Phase d'entretien : 1 comprimé par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Respecter la dose journalière conseillée.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

À conserver au sec et à l'abri de la lumière.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

8 435100 800892



Autorisation Ministère de la santé n° : DA20161406132DMP/20UCAMA/v2

Autorisation sanitaire ONSSA N° : ES.5.229.16

Fabriqué par PLAMECA - Espagne.

Importé et distribué au Maroc par MEDIPRO Pharma.

PPC : 149,50 DH

Lot :

À consommer de
préférence avant le :

CURARTI forte®
comprimé

035024
03/2022

CURARTI forte

Comprimé
Voie orale



FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

PPC : 149,50 DH

Lot :

À consommer de
préférence avant le :

CURARTI forte®
comprimé

035024
03/2022

CURARTI forte

Comprimé
Voie orale



FORME ET PRÉSENTATION :

Comprimé, boîtes de 15 et de 30.

COMPOSITION (par comprimé) :

Agents de charge (cellulose, phosphate de calcium), Complexe beta-cyclodextrine (humectant) et curcumine (extrait de rhizomes de Curcuma -Curcuma longa - standardisé), Acide ascorbique (vitamine C), Anti-agglomérant (dioxyde de silicium), Stabilisant (carboxyméthylcellulose sodique réticulée), Anti-agglomérant (sels de magnésium d'acides gras végétaux) et Molybdate d'ammonium. Agent d'enrobage : Hydroxypropylméthylcellulose, Cellulose, Acides gras et Colorants (dioxyde de titane et oxyde de fer).

DUR'OS comprimés Dispersibles

Composition :

Teneur par dose journalière des ingrédients (pour un comprimé)		
		RDA
Calcium carbonate	300 mg	50%
Calcium nitrate	100 mg	50%
Vitamine D3	5 mcg	100%

Ossature* - Croissance* - Santé des dents*

*Le calcium et la vitamine D contribuent à une ossature, une dentition normales.

*Le calcium et la vitamine D :

- Sont nécessaires au maintien d'une ossature et d'une dentition normale.
- Jouent un rôle dans le processus de division cellulaire.
- Sont nécessaires à une croissance et à un développement osseux normal.
- Contribuent au maintien d'une fonction musculaire normale.
- La vitamine D contribue à l'absorption et à l'utilisation normales du calcium.

Quel est le rôle du calcium dans notre organisme ?

Le calcium représente 2% de notre poids corporel. Sa principale fonction sous forme de phosphates de calcium. Il se trouve en forte concentration dans les dents. Il favorise naturellement la croissance osseuse chez les enfants et à l'entretien du capital osseux chez l'adulte et chez les seniors, il est un pilier contre l'ostéoporose.

Pourquoi avez-vous conçu un produit à base de vitamine D3 et de calcium ?

Le calcium (présent dans notre formule sous la forme la plus assimilable : le glycérophosphate) et la vitamine D3 sont des nutriments indispensables et très complémentaires intervenants dans la régulation du métabolisme phospho-calcique et l'homéostasie osseuse.

La vitamine D agit comme une hormone, elle fixe le calcium sur les os et favorise son absorption et son utilisation par l'organisme.

LOT:190408D
PER:04/2022
PPC:89 DH

KETUM® 2,5%

Gel. Tube de 30 et 60g

Lisez attentivement ! **Intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament**.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autre
plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous
jouera à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourra
pourrait avoir besoin de la relire.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Kétoprofène.....

Excipients q.s.p..... 2,5 g
(carbonates, éthanol, huile essentielle de lavandin, diéthanolamine, eau purifiée) 100 g

Forme et présentation

Tube de 30 g et de 60g

Classe pharmaco-therapeutique

Anti-inflammatoire non stéroïden en topique (M : Muscle et Squelette)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïden : le kétoprofène. Il est

courte durée :

- des poussées d'arthrose des petites articulations,
- des tendinites,
- des traumatismes de type entorse (foulure), contusion,
- des lombalgies,
- des réactions inflammatoires des veines consécutives à une scélérose de varices.

ATTENTION ! DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- à partir du 6^e mois de la grossesse,
 - antécédent d'asthme à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
 - antécédent d'allergie cutanée au kétoprofène ou à l'acide tiaprofénique, au fenoibrate (médicament destiné à baisser le taux de cholestérol), à un produit solaire ou au parfum,
 - antécédent d'allergie à l'un des excipients,
 - sur peau lésée, quelle que soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.
- *Arrêtez immédiatement le traitement par KETUM 2,5%, gel, si vous développez une réaction cutanée après la co-application de produits contenant de l'octocrylène.
- 1-octocrylène est un excipient contenu dans plusieurs produits de cosmétique et d'hygiène tels que les shampoings, après-rasages, gels douche, crèmes, rouges à lèvres, crèmes anti-âge, démaquillants, laques pour cheveux) afin d'éviter sa photo-gradation.
- Pendant le traitement et les deux semaines suivant l'arrêt, ne pas s'exposer au soleil (même voilé), ni aux UVa.**

Mises en garde spéciales

Ce médicament est réservé à l'adulte (plus de 15 ans), en l'absence de données chez l'enfant.

L'exposition au soleil (même voilé) ou aux UVa des zones en contact avec le gel peut provoquer des réactions cutanées plus ou moins sévères dues à photosensibilisation.

Aussi, il est nécessaire :

1. de **protéger** les zones traitées par le port d'un vêtement durant toute la durée du traitement et les deux semaines suivant son arrêt.
2. de **procéder à un lavage soigneur et prolongé des mains** après chaque utilisation du gel afin d'éviter tout contact involontaire avec des zones susceptibles

En cas d'apparition d'une réaction anormale de la peau pendant le traitement : **arrêter immédiatement le traitement et avertir votre médecin.**

Respecter les conseils d'utilisation :

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (Cf. rubrique Posologie) ne pas appliquer sur une surface étendue du corps, respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées par votre médecin.

Précautions d'emploi

LOT : 939
PER : MAR 2022
PPV : 52 DH 80

F209004/04

Indications, contre-indications, précautions d'emploi : Lire ce
doit être conservé à une température inférieure à 25°C. I
d'administration. Voie locale. Faire pénétrer le gel par un r
ou inflammatoire. Mises en garde spéciales : Se laver soigr
هذه النشرة بانتهاء قبل الاستعمال. يجب الاحتفاظ بهذا الدواء في درجة
طريقة الاستعمال: الطريقة الموضعي. يدفن المرهم بتسلك طيف، على
خاصية: يجب غسل اليدين بعثابة بعد كل استعمال.