

Montant détaillé des Honoraires

الدكتورة أيت محمد ليلي
إختصاصية في أمراض
الطفل والرضيع

Dr Ait M'hamed Laila
Pédiatre
Maladies du nouveau-né,
du nourrisson et de l'enfant

Cabinet
Pédiatrique



Le 04/04/19

Nourrisson Rahali Laila

1919015 - 14kg

Vaccin upfert



149,00
1) PRIORIX

2) Tetraxium
144,00



Dr AIT M'HAMED Laila
PEDIATRE
249, Bd Yacoub El Mansour, Résidence
Mansour, 2^{ème} étage, N°3, Hay Hassan
0522 39 39 04 / 0666 11 79 79

PHARMACIE MAOJID CIL
Dr Sonia MAOJID
Lot. Stade N° 22 - CIL
Tél. 022 39.88.77 - Casablanca

249, Boulevard Yacoub El Mansour
Résidence El Mansour, 2^{ème} Etage, Apt3, Casablanca

T. 05 22 39 39 04 | Urgences. 06 66 11 79 79 | Email : draitmhamed@gmail.com

TETRAxIM

Suspension injectable en seringue préremplie

**VACCIN DIPHTÉRIQUE, TI
COQUELUCHEUX (ACELL
MULTICOMPOSÉ) ET POL
(INACTIVÉ), ADSORBÉ**

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P. 4
Ain sebaâ Casablanca
Tetrixim inj b1 ser 1 dose
P.P.V.: 144,00 DH



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de faire vacciner votre enfant, car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce vaccin a été prescrit à votre enfant uniquement. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre.
- Si votre enfant ressent un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TETRAxIM et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TETRAxIM ?
3. Comment utiliser TETRAxIM ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TETRAxIM ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE TETRAxIM ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

TETRAxIM est un vaccin. Les vaccins sont utiles pour protéger contre les maladies infectieuses.

Quand TETRAxIM est injecté, les défenses naturelles du corps développent une protection contre ces maladies.

TETRAxIM est indiqué pour aider votre enfant à se protéger contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite.

TETRAxIM est indiqué chez les enfants à partir de l'âge de 2 mois.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER TETRAxIM ?

Pour être sûr que ce vaccin convient à votre enfant, il est important de dire à votre médecin ou votre pharmacien si les points décrits ci-dessous s'appliquent à votre enfant.

Utilisez jamais TETRAxIM :

- si votre enfant est allergique (hypersensible) :
 - à l'un des composants du vaccin (dont la liste figure en rubrique 6 informations supplémentaires)
 - au glutaraldéhyde, à la néomycine, à la streptomycine ou à la polymyxine B (utilisés lors de la fabrication et qui peuvent être présents à l'état de traces),
 - à un vaccin coquelucheux (accellulaire ou germe entier),
- si votre enfant a eu une réaction allergique après une injection du même vaccin ou d'un vaccin contenant les mêmes substances,
- si votre enfant a souffert d'une encéphalopathie évolutive (lésions cérébrales),
- si votre enfant a atteint d'encéphalopathie (lésions cérébrales) dans les 7 jours après une dose précédente d'un vaccin coquelucheux à germe entier ou accellulaire,
- si votre enfant présente de la fièvre ou une maladie qui est survenue brusquement (maladie aiguë), dans ce cas, il est préférable de différer la vaccination.

Mise en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser TETRAxIM dans les cas décrits ci-dessous.

- si votre enfant présente des défenses immunitaires affaiblies, ou s'il suit un traitement avec des corticoïdes, des médicaments cytotoxiques, de la radiothérapie ou d'autres traitements susceptibles d'affaiblir son système immunitaire : la réponse immunitaire peut alors être diminuée. Il est alors recommandé d'attendre la fin du traitement ou de la maladie pour vacciner. Néanmoins, la vaccination est recommandée chez les sujets présentant une immunodépression chronique, telle qu'une infection par le VIH, même si la réponse immunitaire risque d'être limitée,
- si votre enfant a présenté un syndrome de Guillain-Barré (sensibilité anormale, paralysie) ou une neuropathie du plexus brachial (paralysie, douleur diffuse au niveau du bras et de l'épaule) après l'injection d'un vaccin contenant de l'anatoxine tétanique (vaccin contre le tétanos) ; la décision d'administrer de nouveau un vaccin contenant l'anatoxine tétanique dans ce cas sera évaluée par votre médecin,
- si votre enfant présente des troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre des plaquettes (thrombocytopénie) ou des troubles de la coagulation, en raison du risque de saignement qui peut survenir lors de l'administration intramusculaire,
- si votre enfant présente ou a présenté des problèmes médicaux ou des allergies en particulier une réaction allergique à la suite d'une injection de TETRAxIM,
- si votre enfant a présenté l'un des événements suivants après une administration précédente de ce vaccin, alors la décision d'administrer d'autres doses de vaccin contenant une valence coquelucheuse devra être soigneusement évaluée par votre médecin :
 - Fièvre supérieure ou égale à 40°C dans les 48 heures après la vaccination, sans autre cause identifiable.
 - Collapsus ou état évanouissant un état de choc avec épisode d'hypotonie-hyporéactivité (baisse de tonus) dans les 48 heures suivant la vaccination.
 - Cris persistants, inconsolables pendant une durée de 3 heures ou plus, survenant dans les 48 heures après la vaccination.
 - Convulsions avec ou sans fièvre, survenant dans les 3 jours après la vaccination.
- si votre enfant a déjà présenté des convulsions accompagnées de fièvre, non liées à une injection vaccinale antérieure ; il est particulièrement important dans ce cas de surveiller sa température dans les 48 heures suivant la vaccination et de lui donner régulièrement un traitement permettant de diminuer la fièvre, pendant 48 heures.

GlaxoSmithKline Maroc
Ain El Aouda
Région de Rabat

PPV 149,00 DH
6 118001 140923

Priorix™

1 dose/dosis (0.5 ml)
Inj./Inyec.: S.C. / I.M.

The powder must be reconstituted with the solvent.

La poudre doit être reconstituée avec le solvant.

El polvo debe reconstituirse con el solvente.

After reconstitution/ Après la reconstitution/ Después de la reconstitución,

1 dose/dosis (0.5 ml) contains/contient/contiene:

Live attenuated measles virus (Schwarz strain)/ Virus de la rougeole vivant atténué (souche Schwarz)/ Virus vivo atenuado del sarampión (cepa Schwarz)
Live attenuated mumps virus (RIT 4385 strain)/ Virus des oreillons vivant atténué (souche RIT 4385)/ Virus vivo atenuado de la parotiditis (cepa RIT 4385)
Live attenuated rubella virus (Wistar RA 27/3 strain)/ Virus de la rubéole vivant atténué (souche Wistar RA 27/3)
Neomycin sulphate is present as residual/ Résidu du procédé de fabrication : sulfate de néomycine/ Presenta sulfato de neomicina como residuo

plusieurs des constituants antigéniques de TETRAxIM) sont les suivants :

- Syndrome de Guillain-Barré (sensibilité anormale, paralysie) et neuropathie du plexus brachial (paralysie, douleur diffuse au niveau du bras et de l'épaule) après l'administration d'un vaccin contenant l'anatoxine tétanique.

Informations complémentaires concernant des populations particulières

Chez les nourissons très grands prématurés (à 28 semaines de grossesse ou moins) des pauses respiratoires peuvent survenir pendant 2 à 3 jours après la vaccination.

heurs (jambes et pieds) survenant dans les suites d'une infection du vaccin TETRAxIM et du vaccin Haemophilus dans des jours différents.

reconstituant le vaccin Haemophilus influenzae type b, des gonflements des jambes, une coloration bleutée de la peau (cyanose) ou des rougeurs, et disparaissant sans traitement et sans séquelles.

autres que ceux déjà cités, consultez votre médecin ou

pourrait prendre tout autre médicament, y compris un

autre médecin.

en vigueur :

de d'une injection de rappel à l'âge de 11 mois, puis un

ent la valence coquelucheuse à concentration réduite.

de rappel un an après la primovaccination, c'est-à-

chez le nourrisson et dans la partie haute du bras

à votre médecin ou à votre pharmacien.

que tout le monde n'y soit pas sujet.

général l'enfant est encore sur le lieu de vaccination.

si l'enfant a été vacciné, vous devez IMMÉDIATEMENT

(sédation, occlusion de Quincke),

connaissance, accélération du rythme cardiaque associé

s'aggrave, vous devez contacter votre médecin ou votre

au site d'injection, fièvre à 38°C ou plus, malaise.

ins sont rapportées très rarement)

odes durant lesquelles votre enfant est pâle, ne réagit

phosphorus influenzae type b, des gonflements des jambes, coloration bleutée de la peau (cyanose) ou des rougeurs, et disparaissant sans traitement et sans séquelles.

TETRAxIM, mais avec d'autres vaccins contenant un ou