

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 7988

Nom & Prénom RAHALI Brahim

Fonction : Pn Phones 0661217567

Mail brahali.01@Royal-Air-Maroc.Com

MEDECIN

Prénom du patient RAHALI CHADINE

Adhérent

Conjoint

Enfant

Age 28 ANS

Date 04.07.2019

Nature de la maladie

Date 1ère visite

Maladie Pédiatrique

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

0522 39 39 04 / 0666 11 79 29
149, Bd Yacoub El Moustakab
Sous le pont de la Kasbah
Casablanca

DR AIT M'HAMED LAILA
PEDELI

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des
honoraires

2

CS

200,00

PHARMACIE

Date 04/07/2019

Montant de la facture

Pharmacie MESSID CIL
1. Stade N° 22 - CIL
Tel 022 39.88.72 - Casablanca

PHARMACIE MESSID CIL
Dr Sonia
1. Stade N° 22 - CIL
Tel 022 39.88.72 - Casablanca

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date :

Désignation des
Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des

Honoraires

AM PC IM IV

CACHET

الدكتورة أية محمد ليلي
اختصاصية في أمراض
الطفل والرضيع

Dr Ait M'hamed Laila
Pédiatre
Maladies du nouveau-né,
du nourrisson et de l'enfant



Cabinet Pédiatrique

Enfants chadiliens

2019.04.04

130.00



1) Faire le temps avec Get Topialyse, SUR hydratante. Bleu niller.

24280



2) Topiaryc SUR. CMC hydratante

millimetre long. Pupil large + caps

40. 10 Application le soin Pharmacie MASJID CIL

3) Efficient police ride
application

1) pus ^{harmless} application 1c soap x 7 days
2) Lo. St. 100 ml 1c soap 1c

Dr AIT M'HAMED IMA
PEDIATRE
1. 05 22 39 39 04 | Urgences. 06 66 11 79 79 | Email : draitmamed@gmail.com

4) Zekhil AF n'a pas à prendre
un aperçu. Revenez les 21 jours + tard. Total: 65,00

Efficort

a céponate d'hydrocortisone 0,127 %

CREME HYDROPHILE



LOT: 0045
EXP: OCT 2020
PPV: 40,50 DH

COMPOSITION :

Acéponate d'hydrocortisone cent vingt-sept milligrammes
Excipients : cire auto-émulsionnable, alcool stéarylque, vaseline blanche, alcool eau purifiée qs
Tube de 30 g contenant 0,0381 g d'acéponate d'hydrocortisone.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est un corticoïde pour application locale.
Il est recommandé dans certaines maladies comme l'eczéma, le psoriasis, les allergies.
Mais votre médecin peut le prescrire dans d'autres cas.

CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un des composants du médicament,
- lésions ulcérées,
- acné et rosacée,
- maladies infectieuses de la peau d'origine virale (herpès, zona, varicelle), bactérienne, impétigo...), mycosique (dûes à des champignons microscopiques) et parasitaire

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE :

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
- Une partie du principe actif peut traverser la peau et passer dans le sang, en particulier lorsque la crème est appliquée sur une grande surface, sous un pansement ou une couche imperméable chez les enfants et les nourrissons.
- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans l'avis de votre médecin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ce médicament doit être utilisé en respectant les conseils du médecin :

- localisation exacte des applications,
- ne l'utiliser chez le nourrisson que sur indication explicite du médecin,
- un traitement chez l'enfant de moins de 12 ans doit être soumis à une stricte surveillance médicale.

Les recommandations suivantes doivent être suivies :

- soins d'hygiène : ne pas utiliser simultanément un antiseptique à pH alcalin,
- éviter l'application prolongée sur les paupières, le visage, dans les plis,
- toute irritation ou infection doit être signalée au médecin,
- si une réaction d'intolérance apparaît, le traitement doit être arrêté.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Efficort

a céponate d'hydrocortisone

CREME HYDROPHILE

GALDE

0,127%

Veuillez lire attentivement car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous aide à guérir de maladies qui sont identiques à celles d'autres personnes.
- Si vous ressentez un malaise ou une douleur qui ne serait pas normal, consultez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
2. Quelles sont les informations importantes à connaître avant de prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
3. Comment prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antiparasitaire de la famille des imidazolés.

Il est préconisé dans le traitement des parasitoses à giardiae, oxyures, ascaris, ankylostomes, tricocéphales, anguilles, trichines et taeniae.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?

Ne prenez jamais ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Zentel 0,4 g/10 ml, suspension buvable.

Convulsions et autres symptômes :

Les personnes traitées pour une infection parasitaire peuvent également avoir, sans forcément le savoir, une infection rare et grave du cerveau appelée neurocysticercose. Une réaction se produit dans le cerveau quand les parasites sont détruits. Les symptômes incluent des convulsions, des maux de tête et des problèmes de vue (voir rubrique 4).

Tests sanguins et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable :

En raison de la possibilité de survenue d'anomalie de la formule sanguine ou d'anomalie du bilan hépatique (du foie) lors de traitement par albendazole sur des durées longues et à dose élevée comme tel est le cas lors du traitement de la trichinellose (parasitose à trichines), un bilan sanguin est nécessaire régulièrement avant et durant le traitement. Ce bilan sanguin devra être étroitement surveillé notamment si vous présentez une maladie hépatique préexistante ou si vous avez déjà présenté une anomalie hépatique sous albendazole (voir rubrique 4).

Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.

Veuillez lire attentivement car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous aide à guérir de maladies qui sont identiques à celles d'autres personnes.
- Si vous ressentez un malaise ou une douleur qui ne serait pas normal, consultez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
2. Quelles sont les informations importantes à connaître avant de prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
3. Comment prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antiparasitaire de la famille des imidazolés.

Il est préconisé dans le traitement des parasitoses à giardiae, oxyures, ascaris, ankylostomes, tricocéphales, anguilles, trichines et taeniae.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?

Ne prenez jamais ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Zentel 0,4 g/10 ml, suspension buvable.

Convulsions et autres symptômes :

Les personnes traitées pour une infection parasitaire peuvent également avoir, sans forcément le savoir, une infection rare et grave du cerveau appelée neurocysticercose. Une réaction se produit dans le cerveau quand les parasites sont détruits. Les symptômes incluent des convulsions, des maux de tête et des problèmes de vue (voir rubrique 4).

Tests sanguins et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable :

En raison de la possibilité de survenue d'anomalie de la formule sanguine ou d'anomalie du bilan hépatique (du foie) lors de traitement par albendazole sur des durées longues et à dose élevée comme tel est le cas lors du traitement de la trichinellose (parasitose à trichines), un bilan sanguin est nécessaire régulièrement avant et durant le traitement. Ce bilan sanguin devra être étroitement surveillé notamment si vous présentez une maladie hépatique préexistante ou si vous avez déjà présenté une anomalie hépatique sous albendazole (voir rubrique 4).

Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.

Veuillez lire attentivement car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous aide à guérir de maladies qui sont identiques à celles d'autres personnes.
- Si vous ressentez un malaise ou une douleur qui ne serait pas normal, consultez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
2. Quelles sont les informations importantes à connaître avant de prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
3. Comment prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antiparasitaire de la famille des imidazolés.

Il est préconisé dans le traitement des parasitoses à giardiae, oxyures, ascaris, ankylostomes, tricocéphales, anguilles, trichines et taeniae.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?

Ne prenez jamais ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Zentel 0,4 g/10 ml, suspension buvable.

Convulsions et autres symptômes :

Les personnes traitées pour une infection parasitaire peuvent également avoir, sans forcément le savoir, une infection rare et grave du cerveau appelée neurocysticercose. Une réaction se produit dans le cerveau quand les parasites sont détruits. Les symptômes incluent des convulsions, des maux de tête et des problèmes de vue (voir rubrique 4).

Tests sanguins et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable :

En raison de la possibilité de survenue d'anomalie de la formule sanguine ou d'anomalie du bilan hépatique (du foie) lors de traitement par albendazole sur des durées longues et à dose élevée comme tel est le cas lors du traitement de la trichinellose (parasitose à trichines), un bilan sanguin est nécessaire régulièrement avant et durant le traitement. Ce bilan sanguin devra être étroitement surveillé notamment si vous présentez une maladie hépatique préexistante ou si vous avez déjà présenté une anomalie hépatique sous albendazole (voir rubrique 4).

Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.

Veuillez lire attentivement car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez d'autres questions, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament vous aide à guérir de maladies qui sont identiques à celles d'autres personnes.
- Si vous ressentez un malaise ou une douleur qui ne serait pas normal, consultez votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
2. Quelles sont les informations importantes à connaître avant de prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
3. Comment prendre ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antiparasitaire de la famille des imidazolés.

Il est préconisé dans le traitement des parasitoses à giardiae, oxyures, ascaris, ankylostomes, tricocéphales, anguilles, trichines et taeniae.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable ?

Ne prenez jamais ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mises en garde et précautions d'emploi

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Zentel 0,4 g/10 ml, suspension buvable.

Convulsions et autres symptômes :

Les personnes traitées pour une infection parasitaire peuvent également avoir, sans forcément le savoir, une infection rare et grave du cerveau appelée neurocysticercose. Une réaction se produit dans le cerveau quand les parasites sont détruits. Les symptômes incluent des convulsions, des maux de tête et des problèmes de vue (voir rubrique 4).

Tests sanguins et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable :

En raison de la possibilité de survenue d'anomalie de la formule sanguine ou d'anomalie du bilan hépatique (du foie) lors de traitement par albendazole sur des durées longues et à dose élevée comme tel est le cas lors du traitement de la trichinellose (parasitose à trichines), un bilan sanguin est nécessaire régulièrement avant et durant le traitement. Ce bilan sanguin devra être étroitement surveillé notamment si vous présentez une maladie hépatique préexistante ou si vous avez déjà présenté une anomalie hépatique sous albendazole (voir rubrique 4).

Pour favoriser son efficacité dans le traitement des infestations à trichine, le traitement doit être débuté le plus tôt possible au début de l'infestation.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Autres médicaments et ZENTEL 0,4 g/10 ml, suspension buvable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse

Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.