

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRE		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des
DROITE	18 11 21 22				Montant des soins
	13 12 23 24				
	14 15 25 26				
HAUT	16 26 27 28				Début d'exécution
	17 29 30 31				
BAS	46 45 38 39				Fin d'exécution
	47 48 36 37				
	49 44 33 34				
	42 41 31 32				
O.D.F. Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire			Coefficient des travaux
DROITE	18 11 21 22	H			Montant des soins
	13 12 23 24	25533412	21433552		
	14 15 25 26	00000000	00000000	G	
HAUT	16 26 27 28	00000000	00000000		
	17 29 30 31	35533411	11433553		
BAS	46 45 38 39				
	47 48 36 37				
	49 44 33 34				
	42 41 31 32				
(Création, Remont, adjonction)					
Fonctionnel, thérapeutique nécessaire à la profession					
MAPRAS					
19 SEP. 2019					



W17-100176

DATE DE DEPOT

18.1.09./201.

A REMPLIR PAR L'ADHERENT				Mle 19845
Nom & Prénom		RAISS ADIL		
Fonction : MANAGER		Phones 06.62.80.17.90		
Mail adraiss.03.x@gmail.com				
MEDECIN	Prénom du patient RAISS ADIL			
Adhérent <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age 40 ans Date 11/09/19				
Nature de la maladie		Date 1ère visite		
Anémie sévère + Athémie				
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances				
Nature des actes		Nbre de Coefficient	Montant détaillé des honoraires	
Cs			200,00	
PHARMACIE		Date 11/09/18.19		
Montant de la facture		363,20		
ANALYSES - RADIographies		Date 11/09/18		
Désignation des Coefficients		Montant détaillé des Honoraires		
B1470		1884,80H		
AUXILIAIRES MEDICAUX		Date :		
Nombre		Montant détaillé des Honoraires		
AM	PC	IM	IV	

Médecine Générale

ECG - ECHOGRAPHIE

الطب العام

التخطيط الطبي - الفحص بالصدى

Ancien Médecin des Hôpitaux de Paris - France

طبيب سابق بمستشفيات باريس - فرنسا

Casablanca, le 11/09/2019 الدار البيضاء، في

M : RAÏSS Adil

- 1^o Guvamine gélules 119,00 S.V
 1 gél x 21j pdt 15 jours
- 2^o Dafflon 500 mg CP S.V
 40150 x 3¹ cp x 21j pdt 02 semaines
- 3^o Gardyferon 80 mg CP S.V
 1 cp x 31j pdt 01 mois.
- T = 363,20

~~PHARMACIE Socrate~~
 Pharmacie Socrate
 Rue Ibnou Majd Chantmar 2
 Maârif Extention - Casablanca
 Tel.: 0522 94 81 10



زنقة ابن كثير، إقامة البيضاء عمارة A - الشقة رقم 2 - الدار البيضاء

Rue Ibnou Katir Résidence Elbeida Imm.A - Apt N°2 (RDC) - Casablanca

Tél.: 05 22 23 49 13 / الهاتف : 06 19 31 19 85 مستعجلات

Email : othmantazi@hotmail.com

daflon® 500 mg

comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Fraction flavonoïque purifiée, micronisée : 500 mg pour un comprimé

Quantité correspondant à :

- Diosmine : 450 mg.
- Flavonoïdes exprimés en hespéridine : 50 mg.

Excipients : Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microcristalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc, glycérol, hypromellose, macrogol 6000, laurylsulfate de sodium, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer rouge (E172), dioxyde de titane (E171), q.s. pour un comprimé pelliculé de 660 mg.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Comprimés pelliculés sous plaquettes thermomoulées (PVC/Aluminium).

Boîte de 30.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Médicament agissant sur les capillaires.

C système cardiovasculaire

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculo protecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-débutus) et dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire.

CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants.

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Faites attention avec DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Crise hémorroïdaire

Si les troubles hémorroïdaires ne céderont pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

Troubles de la circulation veineuse

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

- Evitez l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.
- La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisant la circulation sanguine.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse :

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant votre traitement, ou si vous êtes enceinte et envisagez de prendre ce médicament, demandez l'avis de votre médecin.

Allaitements :

En l'absence de données sur le passage du médicament dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée de traitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

PISIOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION,

à midi

par jour suivants

pelliculé

irables, qu'il ne

pelliculé

le monde

dessous est

définie en utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)
 - fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)
 - peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)
 - rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)
 - très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)
- fréquence inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence)
- Ils peuvent inclure :
- Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement.
 - Peu fréquent : colite.
 - Rare : sensations vertigineuses, céphalées, malaise, rash, prurit, urticaire.
 - Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

CONSEILS EDUCATION SANITAIRE :

Troubles de la circulation

- Évitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.
- Évitez l'exposition au soleil et à la chaleur.
- VEuillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo ...), évitez l'excès de poids.
- Évitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau froide favorisent la circulation sanguine.

Hémorroïdes

- Buez 1,5 à 2L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (fruits, légumes verts, céréales complètes), évitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épicés.
- Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :

juillet 2016



SERVIER MAROC

Imm. ZEVACO, Lot FATH 4
Bd Abdellah Boutaleb
20180 Casablanca

Juvamine

GÉLULE

COMPOSITION POUR UNE GÉLULE :

- PANAX GINSENG C.A MEYER = 56 mg
- Le Panax Rouge CA.MEYER est composé
- acides aminés (dont une forte proportion acide glutamique)
- vitamines (vitamines B1, B2, B3, B5, B6, oligo-éléments (Fer, Aluminium, Potassium, Cuivre, Phosphore, Silicium, Zinc)
- bases d'acides nucléiques et nucléosides

PROPRIÉTÉS :

- Pouvoir anti-fatigue: physique, psychologique (vieillesse, post-accouchement, convalescence)
- Accroît les résistances musculaires
- Augmente les performances physiques d'entraînement et en période de récupération.
- Augmente le tonus physique
- Excellent stimulant du tonus général
- Stimule les défenses de l'organisme
- Favorise l'activité intellectuelle et les réponses au stress

CONSEILS D'UTILISATION :

2 à 3 gélules par jour

PRÉSENTATION :

Boîte de 30 gélules
Boîte de 45 gélules



L'efficacité du PANAX GINSENG C.A MEYER est prouvée par plusieurs études et travaux scientifiques réalisés chez l'homme

Laboratoires JUVA SANTE
8- Rue Christophe Colomb, 75008 – Paris
France

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucrés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinale chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension artérielle qui nécessitent des médicaments pour ces maladies et une :

Précautions d'emploi

La consommation d'alcool est conseillé de ne pas prendre cette boisson.

Autres médicaments

Si vous utilisez déjà d'autres médicaments, demandez à votre pharmacien ou votre pharmacien. En effet, certains médicaments peuvent ne pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allait. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

30 comprimés pelliculés
Tardyferon® 80 mg



31934

6 1118001 103041

P/N: 401090

41 Rue Molardane Responsable: Ahmed DAoudi
Distributeur pour COOPER PHARMA

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucrés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinale chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension artérielle qui nécessitent des médicaments pour ces maladies et une :

Précautions d'emploi

La consommation d'alcool est conseillé de ne pas prendre cette boisson.

Autres médicaments

Si vous utilisez déjà d'autres médicaments, demandez à votre pharmacien ou votre pharmacien. En effet, certains médicaments peuvent ne pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allait. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

30 comprimés pelliculés
Tardyferon® 80 mg



31934

6 1118001 103041

PNV: 40309

41 Rue Molardane Responsable: Amma DAoudi
Distributeur pour COOPER PHARMA

Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PRÉPARATIONS ANTIANEMIQUES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sucrés, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinale chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension artérielle qui nécessitent des médicaments pour ces maladies et une :

Précautions d'emploi

La consommation d'alcool est conseillé de ne pas prendre cette boisson.

Autres médicaments

Si vous utilisez déjà d'autres médicaments, demandez à votre pharmacien ou votre pharmacien. En effet, certains médicaments peuvent ne pas être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment de prise par exemple).

- Si vous prenez des médicaments injectables contenant du fer.
- Si vous prenez des médicaments contenant de l'acide acétylhydroxamic.
- Si vous prenez certains antibiotiques (les cyclines ou les fluoroquinolones).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter une fragilité osseuse (les bisphosphonates, le strontium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).
- Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).
- Si vous prenez des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson (l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa, la carbidopa).
- Si vous prenez du zinc ou du calcium.
- Si vous prenez un médicament pour traiter une acidité excessive de votre estomac : topiques gastro-intestinaux, charbon ou antiacides (sels d'aluminium, de calcium et de magnésium).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'hypercholestérolémie (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

La consommation concomitante de laitage, de thé, de café, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou de céréales empêche l'absorption du fer par l'organisme.

Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible chez la femme qui allait. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de la capacité à conduire et utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes.

30 comprimés pelliculés
Tardyferon® 80 mg



31934

6 1118001 103041

PNV: 40309

41 Rue Molardane Responsable: Amma DAoudi
Distributeur pour COOPER PHARMA

Casablanca, le 11.10.91.2019 الدار البيضاء، في

MC RAiss Adil

- 1 NFS + plaquettes
- 2 Ferritine sérique
- 3 Urée, créatinine
- 4 Transaminases, γGT
- 5 Sanguogramme : Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+}
protides, bicarbonates
- 6 Glycémie à jeûn, HbA1C
- 7 Cholestérol total, triglycérides
- 8 TS-H
- 9 PSA



INB
aris

Casablanca
19.85

زنقة ابن كثیر، إقامة البيضاء عمارة A - الشقق رقم 2 - الدار البيضاء

Rue Ibnou Katir Résidence Elbeida Imm.A - Apt N°2 (RDC) - Casablanca

Télé: 05 22 23 49 13 / الهاتف : urgences: 06 19 31 19 85

Email : othmantazi@hotmail.com

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SOCRATE

Résidence Masurel ,Angle Rue Socrate et Bd Yacoub EL Mansour IMM C N°4 –
CASABLANCA

Tél : 0522 23 36 03. Fax : 0522 25 85 08 - PATENTE : 35804986- CNSS : 6478417
BP 19078021211 507790200 18 18. AGENCE YACOUB EL MANSOUR CASABLANCA
IF 44409091 ICE 000114556000027 INP 0093001964

Dr. Abdellatif LOUDGHIRI

Pharmacien Biologiste

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Bactériologie–Biochimie–Hématologie
Mycologie - Parasitologie – Virologie

FACTURE N° : 190006736

CASABLANCA le 11-09-2019

Mr Adil RAIS

Demande N° 190911A038

Numéro de l'adhérent :

Numéro de prise en charge :

Date de l'examen : 11-09-2019

Analyses :

Récapitulatif des analyses

CN	Analyse	Val	Clefs
PS	Prélèvement sang	E25	E
	Ferritine	B250	B
	TSH	B250	B
0106	Cholestérol total	B30	B
0111	Créatinine	B30	B
0118	Glycémie	B30	B
0119	Hémoglobine glycosylée	B100	B
0120	Ionogramme complet(Na, K, Cl, Prot, RA, Ca)	B160	B
0134	Triglycérides	B60	B
0135	Urée	B30	B
0141	Gamma glutamyl transférase (GGT)	B50	B
0146	Transaminases O (TGO)	B50	B
0147	Transaminases P (TGP)	B50	B
0216	Numération formule	B80	B
0361	PSA	B300	B

Total des B : 1470

TOTAL DOSSIER : 1994.80DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : mille neuf cent quatre-vingt-quatorze dirhams quatre-vingts centimes

LABO SOCRATE
Rés. Masurel, Rue Socrate, IMM C N°4 - 20 000 Casablanca
Tel.: 0522 23 36 03, 0522 25 85 08 - Fax: 0522 25 63 65
Email: labo.socrate@menara.ma

190911A038 – Mr Adil RAIS
Date de l'examen : 11-09-2019

BIOCHIMIE SANGUINE

Sodium (Na) (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	138.0	mmol/L	(135.0–145.0)
Potassium (K) (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	4.95	mmol/L	(3.50–5.10)
Chlore (Cl) (Electrode sélective d'ions diluée (indirecte))	100	mmol/L	(98–107)
Bicarbonates (Dosage enzymatique)	24.5	mmol/L	(22.0–29.0)
Calcium	92	mg/l	(82–102)
	2.3	mmol/l	(2.1–2.6)
Protéines totales (Dosage colorimétrique)	75.6	g/L	(66.0–87.0)
Urée (Dosage enzymatique)	0.24	g/l	(0.15–0.50)
	4.00	mmol/l	(2.50–8.33)
Créatinine jaffé (Dosage cinétique)	7.5	mg/L	(6.0–12.0)
	66.4	μmol/L	(53.1–106.2)
Glycémie à jeun (Hexokinase G6PD-H)	1.12	g/L	(0.74–1.06)
	6.22	mmol/L	(4.11–5.88)
HbA1c (G8 Tosoh)	4.4	%	(4.0–6.0)
Cholestérol total (Dosage enzymatique)	1.73	g/l	(<2.00)
	4.47	mmol/L	(<5.17)
Triglycérides (Dosage enzymatique)	0.80	g/L	(<1.50)
	0.80	mmol/L	(<1.50)

Dossier validé biologiquement par : Docteur Abdellatif LOUDGHIRI



Dr Abdellatif LOUDGHIRI
052 22 23 36 03 / 052 22 23 34 65 - Fax 05 22 25 85 08
Email : labo.socrate@menara.ma - Patente 35807802

Page 2 sur 3

Code Patient : 190911A038
Date de l'examen : 11-09-2019

Saisie le 11-09-2019 11:24

Mr Adil RAIS
 Réf : 190911A038
 Prescription : Dr BENJELLOUN

HEMATOLOGIE

HEMOGRAMME (Automate Sysmex XN-550)

NUMERATION

Leucocytes :	4 740	/mm ³	(3 900–10 200)
Hématies :	4.00	10 ⁶ /mm ³	(4.30–5.76)
Présence de rare cellules cibles et des élliptocytes.			
Hémoglobine :	7.30	g/100mL	(13.50–17.20)
Hématocrite :	26.0	%	(39.5–50.5)
VGM :	65	μ3	(80–99)
TCMH :	18.3	pg	(27.0–33.5)
CCMH :	28.1	%	(30.0–36.0)

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Polynucléaires Neutrophiles :	47.3	%	
Soit:	2 242	mm ³	(1 500–7 700)
Polynucléaires Eosinophiles :	1.3	%	
Soit:	61.6	mm ³	(20.0–500.0)
Polynucléaires Basophiles :	0.8	%	
Soit:	37.9	mm ³	(0.0–200.0)
Lymphocytes :	40.1	%	
Soit:	1 900.7	mm ³	(1 200.0–6 000.0)
Monocytes :	10.5	%	
Soit:	497.7	mm ³	(100.0–900.0)
Plaquettes :	428 000	mm ³	(150 000–370 000)



Dossier validé biologiquement par : Docteur Abdellatif LOUDGHIRI

Labo Socrate
 مختبر التحاليل الطبية سocrates
 laboratoire de biologie médicale Socrate

Page 1 sur 3