

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 365 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : Fikri Mohammed

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 05 22 20 45 45 Total des frais engagés : _____ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : FAKIRI FAS Age: _____

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : _____

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : _____

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : _____ Le : _____

Signature de l'adhérent(e) : ACCUEIL

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie Nº P19-0035651

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).



Total des frais engagés : _____

Date de dépôt : _____


SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES



Dents
Traitées

Nature
des soins

Coefficient


**Coefficient
des travaux**

Montant des soins

Début d'exécution

Fin d'exécution

O.D.F. Prothèses dentaires



Détermination du coefficient
masticatoire

DROITE	11 21	GAUCHE	H
D	25533412 00000000	21433552 00000000	G
AUT	00000000	00000000	
BAS	35533411	11433553	

(Création, Remont, adjonction)
Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession

**Coefficient
des travaux**

Montant des soins

Date du devis

Fin d'exécution

Visa et cachet du praticien

attestant le devis

Visa et cachet du praticien

attestant l'exécution

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle 365

Nom & Prénom

EIKRI M

Signature de
l'adhérent

Fonction

Retraite

Phones 0645923434

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

FATIMA

Adhérent Conjoint Enfant Age

Date

Nature de la maladie

Date 1ère visite

HTA chronique

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des
honoraires

3.9.19

cpte

Grat

PHARMACIE

Date 8/9/19

Montant de la facture


829.2

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date

Désignation des
Coefficients

Montant détaillé des Honoraires



AUXILIAIRES MEDICAUX

Date

Nombre

Date

AM

Date

PO

Date

IM

Date

IV

Date

AM

Date

</div

08/202
061804

LAXANAT COMPRIMES
 PPC : 74,00 DH
 Ut Av : 08/2021 Lot : 0618046
 IPHADERM

3 525720 002259

LAXANAT COMPRIMES
 PPC : 74,00 DH
 Ut Av : 08/2021 Lot : 0618046
 IPHADERM

90
80

Casablanca, le :

18/01/19

ببية
Ord

3 525720 002259

V005 - 06/18 - ETLAXA15

consommer de préférence avant fin :

PHARMACIE LA SOURCE
Melle EL MCHAMMA

Doct:

7, Rue Alia Al-Aziz, C.I.L
Casablanca - Tel: 05 22 26 24 85

72,00 x 3

216,00
i. Detactiel 10 (10) 1cp le mat & 3més

151,40
i. ZALERG 0,25 (10) 1cp pdt 2més

313,80
i. Seconduoo (10) 1cp le mat & 3més
124,60 x 3
24,00 x 2
u. Laxanat : 1cp 2+j 1més.

148,00
829,80

Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid

Dr FIKR Tala
Gynécologie-Obstétrique

091065862

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DETENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fuma

DETENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

avant de

Veuillez lire attentivement
prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

La substance active de Détensiel est le bisoprolol, qui appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Ces médicaments agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier dans le cœur. Par ces

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DETENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fuma

DETENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

avant de

Veuillez lire attentivement
prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

La substance active de Détensiel est le bisoprolol, qui appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Ces médicaments agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier dans le cœur. Par ces

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

DETENSIEL® 10 mg, comprimé pelliculé sécable

Bisoprolol fuma

DETENSIEL® 10 mg
30 comprimés pelliculés sécables



6 118001 101788

PPV : 72,00 DH

Distribué par Cooper Pharma

7862160236

avant de

Veuillez lire attentivement
prendre ce médicament

- Gardez cette notice, vous en aurez besoin.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
3. Comment prendre Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Détensiel 10 mg, comprimé pelliculé sécable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

La substance active de Détensiel est le bisoprolol, qui appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Ces médicaments agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier dans le cœur. Par ces

سيكترال®

أسيبوتولول

أقراص مغلفة

104,60



SECT

Acébutolol

Comprimé pelliculé.

Veuillez lire
notice avant

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez des doutes, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à un enfant. Ne le donnez pas à un enfant ou à un adolescent de moins de 18 ans.
- Si l'un des symptômes décrits dans cette notice apparaît, consultez votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ce médicament ?
 2. Quelles sont les indications pour prendre SECTRAL ?
 3. Comment prendre SECTRAL ?
 4. Quels sont les effets secondaires ?
 5. Comment conserver SECTRAL ?
 7. Informations pratiques.
1. QU'EST-CE QU'EST CE MÉDICAMENT ?
- SECTRAL est un médicament à base de comprimés pelliculés.
2. QUELLES SONT LES INDICATIONS POUR UTILISÉS ?
- (INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)
- SECTRAL est un médicament de classe pharmacologique SELECTIF.

Ces médicaments ont certains effets secondaires. Ils peuvent réguler la tension artérielle et la régulation cardiaque.

- Ces médicaments peuvent :
- l'hypertension artérielle
 - certains troubles de la circulation
 - la prévention de l'infarctus du myocarde

SECTRAL 200 mg est un médicament qui peut être prescrit pour traiter l'hypertension artérielle et les symptômes de l'infarctus du myocarde.

2. QUELLES SONT LES INDICATIONS POUR UTILISÉS ?
- AVANT DE PRENDRE SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé.
- Si votre médecin vous prescrit SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé, il est important de prendre ce médicament de manière régulière et dans les doses prescrites.

1. ما هو سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟ وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 400 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

3. كيف يجب استعمال سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يجب حفظ سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

6. معلومات إضافية

1. ما هو سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

الصنف الصيدلي العلاجي : حاصر بيتا، انتقائي. هذه الأدوية حاصرات بيتا. تقلص من بعض التأثيرات (المسمى تأثيرات بيتا) للجهاز الودي للتنظيم القلبي الوعائي.

ينصح بهذه الأدوية في :

• ارتفاع الضغط الشرياني،

• بعض اضطرابات النظم القلبي.

• الوقاية من الأزمات المؤلمة لذبحة الإجهاض الصدري.

سيكترال 200 ملغ :

• علاج طويل الأمد بعد احتشاء عضل القلب.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 400 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

إذا أخبرك الطبيب عن عدم تحمل بعض السكريات، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص

سيكترال®

أسيبوتولول

أقراص مغلفة

104,60



SECT

Acébutolol

Comprimé pelliculé.

Veuillez lire
notice avant

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez des doutes ou si vous avez des symptômes, consultez votre pharmacien.
- Ce médicament n'est pas destiné à tous les patients. Ne le donnez pas à des personnes qui ont des symptômes de maladie cardiaque ou de maladie pulmonaire.
- Si l'un des symptômes décrits dans cette notice apparaît, consultez votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. ما هو سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
 2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟
 3. كيف يجب استعمال سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟
 4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
 5. كيف يجب حفظ سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟
 6. معلومات إضافية
1. ما هو سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟
الصنف الصيدلي العلاجي : حاصر بيتا، انتقائي.
هذه الأدوية حاصرات بيتا. تقلص من بعض التأثيرات (المسمى تأثيرات بيتا) للجهاز الودي للتنظيم القلبي الوعائي.
ينصح بهذه الأدوية في :
 - ارتفاع الضغط الشرياني،
 - بعض اضطرابات النظم القلبي،
 - الوقاية من الأزمات المؤلمة لذبحة الإجهاض الصدرية،سيكترال 200 ملغ :
• علاج طويل الأمد بعد احتشاء عضل القلب.
 2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟
إذا أخبرك الطبيب عن عدم تحمل بعض السكريات، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.
لا تتناول أبداً سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص

سيكترال®

أسيبوتولول

أقراص مغلفة

104,60



SECT

Acébutolol

Comprimé pelliculé.

Veuillez lire
notice avant

- Gardez cette notice pour la relire.
- Si vous avez des doutes, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à un enfant. Ne le donnez pas à un enfant ou à un adolescent de moins de 18 ans.
- Si l'un des symptômes décrits dans cette notice apparaît, consultez votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ce médicament ?
2. Quelles sont les indications pour prendre SECTRAL ?
3. Comment prendre SECTRAL ?
4. Quels sont les effets secondaires ?
5. Comment conserver SECTRAL ?
7. Informations pratiques.

1. QU'EST-CE QU'EST CE MÉDICAMENT ?

SECTRAL est un comprimé pelliculé.

SECTRAL est un médicament de la classe des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

SECTRAL est un médicament de la classe pharmacologique des bêta-bloquants.

1. ما هو سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

3. كيف يجب استعمال سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

5. كيف يجب حفظ سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

6. معلومات إضافية

1. ما هو سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة وما هي الحالات التي يجب استعماله فيها؟

الصنف الصيدلي العلاجي : حاصر بيتا، انتقائي. هذه الأدوية حاصرات بيتا. تقلص من بعض التأثيرات (المسمى تأثيرات بيتا) للجهاز الودي للتنظيم القلبي الوعائي.

يتحصل بهذه الأدوية في :

• ارتفاع الضغط الشرياني،
• بعض اضطرابات النظم القلبي.

• الوقاية من الأزمات المؤلمة لذبحة الإجهاد الصدرية،
سيكترال 200 ملغ :

• علاج طويل الأمد بعد احتشاء عضل القلب.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص مغلفة؟

إذا أخبرك الطبيب عن عدم تحمل بعض السكريات، اتصل به قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبدا سيكترال 200 ملغ و سيكترال 400 ملغ، أقراص

FR

Zalerg 0,25 mg/ml

Collyre en solution

K 400 ml

Veuillez lire



6 118001 102495

- Gardez ce flacon à portée de main. Il contient 5 ml de collyre.
- Si vous avez besoin de plus de collyre, demandez à votre pharmacien.
- Si vous avez un aoute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ZALERG 0,25 mg/ml
Collyre 5 ml - PPV : 75,70 DH

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,

Casablanca - Pharmacien Responsable : Amina DIAOUDI

tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

indésirables inattendus, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de ZALERG 0,25 mg/ml, collyre en solution que vous n'auriez dû :

Il n'y a pas de risques si vous avez avalé accidentellement quelques gouttes de ZALERG. De même, ne vous inquiétez pas si vous avez instillé accidentellement plus d'une goutte dans votre œil.

Si vous oubliez d'utiliser ZALERG 0,25 mg/ml, collyre en solution :

Instillez une goutte dès que possible, puis revenez à la posologie normale. Assurez-vous que la goutte tombe bien dans l'œil. N'instillez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ZALERG 0,25 mg/ml, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables oculaires suivant ont été décrits :

Fréquents

(affectant moins de 1 patient sur 10) :

- irritation ou douleur oculaire,
- inflammation de l'œil.

FR

Zalerg 0,25 mg/ml

Collyre en solution

K 400 ml

Veuillez lire



6 118001 102495

- Gardez ce flacon à portée de main. Il contient 5 ml de collyre.
- Si vous avez besoin de plus de collyre, demandez à votre pharmacien.
- Si vous avez un aoute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

ZALERG 0,25 mg/ml
Collyre 5 ml - PPV : 75,70 DH

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,

Casablanca - Pharmacien Responsable : Amina DIAOUDI

tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

indésirables inattendus, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez utilisé plus de ZALERG 0,25 mg/ml, collyre en solution que vous n'auriez dû :

Il n'y a pas de risques si vous avez avalé accidentellement quelques gouttes de ZALERG. De même, ne vous inquiétez pas si vous avez instillé accidentellement plus d'une goutte dans votre œil.

Si vous oubliez d'utiliser ZALERG 0,25 mg/ml, collyre en solution :

Instillez une goutte dès que possible, puis revenez à la posologie normale. Assurez-vous que la goutte tombe bien dans l'œil. N'instillez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ZALERG 0,25 mg/ml, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables oculaires suivant ont été décrits :

Fréquents

(affectant moins de 1 patient sur 10) :

- irritation ou douleur oculaire,
- inflammation de l'œil.