

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

ntaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com

Prise en charge : pec@mupras.com

Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Déclaration de Maladie : N° P19- 0014906

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 747

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre : RETRAITE

Nom & Prénom : MIKOU ABDESSAMAD

Date de naissance : 8 MAI 1945

Adresse : RUE KAOUMAR AR. IZN ATHIR FES V.I

Tél. : 0663045835 Total des frais engagés : 1.966,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur AKESBI Thami

Cardiologue Fès

INP 141004119

05 35 65 90 40/06 61 19 50 96

01 OCT. 2019

Date de consultation : 26/07/2019

Nom et prénom du malade : MIKOU ABDESSAMAD Age : 74

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : A.CFA / Cardiopathie ischémique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : FES

Le : 30/09/2019

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
4 JUIL 2015	CS6	K-15	3.02 €	Docteur AKESBI Thami Cardiologue Fès INP 141004118 05 35 65 90 40/66 67 95 09 96

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ARMERIE AIN LEHNAKH Dr KALI BENT ahnaekh sofie so regun ne d'Rhône n° 04-5312-27	26/7/2019	16.66,00 CHF so regun n° 04-5312-27

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Thami AKESBI

Spécialiste des maladies du Cœur et des vaisseaux

Diplômé des Universités de Paris

Diplômé d'échocardiographie et de Cardiologie Congénitale et Pédiatrique

Ancien Assistant des hôpitaux de la région parisienne



141004119

الدكتور التهامي أكسيبي

اختصاصي في أمراض القلب و الشرايين

خريج جامعات باريس

مجاز في الإيكوغرافيا و في أمراض القلب
الخالية و للطفل

طبيب مساعد سابق بمستشفيات ضواحي باريس

24/07/2019

MR MIKOU ABDESSAMAD

MATIN	MIDI	SOIR
-------	------	------

47101. TENSEMIDE	10 MG CP	1.5 0 0 APRES REPAS
34502. COVERSYL	5 MG CP	1 0 0 APRES REPAS
29503. DIGOXINE	0.25 MG CP	0 0 1 APRES REPAS
37604. CARDENSIEL	10 MG CP	1 0 0 APRES REPAS
45705. ALDACTONE	50 MG CP	0 1 0 APRES REPAS
33106. ZYLORIC	200 MG CP	0 1 0 APRES REPAS
314707. ROZAT	10 MG CP	0 0 1 APRES REPAS
29008. SINTROM	4 MG CP	0 0 1/4 A HEURE FIXE

1666960 TRAITEMENT CONTINU

QSP 3 MOIS

A REVOIR DANS 3 MOIS

REFAIRE TP+INR

Digoxine Nativelle® 0,25 mg

Digoxine Nativelle® 0,25 mg

30 comprimés

Voie orale



yelle® 0,25 mg

PPV: 25 DH 00

attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

ez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à macien.

ment vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de is identiques, cela pourrait lui être nocif.

effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette mariez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

TE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
TLES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg.

ENDRE DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé?

ES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS?

SERVER DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé?

S SUPPLEMENTAIRES

E DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

hérapeutique

lotonique

utiques

un tonicardiaque, il augmente la force de contraction du muscle cardiaque. Il possède également rythmiques (il régularise le rythme cardiaque).
préconisé dans:
insuffisance cardiaque.

es du rythme cardiaque.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIGOXINE NATIVELLE

0,25 mg, comprimé?

1. DENOMINATION :

TENSEMIDE® 2,5 mg

TENSEMIDE® 10 mg

30 comprimés

Veuillez prendre

- Garder au réfrigérateur.
- Si vous avez des doutes, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à un enfant de moins de 12 ans.

Le donnez jamais à un enfant de moins de 12 ans.

Si vous avez des symptômes identiques à ceux de l'insuffisance cardiaque, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DE TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés

*** Composition en substance active :**

TENSEMIDE® 2,5 mg : chaque comprimé contient 2,5 mg de torasémide.

TENSEMIDE® 5 mg : chaque comprimé contient 5 mg de torasémide.

TENSEMIDE® 10 mg : chaque comprimé contient 10 mg de torasémide.

*** Composition en excipient :**

Les excipients sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, silice colloïdale et stéarate de magnésium.

*** Liste des excipients à effet notable :**

Lactose monohydraté, amidon de maïs.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés est un médicament diurétique (augmente l'élimination de l'urine) et il appartient au groupe des « diurétiques de l'anse : sulfamides, monodragues ».

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TENSEMIDE® 2,5 mg est indiqué pour le traitement de l'hypertension.

TENSEMIDE® 5 mg, 10 mg sont indiqués pour :

- l'œdème (rétenzione de liquide) dû à une insuffisance cardiaque congestive, maladie rénale ou hépatique.
- hypertension.

5. POSOLOGIE :

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration à moins qu'il vous soit recommandé par votre médecin de suivre d'autres instructions différentes. Rappelez-vous de prendre votre médicament. La durée de traitement avec

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg vous sera indiquée par votre médecin. Veuillez ne pas interrompre votre traitement préalablement car la maladie peut s'aggraver. Les comprimés de torasémide sont destinés à une administration par voie orale.

Adultes :

- TENSEMIDE®

La dose dépend

Si
dan
pha

remarqu

désirables non mentionnés
mer votre médecin ou votre

LOT : 12318003

PER : 04-2021

PPU : 47,10 DH

LES ET PRECAUTIONS

- Il faut noter que le torasémide peut augmenter les niveaux de sodium ou réduire le volume sanguin. Chez les sujets traités avec diurétiques, il peut entraîner des effets cardiovasculaires. Il peut également provoquer des effets urinaires. Il peut également provoquer une baisse de la tension artérielle (hypotension). En absence de données sur la sécurité et l'efficacité chez les enfants, l'utilisation de ce médicament chez ce groupe de patients doit être évitée.

◊ Informations importantes sur les composants de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg, comprimés

Ce médicament contient du lactose. Si vous présentez une intolérance à certains sucres, demandez l'avis de votre médecin avant la prise de ce médicament. Ce médicament ne contient pas de gluten.

9. INTERACTIONS :

◊ Interaction avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. De plus, veuillez signaler à votre médecin en cas d'utilisation d'un de ces médicaments pouvant interagir avec le torasémide :

- Les glucosides cardiaques comme la digoxine (médicaments pour le cœur), antihypertenseurs (en particulier les IECA), théophylline (médicaments pour le traitement de l'asthme), étant donné que l'effet de ces médicaments peut augmenter.
- Minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et les laxatifs : le torasémide peut augmenter l'élimination du potassium produit par ces médicaments.
- Antibiotiques du groupe des aminoglycosides : peuvent augmenter la toxicité au niveau du rein et de l'ouïe.
- Cisplatin (médicament pour le traitement du cancer), lithium (médicament anti-dépresseur), salicylates, acide éthacrynone, étant donné que le torasémide peut augmenter la toxicité de ces médicaments.
- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple ibuprofène, indométhacine), probenecid (médicament antigoutteux), colestyramine (médicaments destinés à diminuer le cholestérol dans le sang) : peuvent diminuer l'effet de torasémide.
- Médicaments pour le traitement du diabète : le torasémide peut diminuer l'effet de ces médicaments.

◊ Interaction de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés avec les aliments et boissons :

Les comprimés peuvent être pris accompagnés ou non d'aliments. Ils doivent être avalés sans être mastiqués le matin à l'aide d'un liquide.

1. DENOMINATION :

TENSEMIDE® 2,5 mg

TENSEMIDE® 10 mg

30 comprimés

Veuillez prendre

- Garder au sec et à l'abri de la lumière.
- Si vous avez des symptômes d'intolérance, veuillez consulter votre pharmacien.
- Si ce médicament ne vous convient pas, n'en prenez pas plus.
- Si vous avez des symptômes identiques à ceux de l'insuffisance cardiaque, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DE TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés

*** Composition en substance active :**

TENSEMIDE® 2,5 mg : chaque comprimé contient 2,5 mg de torasémide.

TENSEMIDE® 5 mg : chaque comprimé contient 5 mg de torasémide.

TENSEMIDE® 10 mg : chaque comprimé contient 10 mg de torasémide.

*** Composition en excipient :**

Les excipients sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, silice colloïdale et stéarate de magnésium.

*** Liste des excipients à effet notable :**

Lactose monohydraté, amidon de maïs.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés est un médicament diurétique (augmente l'élimination de l'urine) et il appartient au groupe des « diurétiques de l'anse : sulfamides, monodragues ».

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TENSEMIDE® 2,5 mg est indiqué pour le traitement de l'hypertension.

TENSEMIDE® 5 mg, 10 mg sont indiqués pour :

- l'œdème (rétenzione de liquide) dû à une insuffisance cardiaque congestive, maladie rénale ou hépatique.
- hypertension.

5. POSOLOGIE :

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration à moins qu'il vous soit recommandé par votre médecin de suivre d'autres instructions différentes. Rappelez-vous de prendre votre médicament. La durée de traitement avec

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg vous sera indiquée par votre médecin. Veuillez ne pas interrompre votre traitement préalablement car la maladie peut s'aggraver. Les comprimés de torasémide sont destinés à une administration par voie orale.

Adultes :

• TENSEMIDE®

La dose quotidienne dépend

Si
dan
pha

remarqu

désirables non mentionnés
mer votre médecin ou votre

LOT : 12318003

PER : 04-2021

PPU : 47,10 DH

LES ET PRECAUTIONS

- Il faut prendre en compte que le torasémide peut augmenter les niveaux de sodium ou réduire le volume sanguin. Chez les sujets traités avec diurétiques, il peut entraîner des effets indésirables cardiaques, urinaires et sur la tension artérielle (hypertension). En absence de données sur la sécurité et l'efficacité chez les enfants, l'utilisation de ce médicament chez ce groupe de patients doit être évitée.

◊ Informations importantes sur les composants de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg, comprimés

Ce médicament contient du lactose. Si vous présentez une intolérance à certains sucres, demandez l'avis de votre médecin avant la prise de ce médicament. Ce médicament ne contient pas de gluten.

9. INTERACTIONS :

◊ Interaction avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. De plus, veuillez signaler à votre médecin en cas d'utilisation d'un de ces médicaments pouvant interagir avec le torasémide :

- Les glucosides cardiaques comme la digoxine (médicaments pour le cœur), antihypertenseurs (en particulier les IECA), théophylline (médicaments pour le traitement de l'asthme), étant donné que l'effet de ces médicaments peut augmenter.
- Minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et les laxatifs : le torasémide peut augmenter l'élimination du potassium produit par ces médicaments.
- Antibiotiques du groupe des aminoglycosides : peuvent augmenter la toxicité au niveau du rein et de l'ouïe.
- Cisplatin (médicament pour le traitement du cancer), lithium (médicament anti-dépresseur), salicylates, acide éthacrynone, étant donné que le torasémide peut augmenter la toxicité de ces médicaments.
- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple ibuprofène, indométhacine), probenecid (médicament antigoutteux), colestyramine (médicaments destinés à diminuer le cholestérol dans le sang) : peuvent diminuer l'effet de torasémide.
- Médicaments pour le traitement du diabète : le torasémide peut diminuer l'effet de ces médicaments.

◊ Interaction de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés avec les aliments et boissons :

Ces comprimés peuvent être pris accompagnés ou non d'aliments. Ils doivent être avalés sans être mastiqués le matin à l'aide d'un liquide.

1. DENOMINATION :

TENSEMIDE® 2,5 mg

TENSEMIDE® 10 mg

30 comprimés

Veuillez prendre

- Garder au réfrigérateur.
- Si vous avez des doutes, demandez à votre pharmacien.
- Ce médicament ne doit pas être donné à un enfant de moins de 12 ans.

Le donnez jamais à un enfant de moins de 12 ans.

Si vous avez des symptômes identiques à ceux de l'insuffisance cardiaque, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. COMPOSITION DE TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés

*** Composition en substance active :**

TENSEMIDE® 2,5 mg : chaque comprimé contient 2,5 mg de torasémide.

TENSEMIDE® 5 mg : chaque comprimé contient 5 mg de torasémide.

TENSEMIDE® 10 mg : chaque comprimé contient 10 mg de torasémide.

*** Composition en excipient :**

Les excipients sont : lactose monohydraté, amidon de maïs, silice colloïdale et stéarate de magnésium.

*** Liste des excipients à effet notable :**

Lactose monohydraté, amidon de maïs.

3. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés est un médicament diurétique (augmente l'élimination de l'urine) et il appartient au groupe des « diurétiques de l'anse : sulfamides, monodragues ».

4. INDICATIONS THERAPEUTIQUES

TENSEMIDE® 2,5 mg est indiqué pour le traitement de l'hypertension.

TENSEMIDE® 5 mg, 10 mg sont indiqués pour :

- l'œdème (rétenzione de liquide) dû à une insuffisance cardiaque congestive, maladie rénale ou hépatique.
- hypertension.

5. POSOLOGIE :

Conformez-vous strictement aux instructions d'administration à moins qu'il vous soit recommandé par votre médecin de suivre d'autres instructions différentes. Rappelez-vous de prendre votre médicament. La durée de traitement avec

TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg vous sera indiquée par votre médecin. Veuillez ne pas interrompre votre traitement préalablement car la maladie peut s'aggraver. Les comprimés de torasémide sont destinés à une administration par voie orale.

Adultes :

- TENSEMIDE®

La dose dépend

Si
dan
pha

remarqu

désirables non mentionnés
mer votre médecin ou votre

LOT : 12318003

PER : 04-2021

PPU : 47,10 DH

LES ET PRECAUTIONS

- Il faut noter que le torasémide peut augmenter les niveaux de sodium ou réduire le volume sanguin. Chez les sujets traités avec diurétiques, il peut entraîner des effets cardiovasculaires. Il peut également provoquer des effets urinaires. Il peut également provoquer une baisse de la tension artérielle (hypotension). En absence de données sur la sécurité et l'efficacité chez les enfants, l'utilisation de ce médicament chez ce groupe de patients doit être évitée.

◊ Informations importantes sur les composants de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg, comprimés

Ce médicament contient du lactose. Si vous présentez une intolérance à certains sucres, demandez l'avis de votre médecin avant la prise de ce médicament. Ce médicament ne contient pas de gluten.

9. INTERACTIONS :

◊ Interaction avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance. De plus, veuillez signaler à votre médecin en cas d'utilisation d'un de ces médicaments pouvant interagir avec le torasémide :

- Les glucosides cardiaques comme la digoxine (médicaments pour le cœur), antihypertenseurs (en particulier les IECA), théophylline (médicaments pour le traitement de l'asthme), étant donné que l'effet de ces médicaments peut augmenter.
- Minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et les laxatifs : le torasémide peut augmenter l'élimination du potassium produit par ces médicaments.
- Antibiotiques du groupe des aminoglycosides : peuvent augmenter la toxicité au niveau du rein et de l'ouïe.
- Cisplatin (médicament pour le traitement du cancer), lithium (médicament anti-dépresseur), salicylates, acide éthacrynone, étant donné que le torasémide peut augmenter la toxicité de ces médicaments.
- Médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (par exemple ibuprofène, indométhacine), probenecid (médicament antigoutteux), colestyramine (médicaments destinés à diminuer le cholestérol dans le sang) : peuvent diminuer l'effet de torasémide.
- Médicaments pour le traitement du diabète : le torasémide peut diminuer l'effet de ces médicaments.

◊ Interaction de TENSEMIDE® 2,5 mg, 5 mg et 10 mg comprimés avec les aliments et boissons :

Les comprimés peuvent être pris accompagnés ou non d'aliments. Ils doivent être avalés sans être mastiqués le matin à l'aide d'un liquide.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

MERCK

7878030695

786216242



786216242

ARDENSIEL®, comprimé pelliculé

marate

ent l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Vous pourrez avoir besoin de la relire.

tre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Il a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

irables devient grave ou vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

INSEL et dans quel cas est-il utilisé ?

informations à connaître avant de prendre ARDENSIEL ?

es indésirables éventuels ?

ARDENSIEL ?

menaires.

ARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

eutique

ARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

ues

int en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps. Ce produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique et stable. Ce produit est utilisé en association avec d'autres cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ARDENSIEL ?

INSEL en cas de :

- au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),

culation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire n traité, tumeur rare de la glande surrenale,

est-à-dire présente d'acide en excès dans le sang.

Si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

angine cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,

• lorsque la pression artérielle basse,

• certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,

• choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**K
ERCK**

7878030695

7862160242

30

0897
0 mg
cables B/
5,90 DH

6 118001 100897
Cardensiel® 10 mg
Comprimés pelliculés sécables B/
PPV: 76,90 DH

NIEL®, comprimé pelliculé

mate

ment l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien ou à votre médecin.

Il est recommandé de ne pas prendre ce médicament si vous avez des symptômes de la grippe ou de l'angine. Si vous avez des symptômes de la grippe ou de l'angine, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. Si vous avez des symptômes de la grippe ou de l'angine et que vous prenez ce médicament, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé.

INSEL et dans quel cas est-il utilisé ?

indésirables éventuels ?

L'ADEN
nentaires

URBANISME ET BANS DUELS CAS EST-IL UNE SEULE RÉ

ARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

int en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

est produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins du corps. Pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable.. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments.

et ce affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

ENSIEL en cas de :
é) au bisoprolol à l'un des autres composants (voir rubrique 6)

culation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire

- certaines affections cardiaques entraînant un rythme cardiaque lent ou irrégulier

- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicamente car elle contient des informations importantes pour vous.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

pacien. Personnellement prescrit. Ne le donnez pas si leur être noctil, même si les signes deux vôtres, doivent drave ou si vous remarquez un

... le comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

4 mg, comprimé?
bles éventuels?
4 mg, comprimé?

mg. COMPRISE ET DANS QUELS CAS
LE OU LE TYPE D'ACTIVITÉ :
AA(7).

PPV :
Exp :
N° Lot :

vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans la formation de caillot dans les artères et les

phlébite (caillot dans une veine), embolie pulmonaire (caillot dans les poumons), maladies cardiaques communes : certains troubles du rythme cardiaque (tachycardie, fibrillation auriculaire), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde.

ES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE COMPRIMER? Ces dernières sont nécessaires, avant la prise du médicament : formule(s) d'une molécule, de certains sucres ou de médicaments.

**ng comprimé dans les cas suivants :
ensensibl à la substance active ou à l'un de
ans ce médicament;
se sévère (maladie du foie);
medicaments suivants :**

4 mg pour le traitement de mycoses (infections fongiques) ou de la phlébite. millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).

Il n'entraîne pas d'effets secondaires. En 4 mg, **comprimé** : il est le principe et les modalités du traitement anti-inflammatoire. N'hésitez pas à poser des questions au pharmacien de suivi prévu (voir Carnet d'information en annexe).

Ac
10

l'aspirine ou ses dérivés aux doses habituelles par voie orale, - les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) (sauf AINS pyrazolé), le fluorouracile et, par extrapolation, tegafur et capecitabine (médicament anticancéreux).

Avant le traitement : Votre médecin pourra évaluer votre risque personnel de saignement éventuel. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements lorsqu'il vous prescrit des médicaments.

sont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation de manière régulière et sans excès.

Interaction avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

En général, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse, prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte. En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire ce médicament pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très

D'AILLEURS, IL CONVIENIR AU COURS DE LA GROSSESSE, OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Cas d'éventuelles blessures :
Excipients à effet notoire : lactose

3. COMMENT PRENDRE SINTROM 4 mg, comprimé?
Instruction pour un bon usage.
Posologie, mode d'emploi volet(s) d'administration, fréquence d'administra-
tion et durée du traitement.

Mises en garde spéciales :
Respectez strictement les instructions de votre médecin. Veuillez lire et respecter toutes les indications et précautions d'emploi.

les rhinitisues nécessitent toujours un soin médicamenteux. Néanmoins, il est possible celui qui suit votre traitement et l'ama de prendre par lui-même. Mode d'administration : VOIE ORAEL : avaler les comprimés avec un verre d'eau. Fréquence d'administration : à doses égales et sans oubli de ce médicament est déterminante dans

L'entame ou l'entretien. L'*"entame ou prise en main"* une prise par jour, il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR. Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.

Symptômes et conduire à tenir en cas de surdosage :
S'il vous arrive de prendre plus de SINTROM 4 mg, comprimé que vous n'auriez dû :
Consultez immédiatement votre Médecin ou votre pharmacien.
Un surdosage peut se manifester par des symptômes tels que : « Messe en partie sonnante ».

Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous a traité, devra être effectué en urgence.

Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
La prise médicamenteuse oubliée peut être "rattrapée" dans un délai d'une heure après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il est préférable de ne pas prendre la dose oubliée.

Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Vous ne devrez en aucun cas arrêter de prendre Sintrom sans que vous

SINTROM® 4mg, Comprimé, Boîte de 10.

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale.
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la re lire.

Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre personnel prescrit. Ne le donnez pas sans leur être noché, même si les signes d'UX VOTREZ.

100
né dans cette notice, parlez-en à votre

mgi, COMPRIME ET DANS QUELS CASSÉS
ou le type d'activité :
ΔΔΔΔΔ

ant oral de la famille des antivitamines K vitamine K. Cette vitamine a un rôle dans le ce médicament permet donc de ralentir la

P **U** **Z** Formation du docteur dans nos écoles et nos meilleures situations en médecine ou en chirurgie.

que fibrillations auriculaires), anomalies ou prothèse des valves cardiaques, certains infarctus du myocarde en relâchement d'une héparine (autre médicament anticoagulant).
INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE COMPRENDRE?

**Formule(s) d'une intolerance à certains succès-
tueuses avant la prise du neurotensin :**
ce médicament.

mg
ans ce médicament :
que savère (maladie du foie) ;
s médicaments suivants :
pour le traitement de mycoses (infections

lité ou buccale; phénylbutazone, médicaments utilisés comme millepertuis (plante utilisée en phytothérapie).
Précautions particulières d'emploi:

Le principe et les modalités du traitement sont intuitifs. N'hésitez pas à poser des questions si l'arnet de suivi prévu (voir Carnet d'information et document déconseillé, sauf avis contraire de votre

Le saignement nasal.

Avant le traitement, il est nécessaire que votre médecin puisse évaluer votre risque personnel et potentiellement évitable. Ainsi, signalez-lui si vous êtes sujet à des saignements répétitifs et si vous avez ou avez eu :

sont pas interdits, à condition de les répartir dans votre alimentation d

manière régulière et sans excès.

Durant le traitement par Sintrom, vous devrez éviter toute consommation d'excès d'alcool, étant donné que l'alcool risque de modifier l'action de Sintrom sur votre organisme.

Interaction avec les nombreux de photothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement : déconseillée pendant la grossesse. Prévenez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte.

En cas de besoin, votre médecin peut décider de vous prescrire certains antibiotiques pendant votre grossesse. Si vous souhaitez être enceinte, parlez-en à votre médecin. Sauf cas très particulier, votre traitement sera interrompu avant le début de la grossesse.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENIT AU COURS DE LA GROSSESSE, OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

Vitez les sports ou les comportements violents susceptibles d'entraîner des traumatismes.

Evitez un "aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines" : SINTRON n'a pas d'influence connue sur l'aptitude à conduire des véhicules et

Garder sur vous une carte mentionnant la prise de traitement anticoagulant, en cas d'éventuelles blessures.

Ce médicament a effet notable : Lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients qui ont réagi négativement au lactose. Son utilisation est déconseillée chez les personnes qui ont réagi négativement au lactose.

patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladie héréditaire rares).

Instruction pour un bon usage, posologie, mode et/ou voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée du traitement :

Mises en garde spéciales ».
A titre indicatif :
La première dose est choisie par votre médecin en fonction de votre situation
puis la dose est modifiée par votre médecin en fonction des résultats de l'INR
pour équilibrer votre traitement.

les modifications de doses doivent toujours être décidées par un médecin, mais il est préférable que ce soit vous-même, lorsque vous êtes en état de juger pour vous-même si une modification est nécessaire. Il est important de ne pas faire d'auto-traitement.

La fréquence d'administration et sans oubli de ce médicament est déterminante dans l'efficacité du traitement. L'heure de prise doit être fixe. Une prise par jour, il est préférable de le prendre le soir, afin que votre médecin puisse modifier la dose dès que possible après les résultats de l'INR.

Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.
Durée du traitement :
Selon prescription médicale.
Le comprimé peut être divisé en dose égale.

S'empêchez de prendre ce comprimé si vous avez pris plus de SINTRON 4 mg, comprimé que vous n'aurez dû. Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Un surdosage peut se manifester par : l'apparition d'un saignement (lire rubrique « Mises en garde spéciales »).

• un INR supérieur à 3, avec ou sans saignement associé. Dans ces situations, prévenir rapidement un médecin, si possible celui qui vous suit. Dans certains cas, il faudra simplement modifier la dose, dans d'autres cas un traitement devra être effectué en urgence.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :
Si vous oubliez de prendre Sintrom 4 mg comprimé, il ne faut jamais prendre deux fois la dose prévue dans la même journée.
La prise médicamenteuse oubliée peut être « rattrapée » dans un délai de 4 heures après l'heure habituelle d'administration. Passé ce délai, il

préférable de ne pas prendre la dose oubliée. Pensez à signaler un oubli lors d'un contrôle d'INR et notez-le dans votre carnet de suivi.

A close-up photograph of a blue prescription bottle. The label features the brand name "ROZAT®" in large, white, serif capital letters at the top. Below it, the generic name "Rosuvastatin" is written in a smaller, white, sans-serif font. Further down the label, the text "28 Comprimés pelliculés" is printed in a white, italicized, sans-serif font.

A close-up photograph of a prescription bottle's label. The label is blue with white text. It reads "lovastatine" at the top, followed by "28 Comprimés pelliculés".

10 mg

0 mg

10 mg

PPV: 147DH40
PER: 1006900
LOT: T006900

Je crois que vous avez raison.
Je suis content de continuer de prêter à la pellicule.

ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelées lipides, le plus fréquemment étant le cholestérol.

(LDL-C) de 10 mg/dL. Il n'est pas facile pour réduire le taux de mauvais cholestérol.

et augmenter le « bon cholestérol ». Il agit en addition à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à éliminer de votre sang.

Hour la plupart des personnes, un roulent un moment en erre et de constipation sur la facion dont elles se sentent parce que ces dernières n'entraînent aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépolys graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins dans leur diamètre.

Ensuite, nous devons nous assurer que l'apport en vitamines et minéraux est suffisant. Par exemple, le magnésium aide à prévenir les crampes et les spasmes dans les artères et les vaisseaux sanguins.

d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d'autres problèmes de santé qui y sont liés.

normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de débris de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

**Résoxyde mousse en voies respiratoires sévères :
d'administration et Durée du traitement :**
Doses uniques chez les adultes.
Si vous prenez ROZAT comprimé pelliculé pour un toux a
sollicité élevé.

Dose initiale :
Votre traitement avec ROZAT[®] comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine ouverte.

Le choc de la dose initiale dépendra de :
Votre taux de cholestérol.
Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.
Finalement, vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Rozat est un médicament à la fois antidiabétique et anti-ischémique. Il aide à réduire les symptômes de l'ischémie cardiaque et améliore la tolérance au exercice. Il peut également aider à prévenir les complications liées au diabète, telles que les malades de pied et les malades de rein. Rozat est recommandé pour les personnes qui ont des problèmes de circulation dans les jambes ou les pieds, ou qui ont des malades de rein. Il peut également aider à prévenir les complications liées au diabète, telles que les malades de pied et les malades de rein.

A blue rectangular box for Rozat tablets. The word "ROZAT" is prominently displayed in large white letters at the top. Below it, "Rosuvastatin" is written in a smaller white font. At the bottom left, it says "28 Comprimés pelliculés". A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "AT" in "ROZAT".

A close-up photograph of a prescription bottle's label. The label is blue with white text. It clearly displays "lovastatine" at the top, followed by "28 Comprimés pelliculés".

10 mg

69

PPV: 147DH40
PER: 100%
LOT: T00630

A augmenter votre muscle vasculaire dans les artères.

ans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol trouvés dans le sang.

(LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C). Le cholestérol peut réduire le « mauvais cholestérol », favoriser la production de « mauvais cholestérol » et empêcher également l'apport de votre cholestérol.

orines, un taux de cholestérol élevé n'a pas de raison dont elles se sentent parce que c'est une maladie génétique. Cependant, sans traitement, des dégâts peuvent se produire dans les artères et le cœur, entraînant des maladies cardiaques et d'insuffisance cardiaque.

des vaisseaux peut empêcher le passage du sang ou au cerveau conduisant à une crise d'ischémie cérébrale.

Si votre taux de cholestérol revient à nouveau à des niveaux élevés, vous pouvez réduire le risque d'ictus, d'accident vasculaire cérébral ou d'autres maladies cardiaques, un accident vasculaire cérébral qui y sont liés.

vient la remontée de votre taux d'accretion de dépôts de graisse. Arrêtez votre traitement si votre métabolisme vous indique que vous êtes enceinte.

**voies d'administration, Fréquence : Durée du traitement :
dulox.**

DZAT® comprimé pelliculé doit débuter même si vous prenez une dose plus élevée.

ne dépendra de :
d'une attaque cardiaque ou un accident

effets indésirables, mais ils ne surviennent pas toujours provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas toujours chez tout le monde. Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont habituellement légers et de courts effets indésirables.

surveillez de prendre KOZAL comprimés durées — ou des
consultez immédiatement un médecin : — si pelliculé et
réactions allergiques suivantes : — si vous avez les
• Difficulté à respirer avec ou sans gonflement de la langue et/ou de la poitrine.

Gonflement du visage, des lèvres, de la langue, des narines,
qui peut causer des difficultés pour avaler ou déglutir.
Démangeaisons sévères de la peau pour levez, cheveux, bras, jambes,
Consultez votre médecin immédiatement.

Ressentez des courbures musculaires...endrement si durent anormalement longtemps. Les courbures inhabituelles : que plus fréquentes chez les enfants et adolescents maladroites : qui comme avec les autres personnes, un triste état. Que chez les enfants sont eux des problèmes musculaires...peut mal les ordres.

- **Mauvais Indésirables fréquents :** [malades chroniques] qui rendent de personnes dangereuses pour la vie de ces personnes [malades chroniques]. On tient éloigné de personnes [malades chroniques], entraîne un mal de tête, douleurs d'estomac,

constipation,
sensation de malaise,
douleurs musculaires,
sentiment général de faiblesse,
sécrétions vésiculeuses.

- * augmentation des protéines dans les urines à la suite de ce revient généralement à la normale.

Zyloric®

allopurinol

200 mg

زيولوريك

أليبورينول

قرصاً 28

28 comprimés



més

prendre ce
ous.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines.

ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

1901 190407
2020 03 2023
31 30

pourront

t pris ou



- An...
- Médicaments utilisés pour traiter les cancers
- Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosupresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
- Médicaments utilisés pour traiter le diabète
- Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
- Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine

• Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.
Veuillez aviser votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notable: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'lap ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après le repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée progressivement.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Zyloric®

allopurinol

200 mg

زيولوريك

أليبورينول

قرصاً 28

28 comprimés



més

prendre ce
ous.

• Si vous avez des symptômes de goutte, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines.

ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

1901 190407
2020 03 2023
31 30

pourront

t pris ou



- An...
- Médicaments utilisés pour traiter les cancers
- Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosupresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
- Médicaments utilisés pour traiter le diabète
- Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
- Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine

• Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.
Veuillez aviser votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notable: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'lap ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après le repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée progressivement.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.

Zyloric®

allopurinol

200 mg

زيولوريك

أليبورينول

قرصاً 28

28 comprimés



més

prendre ce
ous.

• Si vous avez des symptômes de goutte, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que ZYLORIC comprimés, et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ZYLORIC, comprimés ?
3. Comment prendre ZYLORIC comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ZYLORIC comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ZYLORIC comprimés, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Les comprimés de ZYLORIC contiennent un principe actif appelé l'allopurinol. Il agit en ralentissant la vitesse de certaines réactions chimiques dans votre organisme afin de diminuer le taux d'acide urique dans le sang et les urines.

ZYLORIC, comprimé est utilisé pour réduire ou prévenir la formation de dépôts d'urate d'acide urique lorsque votre organisme produit en trop grande quantité une substance appelée l'acide urique. Ces dépôts sont responsables de la goutte ou de certains types de calculs rénaux ou de certains autres types de problèmes rénaux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ZYLORIC comprimés ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ZYLORIC, comprimé :

- En cas d'allergie connue à l'allopurinol ou à l'un des constituants du produit mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans (contre-indication liée à la forme pharmaceutique).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions :

Adresssez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère avant de prendre ZYLORIC mg, comprimé si vous :

- Avez des problèmes au niveau de votre foie ou de vos reins.
- Souffrez de problèmes cardiaques ou d'une hypertension artérielle et si vous prenez des diurétiques et/ou un médicament appelé un IEC (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).
- Souffrez actuellement d'une crise de goutte.
- Êtes d'origine chinoise, ethnie Han, africaine ou indienne.
- Avez des problèmes de thyroïde.

Faites particulièrement attention avec ZYLORIC, comprimé :

- Des éruptions cutanées ont été signalées chez des patients prenant de l'allopurinol. Fréquemment, l'éruption cutanée peut entraîner des ulcères au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des organes génitaux et une conjonctivite (yeux rouges et gonflés). Ces éruptions cutanées graves sont souvent précédées par des symptômes pseudo-grippaux, fièvre, maux de tête, courbatures (symptômes ressemblant à la grippe). L'éruption peut évoluer vers une apparition de vésicules sur tout le corps et une desquamation de la peau. En cas d'éruption cutanée ou de symptômes cutanés, arrêtez de prendre

1901 190407
2020 03 2023
31 30

pourront

t pris ou



- An...
- Médicaments utilisés pour traiter les cancers
- Médicaments utilisés pour réduire la réponse immunologique (immunosupresseurs, par exemple azathioprine ou mercaptopurine)
- Médicaments utilisés pour traiter le diabète
- Médicaments pour les problèmes cardiaques ou l'hypertension artérielle comme des IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine) ou des diurétiques (pour éliminer l'eau)
- Médicaments utilisés pour fluidifier le sang (anticoagulants), comme la warfarine

• Tout autre médicament utilisé pour traiter la goutte.
Veuillez aviser votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris tout autre médicament, notamment des médicaments obtenus sans ordonnance, y compris des médicaments à base de plantes.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

En raison du passage de ce médicament dans le lait maternel, il est donc conseillé de ne pas prendre ZYLORIC, comprimé au cours de l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, ou des problèmes de coordination. Si c'est le cas, ne conduisez pas ou n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Liste des excipients à effet notable: Lactose.

Si votre médecin vous a dit que vous aviez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'lap ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

3. COMMENT PRENDRE ZYLORIC, comprimé?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un grand verre d'eau après le repas.

Posologie

La posologie recommandée est fonction des résultats du taux sanguin en acide urique.

Les posologies recommandées sont comprises entre 100 et 900 mg par jour. Vous commencerez généralement avec une faible dose, qui sera augmentée progressivement.

Si vous êtes âgé(e) ou si votre fonction hépatique ou rénale est réduite, votre médecin pourra vous prescrire une dose plus faible ou vous demander d'espacer les prises du médicament. Si vous êtes traité(e) par dialyse deux ou trois fois par semaine, votre médecin pourra vous prescrire une dose de 300 ou 400 mg qui devra être prise immédiatement après votre dialyse.

Utilisation chez les enfants (âgés de moins de 15 ans)

Les posologies habituelles sont comprises entre 100 à 400 mg par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau, après le repas.



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg*

Spironolactone

ALDACTONE 50® mg

20 comprimés sécables

P.P.V: 57DH70
LOT: B21667
EXP: 01.2021



votre pharmacien.
Si, médicalement, vous a été
prescrit. Né le
quelqu'un d'autre,
symptômes
pourrait lui être nocif.
indésirables devient
remarquez un effet
mentionné dans cette
à votre médecin ou
en.

ment l'intégralité
de prendre ce
vous pourriez
tre question, si
l'emandez plus
médecin ou à

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que amiloride, canrenoate de potassium, éplerénone, triamtéterène ou du potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrenales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-sulfaméthoxazole.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- Une éruption cutanée.
- Une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aigüe). Un taux anormal de certains minéraux dans l'organisme tel qu'une augmentation du potassium dans le sang et une diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

JE ALDACTONE,
COMME UN SÉCABLE ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISÉ ?

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg*

Spironolactone

ALDACTONE 50® mg

20 comprimés sécables

P.P.V: 57DH70
LOT: B21667
EXP: 01.3021



votre pharmacien.
Si, médicalement, vous a été
prescrit. Né le
quelqu'un d'autre,
symptômes
pourrait lui être nocif.
indésirables devient
remarquez un effet
mentionné dans cette
à votre médecin ou
en.

ment l'intégralité
de prendre ce
vous pourriez
tre question, si
l'emandez plus
médecin ou à

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que amiloride, canrenoate de potassium, éplerénone, triamtéterène ou du potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrenales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-sulfaméthoxazole.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- Une éruption cutanée.
- Une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aigüe). Un taux anormal de certains minéraux dans l'organisme tel qu'une augmentation du potassium dans le sang et une diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

JE ALDACTONE,
COMME UN SÉCABLE ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISÉ ?

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg*

Spironolactone

ALDACTONE 50® mg

20 comprimés sécables

P.P.V: 57DH70
LOT: B21667
EXP: 01.3021



votre pharmacien.
Si, médicalement, vous a été
prescrit. Né le
quelqu'un d'autre,
symptômes
pourrait lui être nocif.
indésirables devient
remarquez un effet
mentionné dans cette
à votre médecin ou
en.

ment l'intégralité
de prendre ce
vous pourriez
tre question, si
l'emandez plus
médecin ou à

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que amiloride, canrenoate de potassium, éplerénone, triamtéterène ou du potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrenales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprime et triméthoprime-sulfaméthoxazole.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- Une éruption cutanée.
- Une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aigüe). Un taux anormal de certains minéraux dans l'organisme tel qu'une augmentation du potassium dans le sang et une diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

JE ALDACTONE,
COMME UN SÉCABLE ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISÉ ?

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

ALDACTONE® 50 mg, 75 mg*

Spironolactone

ALDACTONE 50® mg

20 comprimés sécables

P.P.V: 57DH70
LOT: B21667
EXP: 01.3021



votre pharmacien.
Si, médicalement, vous a été
prescrit. Né le
quelqu'un d'autre,
symptômes
pourrait lui être nocif.
indésirables devient
remarquez un effet
mentionné dans cette
à votre médecin ou
en.

ment l'intégralité
de prendre ce
vous pourriez
tre question, si
l'emandez plus
médecin ou à

- médicaments de la même famille que la spironolactone (diurétiques épargneurs de potassium : tels que amiloride, canrenoate de potassium, éplerénone, triamterène ou du potassium),
- médicament utilisé pour le traitement de certaines tumeurs des glandes surrenales, le mitotane,
- certains médicaments utilisés avant ou après une greffe pour éviter le rejet du greffon (la ciclosporine ou le tacrolimus),
- médicaments destinés à baisser la tension artérielle (les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II), triméthoprim et triméthoprime-sulfaméthoxazole.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

- Un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps.
- Une éruption cutanée d'origine médicamenteuse avec éosinophilie (quantité excessive de certains globules blancs) et manifestations systémiques (affections touchant différentes localisations).
- Une éruption cutanée.
- Une pemphigoïde (maladie se caractérisant par la présence d'ampoules remplies de liquide sur la peau).
- Un mauvais fonctionnement des reins (insuffisance rénale aigüe). Un taux anormal de certains minéraux dans l'organisme tel qu'une augmentation du potassium dans le sang et une diminution du sodium dans le sang.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

JE ALDACTONE,
COMME UN SÉCABLE ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISÉ ?

- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALDACTONE, comprimé sécable ?